

Банк тестовых заданий для проведения первого этапа государственного экзамена по специальности
34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

1. [T000002] ОЦЕНКА НОВОРОЖДЕННОГО ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ
 - А) на 1-ой и 5-ой минутах жизни
 - Б) на 10 минуте жизни
 - В) перед переводом из родового блока
 - Г) перед выпиской из родильного дома
2. [T000003] ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛИНЫ ТЕЛА, МАССЫ ТЕЛА, ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТСЯ
 - А) антропометрическими
 - Б) фактическими
 - В) долженствующими
 - Г) второстепенными
3. [T000004] ГИПОГАЛАКТИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
 - А) снижение выработки молока в молочных железах
 - Б) воспаление молочной железы у женщины
 - В) снижение потребности ребенка в грудном молоке
 - Г) непереносимость грудного молока у ребенка
4. [T000005] РАННЕЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО К ГРУДИ СПОСОБСТВУЕТ
 - А) усилению лактации
 - Б) профилактике рахита
 - В) быстрому росту ребенка
 - Г) профилактике мастита
5. [T000020] ГОРМОН, СТИМУЛИРУЮЩИЙ РОСТ И СОЗРЕВАНИЕ ФОЛЛИКУЛ В ЯИЧНИКАХ
 - А) фолликулостимулирующий
 - Б) адренкортикотропный
 - В) тиреотропный
 - Г) лютеинизирующий
6. [T000021] ЦИКЛИЧЕСКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СЛОЯ ЭНДОМЕТРИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
 - А) менструация
 - Б) плацентация
 - В) овуляция
 - Г) имплантация
7. [T000022] ОПЛОДОТВОРЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ПРОИСХОДИТ В
 - А) полости маточной трубы
 - Б) полости матки
 - В) полости малого таза
 - Г) канале шейки матки
8. [T000024] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА СОСТАВЛЯЕТ
 - А) 6-8 недель
 - Б) месяц
 - В) 2 недели
 - Г) 1-2 дня
9. [T000025] ПЕРВЫМ ПЕРИОДОМ РОДОВ СЧИТАЕТСЯ ПЕРИОД
 - А) от начала родовой деятельности до раскрытия шейки матки
 - Б) с момента рождения плода до рождения последа
 - В) от раскрытия шейки матки до изгнания плода
 - Г) с момента отхождения околоплодных вод
10. [T000026] ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ И ВЫВЕДЕНИЯ ГРУДНОГО МОЛОКА НАЗЫВАЕТСЯ
 - А) лактация
 - Б) овуляция
 - В) саливация
 - Г) пролиферация
11. [T000027] К ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ КОНТРАЦЕПЦИИ ОТНОСИТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 - А) календарного метода

- Б) презерватива
 - В) спермицидов
 - Г) внутриматочной спирали
12. [Т000029] ОДНИМ ИЗ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРАЦЕПЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) эрозия шейки матки
 - Б) наличие артериальной гипертензии I стадии
 - В) возраст старше 30 лет
 - Г) пиелонефрит в стадии ремиссии
13. [Т000030] СРЕДСТВА ГОРМОНАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ
- А) подавления овуляции
 - Б) сгущения цервикальной слизи
 - В) уничтожения сперматозоидов
 - Г) снижения двигательной активности сперматозоидов
14. [Т000031] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
- А) 280 дней
 - Б) 220 дней
 - В) 240 дней
 - Г) 300 дней
15. [Т000032] ВО ВЛАГАЛИЩЕ ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ ПРЕОБЛАДАЕТ СРЕДА
- А) кислая
 - Б) нейтральная
 - В) слабощелочная
 - Г) щелочная
16. [Т000033] СРЕДСТВОМ КОНТРАЦЕПЦИИ, ЗАЩИЩАЮЩИМ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ
- А) презерватив
 - Б) внутриматочная спираль
 - В) гормональные препараты
 - Г) диафрагма
17. [Т000034] В ЯИЧКЕ МУЖЧИНЫ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ГОРМОН
- А) тестостерон
 - Б) пролактин
 - В) эстроген
 - Г) прогестерон
18. [Т000035] ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ВЫЗЫВАЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПЕРЕНЕСЕННОЕ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
- А) краснуха
 - Б) ревматизм
 - В) пневмония
 - Г) панкреатит
19. [Т000037] МЕНОПАУЗОЙ НАЗЫВАЮТ
- А) последнюю самостоятельную менструацию
 - Б) период стабильной менструальной функции
 - В) период наступления первой менструации
 - Г) период времени после окончания репродуктивного возраста
20. [Т000040] К ПСИХОНЕВРОТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ
- А) плаксивость
 - Б) жар
 - В) приливы
 - Г) нарушения сна
21. [Т000041] К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ
- А) адекватную физическую активность
 - Б) употребление продуктов, богатых углеводами
 - В) соблюдение режима сна и питания
 - Г) наблюдения у врача травматолога
22. [Т000047] ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) бесплодие

- Б) многоплодная беременность
 - В) неправильное положение матки
 - Г) нарушение менструального цикла
23. [Т000049] ПРИЧИНОЙ АНДРОПАУЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) снижение выработки тестостерона
 - Б) снижение функции щитовидной железы
 - В) снижение выработки эстрогена
 - Г) избыток пролактина
24. [Т000050] GERONTOLOGIA – ЭТО
- А) наука о старении
 - Б) наука о здоровой женщине
 - В) наука о профилактике и лечении болезней старческого возраста
 - Г) наука о смерти
25. [Т000052] К ГРУППЕ ПОЖИЛЫХ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ
- А) 60-74 лет
 - Б) 45-59 лет
 - В) 65-85 лет
 - Г) 75-89 лет
26. [Т000053] К ДОЛГОЖИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ
- А) старше 90 лет
 - Б) 75-90 лет
 - В) старше 80 лет
 - Г) старше 100 лет
27. [Т000054] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАННЕГО СТАРЕНИЯ ИЗ РАЦИОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ
- А) холестеринсодержащие продукты
 - Б) растительный белок
 - В) кисломолочные продукты
 - Г) грубую клетчатку
28. [Т000055] ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА
- А) сердечно-сосудистых заболеваний
 - Б) инфекционных заболеваний
 - В) ЛОР-заболеваний
 - Г) психических заболеваний
29. [Т000059] ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫДАЕТСЯ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
- А) заболевшим лицам, работающим по трудовому договору
 - Б) работникам на время прохождения периодических медицинских осмотров
 - В) лицам с хроническими заболеваниями вне обострения
 - Г) обучающимся в образовательных организациях
30. [Т000060] РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСМОТРА ЖЕНЩИНЫ ВРАЧОМ-АКУШЕРОМ-ГИНЕКОЛОГОМ СОСТАВЛЯЕТ
- А) 1 раз в год
 - Б) 1 раз в 2 года
 - В) 4 раза в год
 - Г) 2 раза в год
31. [Т000061] ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ
- А) анемия
 - Б) флюороз
 - В) хрупкость костей
 - Г) эндемический зоб
32. [Т000062] К ФАКТОРАМ, БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЮЩИМ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ
- А) здоровый образ жизни
 - Б) высококалорийное питание
 - В) избыточная масса тела
 - Г) гиподинамия
33. [Т000063] ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ КОМПЕНСАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЕТСЯ
- А) реабилитацией

- Б) лечением
 - В) диагностикой
 - Г) профилактикой
34. [Т000065] ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) пубертатным периодом
 - Б) фертильным периодом
 - В) пренатальным периодом
 - Г) юношеским периодом
35. [Т000066] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В ПЕРИОД ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ У ПОДРОСТКА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) эмоциональная неустойчивость
 - Б) физическая активность
 - В) появление вторичных половых признаков
 - Г) социализация
36. [Т000067] ОДНИМ ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕГО К ТРУБНОМУ БЕСПЛОДИЮ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) воспаление маточных труб
 - Б) кровотечение
 - В) остатки плацентарной ткани
 - Г) перфорация матки
37. [Т000068] У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВИТАМИНА Д РАЗВИВАЕТСЯ
- А) рахит
 - Б) цинга
 - В) анемия
 - Г) остеохондроз
38. [Т000069] ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ
- А) центильных таблиц
 - Б) индивидуальных стандартов
 - В) возрастных стандартов
 - Г) визуально
39. [Т000070] ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИВОДИТ К
- А) повышению риска заболеваний щитовидной железы
 - Б) повышению риска заболеваний надпочечников
 - В) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями
 - Г) заболеваниям поджелудочной железы
40. [Т000071] ФОРМИРОВАНИЮ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ У ДЕВОЧЕК СПОСОБСТВУЕТ ГОРМОН
- А) эстрадиол
 - Б) тироксин
 - В) адреналин
 - Г) инсулин
41. [Т000073] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) контрацепция
 - Б) лактация
 - В) прерванный половой акт
 - Г) аменорея
42. [Т000075] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) устранение психогенного компонента родовой боли
 - Б) ознакомление беременных со строением и функциями половых органов
 - В) ознакомление с основами гигиены режима и питания беременных
 - Г) разъяснение влияния факторов внешней среды на течение беременности
43. [Т000076] К ИЗМЕНЕНИЯМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ
- А) снижение жизненной емкости легких
 - Б) увеличение жизненной емкости легких
 - В) увеличение количества альвеол
 - Г) увеличение дыхательного объема легких

44. [T000077] К ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ
- А) снижение памяти
 - Б) улучшение памяти
 - В) улучшение сна
 - Г) увеличение способности к обучению
45. [T000081] СТЕПЕНЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА – ЭТО
- А) биологический возраст
 - Б) календарный возраст
 - В) паспортный возраст
 - Г) хронологический возраст
46. [T000085] ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
- А) снижением эластичности
 - Б) увеличением тургора
 - В) повышением влажности
 - Г) снижением пигментации
47. [T000086] АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ
- А) снижением перистальтики кишечника
 - Б) усилением перистальтики кишечника
 - В) уменьшением длины кишечника
 - Г) гипертрофией обкладочных клеток желудка
48. [T000088] ГЕРОНТОЛОГИЯ – ЭТО НАУКА, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ
- А) биологические, социальные и психологические аспекты старения человека
 - Б) закономерности старения высших животных и человека
 - В) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
 - Г) пути увеличения продолжительности жизни человека
49. [T000094] ПИТАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗМА И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ
- А) рациональным
 - Б) недостаточным
 - В) несбалансированным
 - Г) избыточным
50. [T000096] РЕЗЕРВОМ ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ
- А) жиры
 - Б) белки
 - В) углеводы
 - Г) витамины
51. [T000097] ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ УГЛЕВОДОВ
- А) энергетическая
 - Б) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта
 - В) пластическая
 - Г) растворение витаминов А, К,Е
52. [T000098] ПРИ ДЕФИЦИТЕ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В РАЗВИВАЮТСЯ
- А) заболевания нервной системы
 - Б) цинга, нарушения зрения
 - В) анемия, повышенная кровоточивость
 - Г) рахит, цинга
53. [T000100] ДЕФИЦИТ ЙОДА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ ПРИВОДИТ К
- А) повышенной утомляемости
 - Б) задержке физического развития
 - В) развитию остеопороза
 - Г) онкологическим заболеваниям
54. [T000101] ИЗБЫТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ
- А) полиурии
 - Б) анорексии
 - В) обезвоживания

- Г) ожирению
55. [T000103] УМЕРЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) гиповитаминоз
 - Б) гипервитаминоз
 - В) авитаминоз
 - Г) дисвитаминоз
56. [T000104] СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ, УЖИН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ
- А) за 2-3 часа до сна
 - Б) за 45 минут до сна
 - В) за 1 час до сна
 - Г) за 6 часов до сна
57. [T000105] СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ
- А) к истощению
 - Б) к избыточной массе тела
 - В) к потере аппетита
 - Г) к нарушению функций кишечника
58. [T000106] ПОВЫШЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПРИВОДИТ К
- А) избыточной массе тела
 - Б) истощению
 - В) потере аппетита
 - Г) изменению настроения
59. [T000107] ЕСЛИ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ БОЛЬШЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПИЩИ, ТО МАССА ТЕЛА
- А) уменьшается
 - Б) увеличивается
 - В) остается постоянной
 - Г) колеблется
60. [T000108] ДЕФИЦИТ БЕЛКА В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
- А) отекам
 - Б) авитаминозу
 - В) повышению работоспособности
 - Г) снижению общего холестерина в крови
61. [T000109] ИЗБЫТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ПРИВОДИТ
- А) к ожирению
 - Б) к повышению работоспособности
 - В) к повышенной утомляемости
 - Г) к анорексии
62. [T000110] ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ОВОЩИ И ФРУКТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ
- А) 400 г в сутки
 - Б) 300 г в сутки
 - В) 250 г в сутки
 - Г) 150 г в сутки
63. [T000111] УЛУЧШАЕТ ПЕРИСТАЛЬТИКУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ
- А) овощей и фруктов
 - Б) пюреобразной пищи
 - В) острой пищи
 - Г) хлебобулочных изделий
64. [T000114] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ УМСТВЕННАЯ РАБОТА МОЖЕТ ПРИВОДИТ К
- А) снижению устойчивости внимания
 - Б) улучшению восприятия информации
 - В) улучшению запоминания информации
 - Г) повышению сосредоточения внимания
65. [T000115] ПРИ ГИПОДИНАМИИ ОТМЕЧАЕТСЯ
- А) снижение работоспособности
 - Б) повышение эмоциональности
 - В) изменение социальной роли
 - Г) снижение частоты сердечных сокращений
66. [T000116] ПОСЛЕДСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение силы и выносливости мышц
 - Б) повышение тонуса и эластичности мышц
 - В) снижение частоты сердечных сокращений
 - Г) повышение работоспособности организма
67. [Т000117] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОДИНАМИИ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ
- А) 30 минут
 - Б) 15 минут
 - В) 20 минут
 - Г) 60 минут
68. [Т000118] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С УПРАЖНЕНИЙ
- А) низкой интенсивности
 - Б) средней интенсивности
 - В) высокой интенсивности
 - Г) умеренной интенсивности
69. [Т000119] САМЫМ ЗДОРОВЫМ СНОМ ЯВЛЯЕТСЯ СОН В ПЕРИОД
- А) 22.00 – 06.00.
 - Б) 00.00 – 04.00.
 - В) 01.00. – 03.00.
 - Г) 03.00 – 06.00.
70. [Т000120] РЕКОМЕНДУЕМЫМ СПОСОБОМ СНЯТИЯ СТРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) занятие физической культурой
 - Б) употребление пищи
 - В) употребление алкоголя
 - Г) табакокурение
71. [Т000121] ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭТО
- А) метод физиотерапии различными природными факторами: воздухом, водой, солнцем, низкими и высокими температурами (относительно температуры тела) и пониженным атмосферным давлением, с целью повышения функциональных резервов организма
 - Б) кратковременное воздействие на человека тепловых и холодных стрессов
 - В) способность организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды
 - Г) устойчивость к воздействию низких температур
72. [Т000122] МЕТОДОМ ПРОФИЛАКТИКИ БЕССОНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) прием пищи не менее, чем за 2-3 часа до сна
 - Б) занятие танцами в вечернее время
 - В) посещение фитнес-тренировок вечером
 - Г) отказ от снотворных средств
73. [Т000123] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ НАПРАВЛЕНА НА
- А) некурящих людей и людей с факторами риска
 - Б) людей, бросивших курить, для предупреждения рецидива
 - В) курящих людей для оказания помощи в отказе от курения
 - Г) людей, которые недавно начали курить
74. [Т000124] ТАБАКОКУРЕНИЕ – ЭТО ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
- А) онкологических заболеваний
 - Б) авитаминоза
 - В) аллергических реакций
 - Г) развития ожирения
75. [Т000129] ФАКТОРОМ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИМ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ
- А) употребление алкоголя членами семьи
 - Б) позитивные коммуникации в семье
 - В) положительное поведение окружающих сверстников
 - Г) эмоциональная близость к матери
76. [Т000130] ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) высокий уровень взаимопонимания между всеми членами семьи
 - Б) слабый мониторинг со стороны родителей
 - В) низкий уровень ожидания от будущего
 - Г) предпочтение мнения сверстников мнению семьи
77. [Т000132] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ОТНОСИТСЯ К

- А) первичной профилактики
 - Б) вторичной профилактики
 - В) медицинской профилактики
 - Г) третичной профилактики
78. [Т000133] ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) отказ от употребления алкоголя
 - Б) предупреждение рецидивов
 - В) предупреждение употребления алкоголя
 - Г) лечение заболеваний
79. [Т000134] СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА – БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ПРИВОДЯЩИЙ К
- А) снижению функций организма
 - Б) усилению функций организма
 - В) атрофии органов
 - Г) повышению трудоспособности
80. [Т000136] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАДАЧЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ
- А) первичной
 - Б) социальной
 - В) третичной
 - Г) адаптивной
81. [Т000138] ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРОВОДИТСЯ ПО
- А) шкале SCORE
 - Б) шкале Нортон
 - В) шкале Ватерлоу
 - Г) госпитальной шкале тревоги и депрессии
82. [Т000139] К АБСОЛЮТНОМУ СУММАРНОМУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОМУ РИСКУ ОТНОСИТСЯ ВОЗРАСТ
- А) 40-65 лет
 - Б) 30-40 лет
 - В) 35-45 лет
 - Г) 60-75 лет
83. [Т000140] ПРИ ОЦЕНКЕ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОГО РИСКА УЧИТЫВАЕТСЯ
- А) возраст
 - Б) частота дыхания
 - В) уровень глюкозы
 - Г) частота пульса
84. [Т000141] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕСТИ
- А) измерение артериального давления
 - Б) эхокардиографию
 - В) определение холестерина липопротеидов
 - Г) электрокардиографию
85. [Т000142] ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ
- А) масса тела в кг разделить на рост в м² (в квадрате)
 - Б) рост в см минус 100
 - В) масса тела в кг разделить на рост в см
 - Г) рост в м минус 100
86. [Т000143] В НОРМЕ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ
- А) 18,5 кг/м² -24,9 кг/м²
 - Б) 25,0 кг/м² -29,9 кг/м²
 - В) 30,0 кг/м² -34,9 кг/м²
 - Г) 35,0 кг/м² -39,9 кг/м²
87. [Т000146] ОЖИРЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА
- А) 36 кг/м²
 - Б) 18 кг/м²
 - В) 25 кг/м²
 - Г) 41 кг/м²
88. [Т000147] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА ПРОВОДЯТ

- А) антропометрию
 - Б) рентгенологическое исследование
 - В) ультразвуковое исследование
 - Г) эндоскопическое исследование
89. [Т000148] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМЫ
- А) весы
 - Б) тонометр
 - В) спирометр
 - Г) термометр
90. [Т000149] ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА НЕОБХОДИМ
- А) тонометр
 - Б) сантиметровая лента
 - В) ростометр
 - Г) весы
91. [Т000150] ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА СОСТАВЛЯЕТСЯ
- А) индивидуальная программа здорового образа жизни
 - Б) программа борьбы с вредными привычками
 - В) стандартная программа здорового образа жизни
 - Г) план лечения пациента
92. [Т000156] ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ САМЫМИ УСТОЙЧИВЫМИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗБУДИТЕЛИ
- А) вирусного гепатита В
 - Б) дизентерии
 - В) холеры
 - Г) сальмонеллеза
93. [Т000158] КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ
- А) рака легкого
 - Б) миомы матки
 - В) фибромы пищевода
 - Г) аденомы надпочечника
94. [Т000159] ВИРУС ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ
- А) рака печени
 - Б) рака желудка
 - В) рака пищевода
 - Г) рака яичников
95. [Т000161] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) нарушение холестеринового обмена
 - Б) недостаточное поступление холестерина через продукты питания
 - В) избыток холестерина
 - Г) недостаток белка в крови
96. [Т000162] ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИАБЕТА
- А) сахарного
 - Б) несахарного
 - В) почечного
 - Г) фосфатного
97. [Т000163] ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ АНЕМИИ
- А) железодефицитной
 - Б) гемолитической
 - В) гипопластической
 - Г) серповидно-клеточной
98. [Т000166] ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО:
- А) состояние полного физического, духовного и социального благополучия
 - Б) состояние, при котором отсутствуют болезни, ограничивающие трудоспособность
 - В) состояние активной деятельности при наличии минимальных функциональных нарушений
 - Г) состояние его активной трудоспособности
99. [Т000167] ЗАБОТА О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) обязанностью граждан
- Б) добровольным выбором гражданина
- В) личным делом каждого гражданина
- Г) ответственностью человека перед обществом

100. [Т000168] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья
- Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

101. [Т000169] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) созданием условий для занятий физической культурой и спортом
- Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

102. [Т000170] ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ

- А) созданием условий для ведения здорового образа жизни
- Б) путем проведения обязательной иммунопрофилактики
- В) путем информирования о новых достижениях в области лечения заболеваний
- Г) путем проведения рекламы специализированных видов питания

103. [Т000180] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В:

- А) два этапа
- Б) один этап
- В) три этапа
- Г) четыре этапа

104. [Т000181] ЦЕЛЬ ОСМОТРА И ОБСЛЕДОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, ВРАЧЕМ-ГИНЕКОЛОГОМ, ВРАЧЕМ-УРОЛОГОМ:

- А) раннее выявление и профилактика развития заболеваний, которые приводят к нарушениям репродуктивной сферы
- Б) разработка программ оздоровления, лечения и реабилитации с учетом выявленных заболеваний
- В) динамическое диспансерное наблюдение за детьми группы риска
- Г) раннее выявление групп риска по развитию хронических заболеваний

105. [Т000182] ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 раз в год
- Б) 1 раз в 3 месяца
- В) 1 раз в полгода
- Г) 1 раз в 2 года

106. [Т000183] МАРШРУТНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) РАЗРАБОТАНА ДЛЯ

- А) пациента
- Б) врача, проводящего диспансеризацию
- В) медицинской сестры
- Г) контролирующего органа

107. [Т000184] ЦЕЛЬЮ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) укрепление и сохранение здоровья человека, предупреждение заболеваний
- Б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- В) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Г) поддержание качества жизни пациентов

108. [Т000185] ЦЕЛЬЮ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска
- Б) достижение длительной и стойкой ремиссии при хроническом заболевании
- В) проведение реабилитационных мероприятий

Г) восстановление трудоспособности пациента

109. [T000186] ЦЕЛЬЮ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) максимально возможная компенсация утраченных жизненных функций

Б) устранение факторов риска возникновения заболевания

В) сохранение здоровья у людей из групп риска, подверженных неблагоприятному воздействию факторов риска

Г) система мер, направленных на профилактику перехода заболеваний в хронические формы

110. [T000187] ЗАДАЧАМИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

А) формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья, предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

Б) раннее выявление отклонений в работе организма, их коррекция, укрепление адаптационных возможностей организма

В) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений, развития декомпенсации, инвалидности, смертности

Г) организация и проведение курсов профилактического лечения

111. [T000188] ЗАДАЧАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) предупреждение прогрессирования заболевания, его обострений, осложнений

Б) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

В) предупреждение неблагоприятного влияния погодных условий на здоровье

Г) формирование потребности изменения приоритетов в жизни

112. [T000189] ЗАДАЧАМИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) максимальное восстановление качества жизни пациента

Б) предупреждение прогрессирования заболевания

В) сохранение и развитие условий, способствующих улучшению здоровья

Г) предупреждение неблагоприятного влияния условий и образа жизни на здоровье

113. [T000190] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

А) люди из групп риска

Б) пациенты с острыми заболеваниями

В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

Г) пациенты с хроническими формами заболеваний

114. [T000191] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

А) пациенты с хроническими формами заболеваний

Б) здоровые лица с факторами риска развития заболеваний

В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

Г) люди из групп риска

115. [T000192] ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

А) пациенты с хроническими формами заболеваний

Б) пациенты с факторами риска заболеваний

В) выздоравливающие после перенесенных острых заболеваний

Г) люди из групп риска

116. [T000193] ЗА ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ ДЛИНА ТЕЛА ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В СРЕДНЕМ НА (___СМ)

А) 20-25

Б) 25-30

В) 15-20

Г) 12-15

117. [T000194] ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (___%)

А) 6-10

Б) 5-6

В) 10-12

Г) 3-5

118. [T000195] ОРИЕНТИРАМИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ ГРУДНОГО РЕБЕНКА СЗАДИ ЯВЛЯЮТСЯ

А) затылочные бугры

Б) область ниже затылочных бугров

- В) область над затылочными буграми
Г) теменные бугры
119. [T000196] ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ
А) закрытый большой родничок
Б) рост 65 см
В) масса тела 8,0 кг
Г) окружность головы 40 см
120. [T000197] ДЛЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 7 ДНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ
А) длительный сон
Б) длительное бодрствование
В) мышечная гипотония
Г) обильное (более 40 мл) срыгивание после каждого кормления
121. [T000200] РЕБЕНОК 4-Х МЕСЯЦЕВ ДОЛЖЕН УМЕТЬ
А) в положении на животе поднимать голову и верхнюю часть туловища
Б) переворачиваться с живота на спину
В) самостоятельно садиться
Г) ползать
122. [T000201] РЕБЕНОК ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ГОВОРIT ОКОЛО 10 СЛОВ, НАЧИНАЕТ ПОНИМАТЬ ЗАПРЕТ, ПРИУЧАЕТСЯ К НАВЫКАМ ОПРЯТНОСТИ В ВОЗРАСТЕ
А) 12 месяцев
Б) 9 месяцев
В) 1 год 6 месяцев
Г) 1 год 9 месяцев
123. [T000231] ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
А) кормлении грудным молоком
Б) как можно более раннем использовании соков для коррекции питания
В) кормлении кисломолочными смесями
Г) тщательной термической обработке пищевых продуктов
124. [T000233] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ
А) большим содержанием воды
Б) большим содержанием минеральных веществ
В) большей плотностью
Г) большей ломкостью
125. [T000234] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ
А) меньшим содержанием минеральных веществ
Б) большим содержанием минеральных веществ
В) большей плотностью
Г) большей ломкостью
126. [T000235] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ
А) большей эластичностью
Б) большим содержанием минеральных веществ
В) большей плотностью
Г) большей ломкостью
127. [T000236] КОСТНАЯ ТКАНЬ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОСТНОЙ ТКАНИ ВЗРОСЛЫХ
А) большей упругостью
Б) большим содержанием минеральных веществ
В) большей плотностью
Г) большей ломкостью
128. [T000237] К ОСОБЕННОСТЯМ ДЫХАНИЯ ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ
А) уменьшение частоты дыхательных движений
Б) переход на диафрагмальный тип дыхания
В) зависимость частоты дыхательных движений от физической нагрузки
Г) произвольное изменение частоты дыхательных движений
129. [T000238] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ

- А) все лица, которым сведения, составляющие врачебную тайну стали известны при исполнении профессиональных обязанностей
- Б) только медицинские работники, имеющие высшее медицинское образование и свидетельство об аккредитации специалиста
- В) только медицинские и фармацевтические работники, имеющие высшее и среднее медицинское образование
- Г) только должностные лица медицинской организации, имеющие свидетельство об аккредитации специалиста

130. [Т000239] С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ДОПУСКАЕТСЯ

- А) в целях медицинского обследования и лечения пациента, проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе и в иных целях
- Б) только в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю
- В) только в целях осуществления уполномоченными федеральными органами исполнительной власти контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности
- Г) только в целях информирования представителей страховых медицинских организаций

131. [Т000240] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) обмена информацией медицинскими организациями, в целях оказания медицинской помощи
- Б) письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- В) письменного обращения представителей средств массовой информации при наличии аккредитации
- Г) письменного обращения адвоката при наличии нотариально оформленной доверенности на ведение судебного дела

132. [Т000241] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

- А) угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений
- Б) наличии письменного обращения близких родственников пациента, в случае его смерти
- В) наличии обращения представителей средств массовой информации, с разрешения руководителя медицинской организации
- Г) наличии письменного обращения адвоката, представившего нотариально оформленную доверенность на ведение судебного дела

133. [Т000242] ПО ЗАПРОСУ АДВОКАТА ИНФОРМАЦИЯ, СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗГЛАШЕНА С

- А) письменного согласия пациента на сообщение сведений, составляющих врачебную тайну
- Б) разрешения руководителя медицинской организации и врачебной комиссии
- В) разрешения органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за качеством и безопасностью медицинской деятельности
- Г) письменного разрешения лечащего врача и руководителя медицинской организации

134. [Т000243] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЮТ

- А) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- Б) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении
- В) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья близких родственников пациента
- Г) только сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина, обратившегося за медицинской помощью и сведения о состоянии здоровья законных представителей пациента

135. [Т000247] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) носить обувь на низком каблуке
- Б) носить обувь с высоким голенищем
- В) носить обувь на высоком каблуке
- Г) носить обувь без каблука

136. [Т000248] В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- А) холестерин
- Б) аскорбиновую кислоту
- В) каротин

- Г) соли кальция
137. [T000249] ПРИ ВОЗРАСТНОЙ ЭМФИЗЕМЕ У ЧЕЛОВЕКА ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С
- А) дыханием
 - Б) питанием
 - В) питьем
 - Г) выделениями
138. [T000250] БОЛЕВАЯ, ТАКТИЛЬНАЯ И ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
- А) снижается
 - Б) повышается
 - В) не изменяется
 - Г) отсутствует
139. [T000251] ОСТРОТА ЗРЕНИЯ, ОСТРОТА СЛУХА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
- А) снижается
 - Б) не изменяется
 - В) повышается
 - Г) незначительно повышается
140. [T000253] ИЗУЧЕНИЕМ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЗАНИМАЕТСЯ
- А) геронтология
 - Б) гериатрия
 - В) танатология
 - Г) геронтофармакология
141. [T000256] НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН НАБЛЮДАЮТСЯ В
- А) строении таза
 - Б) строении трубчатых костей
 - В) соотношении минеральных и органических веществ костной ткани
 - Г) строении мышц
142. [T000257] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- А) наследственная предрасположенность
 - Б) курение табака
 - В) нерациональное питание
 - Г) гиподинамия
143. [T000258] ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ
- А) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
 - Б) борьбу за чистоту среды обитания
 - В) творчество, как источник положительных эмоций
 - Г) регулярные профилактические осмотры
144. [T000260] ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВЕРШЕННЫМ В СЛУЧАЕ
- А) осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.
 - Б) осмотра работника всеми врачами-специалистами
 - В) выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований
 - Г) при выполнении 50% от запланированных исследований и консультаций специалистов
145. [T000261] К ПЕРВОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ
- А) здоровые и имеющие небольшие отклонения, не требующие коррекции
 - Б) с хронической патологией в стадии компенсации
 - В) здоровые, а также с отягощенным биологическим анамнезом
 - Г) из группы риска без признаков заболевания
146. [T000262] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ГРАЖДАНИНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
- А) обязательно
 - Б) не имеет значения
 - В) не обязательно
 - Г) оформляется по требованию пациента
147. [T000266] ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) снижением тонуса мочеточников
- Б) увеличением вместимости мочевого пузыря
- В) повышением тонуса мочеточников
- Г) более редким мочеиспусканием

148. [T000267] ПРИ СТАРЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МОЧЕВЫДЕЛЕНИЯ

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) снижением почечного кровотока
- Б) увеличением вместимости мочевого пузыря
- В) повышением тонуса мочеточников
- Г) более редким мочеиспусканием

149. [T000268] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) остеопороз
- Б) укорочение
- В) размягчение
- Г) обызвествление

150. [T000269] ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ В МИНУТУ

- А) 16-20
- Б) 25-30
- В) 35-40
- Г) 45-50

151. [T000271] НОЧЬЮ НЕОБХОДИМОСТЬ В МОЧЕИСПУСКАНИИ У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВОЗНИКАЕТ НЕ БОЛЕЕ

- А) 1 раза
- Б) 2 раз
- В) 3 раз
- Г) 4 раз

152. [T000272] ПЕРИОД ДЕТСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- А) от рождения до 18 лет
- Б) от рождения до 17 лет
- В) от рождения до 15 лет
- Г) от рождения до 14 лет

153. [T000273] ПЕРВОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ К ГРУДИ ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- А) в первые 30 минут
- Б) через 2-3 часа
- В) через 6 часов
- Г) через 10-12 часов

154. [T000279] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ПО МОНИТОРИНГУ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 3-Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) патронаж к ребенку до 1 года жизни
- Б) анкетирование родителей
- В) чтение лекций
- Г) беседы с родителями

155. [T000289] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ ТАКИЕ ВИДЫ КАК

- А) первичная, вторичная, третичная
- Б) начальная, конечная
- В) текущая, заключительная
- Г) противоэпидемическая, предварительная

156. [T000295] СТРОГИЙ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ РАЦИОН ПИТАНИЯ ПРИВОДИТ К ДЕФИЦИТУ

- А) животного белка
- Б) углеводов
- В) клетчатки
- Г) витаминов

157. [T000299] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) сахарный диабет, ожирение
- Б) гипохолестеринемия, гепатоз

- В) пониженная масса тела, гипотония
Г) высокий уровень билирубина и ферментов в крови
158. [T000300] С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ АТЕРОСКЛЕРОЗА В ДИЕТУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ ВКЛЮЧАТЬ ПРОДУКТЫ
- А) морскую капусту, мясо кальмаров
Б) баранину, индейку
В) свинину, конину
Г) колбасу, бекон
159. [T000304] В ПОКОЕ ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ
- А) 16-20
Б) 12-15
В) 10-14
Г) 8-10
160. [T000312] В НОРМЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ)
- А) 40
Б) 32
В) 24
Г) 18
161. [T000321] ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ
- А) быстром переходе из горизонтального положения в вертикальное
Б) быстром переходе из вертикального положения в горизонтальное
В) длительной ходьбе
Г) быстрой ходьбе
162. [T000322] ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (__ ККАЛ)
- А) 1700-1900
Б) 2000-2300
В) 2800-3000
Г) 3000-3200
163. [T000323] К АЛИМЕНТАРНЫМ ГЕРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ
- А) овощи и фрукты
Б) макаронные изделия
В) мясо и рыба
Г) хлебобулочные изделия
164. [T000325] ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕОБХОДИМО С ЦЕЛЬЮ
- А) профилактики травматизма
Б) создания комфортных условий
В) улучшения передвижения
Г) создания уюта
165. [T000326] К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА, ОТНОСЯТСЯ
- А) сыр, творог
Б) овощи и фрукты
В) крупы, макароны
Г) маргарин, майонез
166. [T000327] К ПРОДУКТАМ, СОДЕРЖАЩИМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УГЛЕВОДОВ, ОТНОСЯТСЯ
- А) крупы
Б) растительные масла
В) орехи
Г) морепродукты
167. [T000329] ТРЕНИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ ОБЛАДАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ
- А) 30 и более минут 5 раз в неделю
Б) 20 минут 1-2 раза в неделю
В) 10 минут 3 раза в неделю
Г) 10 минут 4 раза в день
168. [T000331] УВЕЛИЧЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- А) никтурией
- Б) полиурией
- В) пиурией
- Г) дизурией

169. [Т000333] К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕРЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ

- А) веса, роста
- Б) ЧСС, АД
- В) спирометрии, ЭКГ
- Г) динамометрии, спирометрии

170. [Т000334] ДИНАМОМЕТРИЯ ОЦЕНИВАЕТ СИЛУ МЫШЦ

- А) кисти
- Б) спины
- В) ног
- Г) туловища

171. [Т000335] КАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЯЙЦА ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИЕ НАПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) радиоизотопной диагностики

172. [Т000336] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭНТЕРОБИОЗА ПЕРИАНАЛЬНЫЙ СОСКОБ НАПРАВЛЯЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) клиническую
- Б) бактериологическую
- В) иммунологическую
- Г) цитостатическую

173. [Т000338] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ

- А) в кардиологическое отделение
- Б) в нейрососудистое отделение
- В) в терапевтическое отделение
- Г) в реабилитационное отделение

174. [Т000339] МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, В КОТОРОЙ ОКАЗЫВАЮТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кардиологический центр
- Б) врачебная амбулатория
- В) поликлиника
- Г) участковая больница

175. [Т000341] ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АНУРИЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- А) гемодиализ
- Б) переливание крови
- В) цистостомия
- Г) паранефральная блокада

176. [Т000342] ПРИ ДИФФУЗНО – ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ГОРМОНОВ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ

- А) биохимическую
- Б) клиническую
- В) бактериологическую
- Г) цитологическую

177. [Т000344] ПАЦИЕНТАМ С ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- А) ангиохирурга
- Б) невропатолога
- В) терапевта
- Г) офтальмолога

178. [Т000345] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЖАЛОБ НА РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-

- А) офтальмолога

- Б) онколога
В) невропатолога
Г) терапевта
179. [Т000346] ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ
А) медико-социальную экспертизу
Б) обследование
В) лечение
Г) реабилитацию
180. [Т000347] ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-
А) ортопеда
Б) терапевта
В) невропатолога
Г) хирурга
181. [Т000348] ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ РЕТИНОПАТИЕЙ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-
А) офтальмолога
Б) невропатолога
В) терапевта
Г) хирурга
182. [Т000349] ПРИ ГАНГРЕНЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПАЦИЕНТА ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В ОТДЕЛЕНИЕ
А) хирургическое
Б) эндокринологическое
В) терапевтическое
Г) нейро-сосудистое
183. [Т000351] КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ В
А) клиничко-диагностическую лабораторию
Б) биохимическую лабораторию
В) бактериологическую лабораторию
Г) цитологическую лабораторию
184. [Т000352] МАЗОК ИЗ ГНОЙНОЙ РАНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ФЛОРУ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) бактериологическую
Б) клиническую
В) вирусологическую
Г) биохимическую
185. [Т000354] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ПАЦИЕНТА С ТРАВМАМИ ПОСЛЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ В
А) отделение полиции
Б) травмпункт
В) управление МЧС
Г) управление Роспотребнадзора
186. [Т000355] УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРОВОДИТСЯ В
А) кабинете функциональной диагностики
Б) физиотерапевтическом кабинете
В) кабинете электрокардиографии
Г) рентгенологическом кабинете
187. [Т000356] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ КАЛ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) клиническую
Б) бактериологическую
В) иммунологическую
Г) цитологическую
188. [Т000358] ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ ПО ПОВОДУ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КИСТИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ В
А) травмпункте по месту жительства
Б) травматологическом отделении
В) хирургическом отделении

- Г) ортопедическом отделении
189. [Т000359] ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ ДАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ В
А) хирургическое отделение
Б) дневной стационар
В) профилакторий
Г) палату интенсивной терапии
190. [Т000360] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЖЕЛУДКЕ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТ НАБЛЮДАЕТСЯ У
А) врача-хирурга в поликлинике
Б) врача-онколога в диспансере
В) врача-невролога
Г) врача-терапевта
191. [Т000361] ДИЕТУ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЕТ
А) врач-хирург
Б) диетическая сестра
В) врач-терапевт
Г) врач-кардиолог
192. [Т000362] ПОСТРАДАВШИЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ
А) травматологическое или нейрохирургическое
Б) интенсивной терапии и реанимации
В) хирургическое
Г) реанимационное
193. [Т000363] К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ОТНОСИТСЯ
А) компьютерная томография
Б) ультразвуковое исследование
В) спирография
Г) электрокардиография
194. [Т000364] ПАЦИЕНТУ ПОСЛЕ АППЕНДЭКТОМИИ НАЗНАЧАЕТСЯ
А) физиотерапия
Б) лечебная ходьба
В) иглорефлексотерапия
Г) электростимуляция
195. [Т000366] ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПАЦИЕНТУ ДАЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
А) диете
Б) профессии
В) режиму отдыха
Г) виду увлечений
196. [Т000367] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НАПРАВЛЯЮТ В
А) Роспотребнадзор
Б) отделение полиции
В) родственникам пациента
Г) миграционную службу
197. [Т000368] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАЗНАЧАЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
А) врача-эндокринолога
Б) врача-терапевта
В) врача-невролога
Г) врача-офтальмолога
198. [Т000369] ПРИ ЗАБОРЕ КРОВИ НА ГЕМОКУЛЬТУРУ НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) бактериологическую
Б) вирусологическую
В) клиническую
Г) биохимическую
199. [Т000370] ПАЦИЕНТУ С ВЫРАЖЕННЫМ КАШЛЕМ ПРОВОДИТСЯ
А) рентгенография

- Б) ультразвуковое исследование
В) эхокардиография
Г) реоэнцефалография
200. [Т000371] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ШИГЕЛЛЕЗ АНАЛИЗ КАЛА НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) бактериологическую
Б) биохимическую
В) клиническую
Г) вирусологическую
201. [Т000373] ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ГРИППА БОЛЬНОГО НАПРАВЛЯЮТ
А) в инфекционный стационар
Б) в больницу общего профиля
В) в центр санэпиднадзора
Г) в профилакторий
202. [Т000374] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ МАЗОК ИЗ ЗЕВА И НОСА НА VL НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) бактериологическую
Б) клиническую
В) биохимическую
Г) вирусологическую
203. [Т000375] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПИЩЕВУЮ ТОКСИКОИНФЕКЦИЮ, МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТПРАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) бактериологическую
Б) клиническую
В) вирусологическую
Г) иммунологическую
204. [Т000376] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ГЕМОРРАГИЧЕСКУЮ ЛИХОРАДКУ ОФОРМЛЯЕТСЯ НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ В ОТДЕЛЕНИЕ
А) инфекционное
Б) хирургическое
В) травматологическое
Г) неврологическое
205. [Т000377] ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ МОЧУ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДОСТАВЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) клиническую
Б) вирусологическую
В) бактериологическую
Г) иммунологическую
206. [Т000379] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЧЕСОТКИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К
А) врачу-дерматологу
Б) врачу-инфекционисту
В) врачу-педиатру
Г) врачу-аллергологу
207. [Т000380] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В
А) противотуберкулезный диспансер
Б) инфекционный стационар
В) пульмонологическое отделение стационара
Г) кожно-венерологический диспансер
208. [Т000381] БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ ГОСПИТАЛИЗИРУЮТ В
А) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы
Б) полубокс отделение детской инфекционной больницы
В) общую палату стационара специализированной медицинской помощи
Г) отделение интенсивной терапии соматического стационара
209. [Т000382] БОЛЬНОМУ С РОЖИСТЫМ ВОСПАЛЕНИЕМ КОЖИ В ФАЗЕ РЕМИССИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ
А) бициллинотерапии
Б) биохимического исследования крови
В) занятий лечебной физкультурой
Г) консультации гомеопата
210. [Т000383] ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПАЦИЕНТА

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

А) рентгенографию

Б) электрокардиографию

В) велоэргометрию

Г) реоэнцефалографию

211. [T000385] ПРИ ПРОМЫВАНИИ ЖЕЛУДКА ПЕРВУЮ ПОРЦИЮ ПРОМЫВНЫХ ВОД ОТПРАВЛЯЮТ В

А) лабораторию

Б) приемное отделение

В) патологоанатомическое отделение

Г) отделение функциональной диагностики

212. [T000386] ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-уролога

Б) врача-нефролога

В) врача-проктолога

Г) гастроэнтеролога

213. [T000388] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕЙКОЗ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-гематолога

Б) врача-кардиолога

В) врача-онколога

Г) врача-терапевта

214. [T000389] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОФОРМЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИЮ

А) биохимическую

Б) клиническую

В) цитологическую

Г) бактериологическую

215. [T000390] ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) машиной скорой медицинской помощи

Б) городским такси

В) личным транспортом родственников

Г) грузовым такси

216. [T000393] ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

А) онкологическом диспансере

Б) профилактории

В) здравпункте

Г) пансионате

217. [T000395] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПАЦИЕНТА С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ РАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ИЗВЕЩЕНИЕ В

А) отделение полиции

Б) службу МЧС

В) станцию переливания крови

Г) Министерство здравоохранения

218. [T000397] ПАЦИЕНТА С ОЖОГОМ ЛИЦА НЕОБХОДИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ В

А) ожоговое отделение

Б) глазное отделение

В) травматологическое отделение

Г) микрохирургическое отделение

219. [T000400] ПАЦИЕНТА С ВОСПАЛЕНИЕМ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА НАПРАВЛЯЮТ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

А) врача-невролога

Б) врача-офтальмолога

В) врача-оториноларинголога

Г) врача-терапевта

220. [T000402] ПАЦИЕНТУ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-офтальмолога

Б) врача-оториноларинголога

- В) врача-терапевта
Г) врача-хирурга
221. [Т000403] МОЧА НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЕТСЯ В ЛАБОРАТОРИЮ
А) клиническую
Б) бактериологическую
В) иммунологическую
Г) вирусологическую
222. [Т000404] БОЛЬНЫЕ, ПЕРЕНЕСШИЕ ИНСУЛЬТ, ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ У
А) врача-невролога в поликлинике по месту жительства
Б) врача-нейрохирурга
В) врача-участкового терапевта
Г) врача-физиотерапевта
223. [Т000406] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ, ВЫРАЖЕННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НЕОБХОДИМ ПЕРЕВОД В
А) специализированное психосоматическое отделение
Б) психо-неврологический санаторий
В) дневной стационар
Г) многопрофильный стационар
224. [Т000407] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
А) врача-онколога
Б) врача-гинеколога
В) врача-маммолога
Г) врача-рентгенолога
225. [Т000409] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОСЛЕРОДОВЫЙ МАСТИТ РОДИЛЬНИЦУ НАПРАВЛЯЮТ К
А) врачу-хирургу
Б) врачу-гинекологу
В) врачу-онкологу
Г) врачу-венерологу
226. [Т000410] ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТА ПЕРЕВОДЯТ В
А) кардиологический центр
Б) реанимационное отделение
В) больницу скорой медицинской помощи
Г) санаторий
227. [Т000411] ПАЦИЕНТУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ, ПРИ ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ЗАНЯТИЯ С
А) логопедом
Б) психологом
В) врачом-невропатологом
Г) врачом-неврологом
228. [Т000414] ПРОКАИН (НОВОКАИН) ОТНОСИТСЯ К
А) местным анестетикам
Б) нейролептикам
В) анальгетикам
Г) гемостатикам
229. [Т000416] ЛИДОКАИН
А) местный анестетик
Б) нейролептик
В) анальгетик
Г) анксиолитик
230. [Т000418] РАСТВОР АТРОПИНА СУЛЬФАТА 0,1% ОТНОСИТСЯ К
А) м-холиноблокаторам
Б) ганглиоблокаторам
В) ингибиторам ацетилхолинэстеразы
Г) альфа-адреномиметикам
231. [Т000424] ЭФЕДРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
А) симпатомиметиков

- Б) ганглиоблокаторов
 - В) ингибиторов ацетилхолинэстеразы
 - Г) миорелаксантов (курареподобных средств)
232. [Т000430] ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТУ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ИЛИ ДРУГИЕ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
- А) принимающие участие в медицинском обследовании и лечении
 - Б) по выбору пациента
 - В) по решению руководителя медицинской организации
 - Г) по решению врачебной комиссии медицинской организации
233. [Т000431] ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА
- А) пациенту, с его согласия
 - Б) любому заинтересованному лицу
 - В) близкому родственнику пациента
 - Г) попечителю пациента
234. [Т000442] ВАЛОКОРДИН
- А) седативное средство
 - Б) местный анестетик
 - В) антибиотик
 - Г) антисептик
235. [Т000444] ПИРАЦЕТАМ
- А) ноотроп
 - Б) местный анестетик
 - В) антибиотик
 - Г) антисептик
236. [Т000445] КОФЕИН
- А) психостимулятор
 - Б) местный анестетик
 - В) антибиотик
 - Г) антисептик
237. [Т000446] КОФЕИН
- А) аналептик
 - Б) местный анестетик
 - В) антибиотик
 - Г) антисептик
238. [Т000454] ПОРЦИЯ "В" ПРИ ДУОДЕНАЛЬНОМ ЗОНДИРОВАНИИ ЭТО
- А) содержимое желчного пузыря
 - Б) содержимое 12 перстной кишки
 - В) содержимое желудка
 - Г) желчь из печ.ночных протоков
239. [Т000455] ПРИ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ
- А) игла Дюфо
 - Б) троакар
 - В) аспиратор
 - Г) электроотсос
240. [Т000456] В ЗАДАЧИ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА НЕ ВХОДИТ
- А) проведение полного обследования
 - Б) при.м поступающих пациентов
 - В) санитарно-гигиеническая обработка поступивших пациентов
 - Г) транспортировка в лечебное отделение
241. [Т000457] ДОКУМЕНТ ПРИЁМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ГОСПИТАЛИЗИРОВАН ПАЦИЕНТ ИЛИ НЕТ
- А) журнал уч.та при.ма больных и отказов в госпитализации
 - Б) медицинская карта стационарного больного
 - В) статистическая карта выбывшего из стационара
 - Г) журнал уч.та инфекционных больных
242. [Т000458] РАСТВОРЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ
- А) 0,5% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
 - Б) 0,5% раствор новокаина, 10 % раствор натрия хлорида, вода для инъекций
 - В) 5% раствор глюкозы, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций
 - Г) 2% раствор новокаина, 0,9% раствор натрия хлорида, вода для инъекций

243. [T000460] ПРЕИМУЩЕСТВА ЭНТЕРАЛЬНОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
- А) простота в применении и возможность применения в любых условиях
 - Б) быстрота действия и частичная инактивация лекарства в печени
 - В) быстрота действия и исключение влияния на желудочно-кишечный тракт
 - Г) большая точность дозировки
244. [T000461] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЁТСЯ ПАЦИЕНТУ С ЦЕЛЬЮ
- А) облегчения оттока мокроты
 - Б) расширения бронхов
 - В) уменьшения одышки
 - Г) улучшения мозгового кровообращения
245. [T000462] В КАЧЕСТВЕ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ
- А) 0,02% раствор фурацилина
 - Б) 1% салициловый спирт
 - В) 3% раствор перекиси водорода
 - Г) Раствор бриллиантового зеленого
246. [T000463] ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ
- А) определение функционального состояния почек
 - Б) определение количества форменных элементов осадка мочи
 - В) определение микрофлоры мочи
 - Г) определение суточной глюкозурии
247. [T000464] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ (НАЛИЧИЕ КРОВИ) ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ
- А) сине-фиолетовое
 - Б) сине-зеленое
 - В) розовое
 - Г) бурое
248. [T000465] ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПРОЦЕДУРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) проведение парентеральных вмешательств
 - Б) непосредственный уход за больными
 - В) контроль выполнения врачебных назначений
 - Г) организация выписки, учета, хранения медикаментов и материалов
249. [T000466] ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ТОШНОТА, РВОТА, ПОЯВЛЕНИЕ ЖЕЛТУХИ НА 5-7 ДЕНЬ, ЭТО ПРИЗНАКИ
- А) гепатита А
 - Б) краснухи
 - В) СПИД
 - Г) бешенства
250. [T000467] ДИСБАКТЕРИОЗ ЭТО -
- А) нарушение количественного и качественного состава микрофлоры
 - Б) внутрибольничная инфекция
 - В) полное отсутствие микрофлоры
 - Г) инфекционное заболевание
251. [T000468] ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ К ОБСЛЕДОВАНИЮ НА ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА
- А) длительная дисфункция кишечника
 - Б) поступление в организованные коллективы (детский сад, школа, вуз)
 - В) работа в системе общественного питания
 - Г) сдача крови в качестве донора
252. [T000469] ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕЩЕНА НА
- А) информационном стенде медицинской организации
 - Б) сайте Государственной Думы РФ
 - В) сайте Роспотребнадзора
 - Г) информационном стенде Министерства здравоохранения РФ
253. [T000472] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ
- А) перед медицинским вмешательством

- Б) после первичного осмотра врачом
В) после медицинского вмешательства
Г) перед постановкой диагноза
254. [T000473] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОДПИСЫВАЕТСЯ
А) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и медицинским работником
Б) гражданином, одним из родителей или иным законным представителем и главным врачом
В) гражданином, законным представителем и руководителем медицинской организации
Г) гражданином, медицинским работником и представителем страховой медицинской организации
255. [T000475] СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БОЛЬНЫХ, СОСТОЯЩИХ НА ПИТАНИИ НА 9 ЧАСОВ УТРА, ПОДАЮТСЯ ДИЕТИЧЕСКОЙ СЕСТРЕ ПИЩЕБЛОКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А) старшими медицинскими сестрами отделений
Б) палатными сестрами отделений
В) заведующим отделением
Г) главной медсестрой
256. [T000477] ПОКАЗАНИЯМИ К НЕОТЛОЖНОМУ ПЕРЕВОДУ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР БОЛЬНОГО С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ
А) его непосредственная опасность для себя и окружающих
Б) галлюцинации, бред и нарушение сознания
В) снижение интеллекта, нарушение памяти
Г) астения, навязчивые состояния
257. [T000478] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕЛАНОМУ НЕОБХОДИМА
А) консультация врача-онколога
Б) криодеструкция
В) диатермокоагуляция
Г) обработка кожи 10% настойкой йода
258. [T000483] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БАЗАЛИОМУ КОЖИ НЕОБХОДИМА
А) консультация врача-онколога
Б) асептическая повязка
В) диатермокоагуляция
Г) смазывание ляписным карандашом
259. [T000484] ПОСТРАДАВШИХ С ВЫВИХОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАПРАВИТЬ В
А) травматологический пункт
Б) поликлинику
В) хирургический стационар
Г) стоматологический стационар
260. [T000485] ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СБОРОМ МОЧИ И ДОСТАВКОЙ В ЛАБОРАТОРИЮ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ
А) 4 часов
Б) 8 часов
В) 2 часов
Г) 1 часа
261. [T000486] ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЦИЕНТОВ В УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ИЗ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ В ЛЕЧЕБНОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
А) пешком
Б) на кресле-каталке
В) на каталке
Г) на носилках
262. [T000487] В БЛАНКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ БОЛЬНОГО В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ
А) домашний адрес
Б) отделение
В) диагноз
Г) возраст
263. [T000489] НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ ОФОРМЛЯЕТ
А) постовая медицинская сестра
Б) врач

- В) процедурная медицинская сестра
Г) лаборант
264. [T000490] КАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАВЛЕН В ЛАБОРАТОРИЮ ТЕПЛЫМ, В ТЕЧЕНИЕ 15-20 МИНУТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА
- А) простейшие
Б) бактериологическое исследование
В) яйца гельминтов
Г) копрологическое исследование
265. [T000491] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАДИОИЗОТОПНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ НЕОБХОДИМО
- А) исключить применение препаратов йода и брома
Б) проводить профилактику метеоризма
В) очистить кишечник
Г) исключить применение препаратов железа и висмута
266. [T000494] ДЛЯ УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ БЫЛ
- А) наполнен
Б) опорожнен с помощью катетера
В) опорожнен
Г) не имеет значения для проведения исследования
267. [T000497] ПУСТЫЕ АМПУЛЫ ИЗ-ПОД НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА
- А) сдать в поликлинику старшей медицинской сестре
Б) выбросить
В) оставить дома у пациента
Г) сдать хирургу-онкологу поликлиники
268. [T000500] ПАЦИЕНТ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА ПО ПОВОДУ ГЕПАТИТА В НАБЛЮДАЕТСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
- А) врача-инфекциониста
Б) врача-педиатра
В) врача-терапевта
Г) врача-гастроэнтеролога
269. [T000501] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ
- А) в прививочном кабинете
Б) в физиотерапевтическом кабинете
В) в процедурном кабинете
Г) в перевязочном кабинете
270. [T000502] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КЛЕЩА НАПРАВЛЕНИЕ ОФОРМЛЯЮТ
- А) в микробиологическую лабораторию
Б) в бактериологическую лабораторию
В) в клиническую лабораторию
Г) в биохимическую лабораторию
271. [T000503] САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ НА КУОРТАХ
- А) местного значения
Б) удаленных от дома
В) зарубежных
Г) в условиях горного климата
272. [T000505] ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКАСТЯМИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА
- А) поставить в известность старшую медицинскую сестру отделения, заведующего отделением
Б) обратиться к главному врачу
В) провести текущую уборку процедурного кабинета
Г) уволиться
273. [T000506] ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОМАНИИ ПРОВОДЯТ
- А) медицинские, педагогические работники и работники правоохранительных органов
Б) медицинские работники и работники правоохранительных органов
В) педагогические работники и работники правоохранительных органов
Г) работники правоохранительных органов
274. [T000508] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ

- А) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного объема и уровня
 - Б) получение медицинской помощи минимального объема
 - В) выплату пособия в случае временной утраты трудоспособности.
 - Г) бесплатное получение гражданами высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи
275. [Т000509] СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

- А) контролирует качество оказания медицинской помощи
- Б) контролирует качество оказания медицинской помощи при жалобах от пациентов
- В) участвует в лицензировании медицинских организаций
- Г) участвует в аттестации медицинских работников

276. [Т000510] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) составной частью государственной системы социального страхования
- Б) системой, направленной на повышение размеров оплаты труда
- В) страхованием от несчастных случаев
- Г) системой, направленной на защиту прав медицинских работников

277. [Т000516] МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ МУЖЧИНЫ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) 125 ударов в минуту
- Б) 155 ударов в минуту
- В) 175 ударов в минуту
- Г) 95 ударов в минуту

278. [Т000519] В КАБИНЕТЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ

- А) не нуждающихся во врачебном приеме
- Б) имеющих талоны к врачу на день обращения
- В) по самозаписи
- Г) с легкими формами заболевания

279. [Т000532] ОДЫШКА - ЭТО

- А) нарушение ритма, глубины, частоты дыхания
- Б) удлинение вдоха
- В) укорочение вдоха
- Г) удлинение выдоха

280. [Т000535] ПЕРИОД, КОГДА СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ УГАСАЮТ, НО ВОЗБУДИТЕЛЬ ЕЩЕ НАХОДИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) клиническим выздоровлением
- Б) микробоносительством
- В) микробиологическим выздоровлением
- Г) иммунологическим

281. [Т000536] ЕСЛИ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЛ ЭНЦЕФАЛИТОМ, КЛЕЩ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) переносчиком инфекции
- Б) фактором передачи инфекции
- В) входными воротами инфекции
- Г) механизмом передачи инфекции

282. [Т000538] СТЕРИЛИЗАЦИЮ ХИРУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОВОДЯТ В

- А) центральном стерилизационном отделении
- Б) предоперационной комнате
- В) специальном помещении операционного блока
- Г) хирургическом отделении

283. [Т000541] ЗАХОРОНЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИОННЫХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОВОДЯТ

- А) специализированные организации
- Б) операционные медицинские сестры
- В) младшие медицинские сестры
- Г) старшие медицинские сестры

284. [Т000542] ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ПРОИСХОДИТ

- А) за пределами территории учреждения здравоохранения
- Б) на территории учреждения здравоохранения
- В) на месте образования отходов
- Г) в специальных помещениях лечебного отделения

285. [T000543] ВЫВОЗ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ КЛАССА Д ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
- А) организациями по обращению с радиоактивными отходами
 - Б) организациями по обращению с бытовыми отходами
 - В) организациями по обращению с токсикологически опасными отходами
 - Г) организациями по обращению с промышленными отходами
286. [T000544] ТЕЛО УМЕРШЕГО ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В
- А) патологоанатомическое отделение
 - Б) приемное отделение
 - В) реанимационное отделение
 - Г) терапевтическое отделение
287. [T000546] ОБЪЕМ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ
- А) врач приемного отделения
 - Б) медицинская сестра смотрового кабинета
 - В) персонал санпропускника
 - Г) медицинская сестра приемного отделения
288. [T000547] ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР НАЗЫВАЕТСЯ
- А) стерилизацией
 - Б) дезинфекцией
 - В) дезинсекцией
 - Г) демеркуризацией
289. [T000551] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ
- А) заключительная
 - Б) очаговая
 - В) профилактическая
 - Г) текущая
290. [T000552] ИНФЕКЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ПРОЦЕСС ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ОРГАНЕ ИЛИ ТКАНИ, НАЗЫВАЮТСЯ
- А) очаговой
 - Б) экзогенной
 - В) генерализованной
 - Г) эндогенной
291. [T000553] ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗВАННОЕ ОДНИМ ВИДОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ, ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ
- А) моноинфекций
 - Б) смешанных инфекций
 - В) вторичных инфекций
 - Г) хронических инфекций
292. [T000554] К МЕХАНИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- А) влажная уборка помещений
 - Б) кипячение
 - В) ультрафиолетовое облучение
 - Г) использование формалина
293. [T000555] К ХИМИЧЕСКОМУ СПОСОБУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- А) использование формалина
 - Б) влажная уборка помещений
 - В) фильтрация воздуха
 - Г) ультрафиолетовое облучение
294. [T000556] К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА МИКРООРГАНИЗМЫ, ОТНОСИТСЯ
- А) температура
 - Б) фенол
 - В) хлорная известь
 - Г) спирт
295. [T000561] ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
- А) высокая надежность стерилизации
 - Б) высокий уровень ручного труда
 - В) большой объем инвестиций
 - Г) хранение обработанных медицинских изделий на стерильных столах
296. [T000564] ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ ЕЁ

А) 70% спиртом
Б) 3% перекисью водорода
В) 1% р-ром хлорамина
Г) 1-2 % р-ром протаргола
297. [Т000565] КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА
ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ

А) 10-12 литров
Б) 3-4 литра
В) 5-6 литров
Г) 7-8 литров

298. [Т000567] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭТО

А) комплексная просветительная, обучающая и воспитательная деятельность
Б) просветительная деятельность
В) обучающая деятельность
Г) воспитательная деятельность

299. [Т000568] КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) положительные изменения в состоянии здоровья
Б) расширение кругозора по медико-генетическим вопросам
В) обучение распознаванию признаков заболеваний
Г) выработка динамического стереотипа поведения в жизни

300. [Т000572] ВЫРАБОТКА СПОСОБНОСТИ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ,
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) умения
Б) знания
В) навыки
Г) убеждения

301. [Т000582] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

А) вторичной профилактикой
Б) первичной профилактикой
В) популяционной профилактикой
Г) социальной профилактикой

302. [Т000583] ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

А) общением между специалистом и пациентом
Б) общением специалиста с группой пациентов
В) общением между специалистом и большим количеством пациентов
Г) общением между группами специалистов

303. [Т000584] МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

А) общением между специалистом и большим количеством пациентов
Б) общением между специалистом и пациентом
В) общением специалиста с группой пациентов
Г) общением между группами специалистов

304. [Т000585] ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

А) общением специалиста с группой пациентов
Б) общением между группами специалистов
В) общением между специалистом и большим количеством пациентов
Г) общением между специалистом и пациентом

305. [Т000617] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

А) факторах риска
Б) лечении
В) симптомах
Г) диагностики

306. [Т000618] ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О

А) биологических особенностях возбудителя
Б) лечении
В) симптомах
Г) диагностики

307. [T000620] РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ

- А) всех медицинских работников
- Б) только средних медицинских работников
- В) только врачей
- Г) только врача общей практики

308. [T000621] РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА

- А) пациентов, находящихся в стационаре
- Б) взрослое население, проживающее на территории обслуживания стационара
- В) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- Г) работающую часть населения, проживающую на территории обслуживания стационара

309. [T000632] ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО

- А) профилю заболевания
- Б) составу обратившихся
- В) возрасту
- Г) половому составу

310. [T000634] ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

- А) врач, медицинская сестра, фельдшер
- Б) только медицинская сестра
- В) только фельдшер
- Г) только врач

311. [T000638] ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- Б) повышение информированности населения о мерах профилактики
- В) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- Г) сохранение здоровья

312. [T000641] К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) беседа
- Б) викторина
- В) дискуссия
- Г) доклад

313. [T000643] К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) беседа
- Б) муляж
- В) видеофильм
- Г) листовка

314. [T000644] К СРЕДСТВАМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) видеофильм
- Б) лекция
- В) дискуссия
- Г) беседа

315. [T000645] К СРЕДСТВАМ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) памятка
- Б) лекция
- В) беседа
- Г) фотография

316. [T000646] К СРЕДСТВАМ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) лекция
- Б) буклет
- В) рисунок
- Г) фантом

317. [T000648] К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА, ИСПОЛЪЗУЕМОГО ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ОТНОСИТСЯ

А) телепрограмма

Б) санитарный бюллетень

В) брошюра

Г) памятка

318. [Т000655] САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ

А) до рождения ребенка

Б) с первого года жизни ребенка

В) в детском саду

Г) в школе

319. [Т000656] ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К РОСТУ АБОРТОВ И РОДОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции

Б) экологическая ситуация

В) широкая доступность информации о половом воспитании

Г) избыточное использование контрацептивов

320. [Т000657] ПРИВИВАТЬ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ

А) родители

Б) воспитатели

В) учителя

Г) медицинские работники

321. [Т000658] СИСТЕМА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕР ПО ВОСПИТАНИЮ У ПОДРОСТКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВОПРОСАМ ПОЛА НАЗЫВАЕТСЯ

А) половым воспитанием

Б) санитарным воспитанием

В) гигиеническим воспитанием

Г) социальным воспитанием

322. [Т000663] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

А) формирования общественного мнения

Б) удовлетворения потребности в здоровом образе жизни

В) формирования умений

Г) формирования навыков

323. [Т000665] ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ

А) врач, медицинская сестра

Б) только врач

В) только медицинская сестра

Г) младший медицинский персонал

324. [Т000668] РОЖДЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДГОТОВКА ИХ К ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ ОТНОСИТСЯ К ФУНКЦИИ СЕМЬИ

А) репродуктивной

Б) рекреативной

В) воспитательной

Г) хозяйственно-экономической

325. [Т000669] ОДНОСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) доклад

Б) дискуссия

В) викторина

Г) игра

326. [Т000670] ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) дискуссия

Б) доклад

В) сообщение

Г) выступление

327. [Т000684] СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) школа пациентов

Б) углубленное консультирование

В) краткое консультирование

- Г) массовое консультирование
328. [T000694] ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ТРЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
- А) информировании, мотивировании, обучении пациента
 - Б) информировании, воспитании, обучении пациента
 - В) мотивировании, воспитании, обучении пациента
 - Г) информировании, мотивировании, воспитании пациента
329. [T000704] ИСТОЧНИКОМ ЖИРНЫХ КИСЛОТ .-6 И .-3 УЧАСТВУЮЩИХ В ЖИРОВОМ ОБМЕНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ
- А) растительное масло
 - Б) колбаса
 - В) свиное сало
 - Г) сметана
330. [T000705] ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В МИКРОНУТРИЕНТАХ (ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛАХ) ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- А) натуральные продукты, сбалансированные по составу
 - Б) рацион с повышенным содержанием белка животного происхождения
 - В) рафинированные углеводы
 - Г) рацион с повышенным содержанием жиров
331. [T000706] НУТРИЦЕВТИКИ (БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ) ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ
- А) направленного изменения состава пищи
 - Б) покрытия потребности в энергии
 - В) лечения заболеваний
 - Г) для профилактики рецидива заболевания
332. [T000707] ОСОБЕННОСТИ СОЛЕВОГО СОСТАВА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ЕЕ УПОТРЕБЛЕНИИ РАССМАТРИВАЮТ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ
- А) мочекаменной болезни
 - Б) анемии
 - В) диабета
 - Г) анорексии
333. [T000712] ПОКРАСНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПОВЫШЕНИИ КРОВЕНАПОЛНЕНИЯ, РАЗВИТИИ
- А) артериальной гиперемии
 - Б) венозной гиперемии
 - В) лимфостазе
 - Г) ишемии
334. [T000713] ЦИАНОЗ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ
- А) венозной гиперемии
 - Б) артериальной гиперемии
 - В) лимфостазе
 - Г) ишемии
335. [T000714] ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ
- А) ишемии
 - Б) лимфостазе
 - В) венозной гиперемии
 - Г) артериальной гиперемии
336. [T000715] ПОБЛЕДНЕНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ
- А) ишемии
 - Б) лимфостазе
 - В) венозной гиперемии
 - Г) артериальной гиперемии
337. [T000716] ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ
- А) лихорадка
 - Б) воспаление
 - В) дистрофия
 - Г) тромбоз
338. [T000717] ПОКРАСНЕНИЕ, БОЛЬ, ОТЕК ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ
- А) воспаления

- Б) дистрофии
В) тромбоза
Г) склероза
339. [T000718] ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ЖЕЛТУХЕ
А) желтый
Б) синий
В) красный
Г) бледный
340. [T000720] СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ
А) асцит
Б) анасарка
В) гидронефроз
Г) гидроцеле
341. [T000721] ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) Федеральный закон
Б) постановление Правительства РФ
В) приказ Министерства здравоохранения РФ
Г) постановление Верховного Суда РФ
342. [T000726] ПРИ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
А) руководителя медицинской организации, в которой он работает
Б) федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения
В) прокуратуру
Г) Роспотребнадзор региона
343. [T000728] ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА НЕ РЕГУЛИРУЕТ
А) сокращение мышечных волокон скелетных мышц
Б) тонус гладких мышц сосудов
В) тонус гладких мышц внутренних органов
Г) сокращения сердечной мышцы
344. [T000759] ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ БРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ
А) воспитанием и обучением детей
Б) контролем за транспортировкой питьевой воды
В) утилизацией бытовых отходов
Г) уборкой помещений
345. [T000760] НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОКАЗЫВАЕТ
А) мотивация к сохранению здоровья
Б) наследственность
В) трудовое воспитание
Г) художественный образ (герой фильма, литературный герой)
346. [T000766] К ЧИСЛУ ВАЖНЕЙШИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТНОСИТСЯ
А) гигиеническое обучение и воспитание населения для формирования здорового образа жизни, способствующего сохранению и укреплению здоровья
Б) создание и функционирование сети центров медицинской профилактики
В) участие в хосписном движении, волонтерстве
Г) запрет полового воспитания для детей школьного возраста
347. [T000767] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
А) артериальная гипертензия
Б) дизурия
В) анемия
Г) дорсопатия
348. [T000768] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
А) гиперхолестеринемия
Б) дизурия
В) анемия
Г) дорсопатия

349. [T000769] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) дислипидемия
- Б) дизурия
- В) анемия
- Г) дорсопатия

350. [T000770] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) гипергликемия
- Б) дизурия
- В) истерия
- Г) дорсопатия

351. [T000772] ПРИ СБАЛАНСИРОВАННОМ ПИТАНИИ В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ БЕЛКИ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ

- А) 10-15% от суточного рациона
- Б) не менее 25% от суточного рациона
- В) 30-40% от суточного рациона
- Г) 40-50 % от суточного рациона

352. [T000774] МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ В ВОЗРАСТЕ 75 ЛЕТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ

- А) 145 ударов в минуту
- Б) 125 ударов в минуту
- В) 175 ударов в минуту
- Г) 110 ударов в минуту

353. [T000782] СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА НА ТЕРРИТОРИИ РФ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 лет
- Б) 3 года
- В) 1 год
- Г) 10 лет

354. [T000791] НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СООТВЕТСТВУЕТ

- А) состоянию покоя (человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи)
- Б) 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
- В) 10 тысячам шагов в сутки
- Г) 20 тысячам шагов в сутки вне помещения

355. [T000792] УМЕРЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- А) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки
- Б) соответствует состоянию покоя в положении лежа или сидя
- В) составляет менее 10 тысяч шагов в сутки вне помещения
- Г) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает сильную одышку

356. [T000793] ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

- А) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки
- Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
- В) соответствует состоянию покоя в положении сидя или лежа
- Г) оставляет ощущение тепла и легкой одышки

357. [T000794] НАИБОЛЬШЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ

- А) углеводы
- Б) минеральные вещества
- В) белки
- Г) витамины

358. [T000795] ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО УМСТВЕННОМ ТРУДЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ФОРМОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) адекватная физическая нагрузка
- Б) пассивный отдых
- В) потребление дополнительного количества пищи
- Г) чтение, компьютерные игры

359. [T000796] ПАССИВНЫЙ ОТДЫХ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДОПУСТИМ

- А) после выполнения работы, связанной со значительными затратами физической энергии
Б) преимущественно при умственном труде
В) после длительного сна
Г) в выходные и праздничные дни
360. [Т000797] ОБЩИЙ УРОВЕНЬ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЕГО ГАРМОНИЧНОСТЬ У ГРУДНОГО РЕБЕНКА МОЖНО ОЦЕНИТЬ, ОПИРАЯСЬ НА
А) степень развития ведущей для данного возраста линии развития
Б) степень и быстроту прибавки массы тела
В) умение стоять и ходить
Г) данные антропометрических измерений
361. [Т000803] ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ
А) поддержку и поощрение к самостоятельности и самоутверждению
Б) опеку со стороны окружения
В) подавление стремления к самоутверждению и самостоятельности
Г) отказ от вмешательства в его воспитание
362. [Т000805] НОРМАЛЬНОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ – ЭТО
А) артериальное давление менее 140/90
Б) артериальное давление менее 130/85
В) артериальное давление менее 120/80
Г) артериальное давление менее 150/75
363. [Т000806] В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ СОДЕРЖАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ
А) не менее 400 гр.
Б) до 100 гр.
В) 300 гр.
Г) до 400 гр.
364. [Т000808] ДОПУСТИМАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ
А) 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива
Б) 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива
В) 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива
Г) 300 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива
365. [Т000809] ДОПУСТИМАЯ ДОЗА УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В СУТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ
А) 40 мл – крепкие спиртные напитки или 150 мл – столовое вино или 330 мл – пива
Б) 80 мл – крепкие спиртные напитки или 300 мл – столовое вино или 660 мл – пива
В) 100 мл – крепкие спиртные напитки или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива
Г) 150 мл – крепкого спиртного напитка или 500 мл – столовое вино или 1000 мл – пива
366. [Т000811] В ЭРЕКТИЛЬНОЙ СТАДИИ ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ
А) тахикардия
Б) брадикардия
В) брадикардия
Г) уремия
367. [Т000812] ПРИЗНАКОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) потеря сознания
Б) сохранность сознания
В) сохранность сухожильных рефлексов
Г) сохранность реакции на болевое воздействие
368. [Т000813] ОТЕК, НЕПОСРЕДСТВЕННО УГРОЖАЮЩИЙ ЖИЗНИ
А) отек Квинке
Б) гидроцеле
В) гидронефроз
Г) асцит
369. [Т000814] ПРИ РАНЕНИИ КРУПНЫХ ВЕН РАЗВИВАЕТСЯ ЭМБОЛИЯ
А) воздушная
Б) газовая
В) жировая
Г) тканевая
370. [Т000815] ОБЩИЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПРОТОК ОТКРЫВАЕТСЯ В КИШКУ
А) двенадцатиперстную

- Б) сигмовидную
 - В) тощую
 - Г) подвздошную
371. [Т000816] К ОДНОМУ ИЗ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ КИШКА
- А) сигмовидная
 - Б) двенадцатиперстная
 - В) подвздошная
 - Г) тощая
372. [Т000817] К ОДНОМУ ИЗ ОТДЕЛОВ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ КИШКА
- А) прямая
 - Б) двенадцатиперстная
 - В) тощая
 - Г) подвздошная
373. [Т000818] ТОПОГРАФИЧЕСКИ В ЖЕЛУДКЕ ВЫДЕЛЯЮТ
- А) кардиальный отдел
 - Б) основание
 - В) верхнюю часть
 - Г) нисходящую часть
374. [Т000819] К ЖЕЛУДКУ СЗАДИ ПРИЛЕЖИТ
- А) поджелудочная железа
 - Б) тощая кишка
 - В) правая почка
 - Г) двенадцатиперстная кишка
375. [Т000820] К МАССОВЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ
- А) радиопередача
 - Б) практическое занятие
 - В) беседа
 - Г) консультирование
376. [Т000822] К СРЕДСТВАУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БЕЗ ЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С НАСЕЛЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ
- А) радиопередача
 - Б) дискуссия
 - В) беседа
 - Г) лозунг
377. [Т000824] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОПАГАНДЕ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) санитарно-просветительная работа
 - Б) оздоровлением населения
 - В) воспитательной работай
 - Г) профилактикой заболеваний
378. [Т000826] ПРОГУЛКА ИЛИ БЕГ В СОЧЕТАНИИ С ОБЛИВАНИЕМ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ
- А) способы закаливания
 - Б) виды спорта
 - В) нетрадиционные методы лечения
 - Г) традиционные методы лечения
379. [Т000827] РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА С ВАНН
- А) воздушных
 - Б) соляных
 - В) водных
 - Г) солнечных
380. [Т000829] СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПИТАНИЯ – СООТНОШЕНИЕ
- А) белков, жиров, углеводов
 - Б) белков животного и растительного происхождения
 - В) жиров животного и растительного происхождения
 - Г) моносахаридов и полисахаридов
381. [Т000830] К ВОДОРАСТВОРИМЫМ ВИТАМИНАМ ОТНОСИТСЯ ВИТАМИН
- А) С
 - Б) А
 - В) Д

Г) Е

382. [Т000832] ГРУППЫ УПРАЖНЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ И ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМЫ

А) плавание

Б) гантельная гимнастика

В) прыжки в воду

Г) прыжки на батуте

383. [Т000834] «ПОГЛАЖИВАНИЕ», «РАСТИРАНИЕ», «ВИБРАЦИЯ», «ПИЛЕНИЕ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

А) массажа

Б) аутогенной тренировки

В) самовнушения

Г) идеомоторной тренировки

384. [Т000835] ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ИСХОДЯЩЕЕ ОТ МОНИТОРА

А) электромагнитные волны

Б) инфракрасные волны

В) ультрафиолетовые волны

Г) альфа-излучение

385. [Т000836] ПРИЧИНОЙ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН, КРОВОИЗЛИЯНИЙ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ НЕДОСТАТОК ВИТАМИНА

А) С

Б) Д

В) А

Г) В

386. [Т000837] УХУДШЕНИЕ ЗРЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С НЕДОСТАТКОМ В ПИЩЕ

А) витамина А

Б) белков

В) углеводов

Г) калия

387. [Т000845] ГРУДНОЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С

А) 29-го дня после рождения до конца первого года жизни

Б) 7-го дня после рождения до конца первого года жизни

В) рождения до конца первого года жизни

Г) 10-го дня после рождения до конца первого года жизни

388. [Т000847] ПРИЧИНОЙ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА

А) дрожжеподобные грибы

Б) стафилококк

В) кишечная палочка

Г) аллергическая реакция

389. [Т000849] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА ГИПЕРВОЗБУДИМОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

А) судорожная готовность

Б) снижение рефлексов

В) мышечная гипотония

Г) анорексия

390. [Т000850] ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ОКАЗЫВАЕТ

А) непрямого билирубин

Б) холестерин

В) глюкоза

Г) белок

391. [Т000851] НОВОРОЖДЕННОГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОРМИТЬ

А) по требованию ребенка

Б) 7 раз в сутки

В) 6 раз в сутки

Г) 8 раз в сутки

392. [Т000852] АСФИКСИЯ НОВОРОЖДЕННОГО ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)

А) 6-7

Б) 1-3

- В) 4-5
Г) 8-10
393. [Т000853] СРОКИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА
А) 3-7 день жизни
Б) 4-6 день жизни
В) 7-8 день жизни
Г) 8-9 день жизни
394. [Т000856] НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СЕПСИСА У НОВОРОЖДЕННЫХ
А) пузырчатка новорожденных
Б) потница
В) гемангиома
Г) аллергический дерматит
395. [Т000857] ТЯЖЕЛАЯ АСФИКСИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ОЦЕНКЕ ПО ШКАЛЕ АПГАР (В БАЛЛАХ)
А) 1-3
Б) 4-5
В) 6-7
Г) 8-10
396. [Т000858] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПАЛАТЕ ДЛЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО ДОЛЖНА БЫТЬ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)
А) 20-22
Б) 18-19
В) 25-26
Г) 27-29
397. [Т000859] ВОСПАЛЕНИЕ ПУПОЧНОЙ РАНКИ НОВОРОЖДЕННОГО НАЗЫВАЕТСЯ
А) омфалит
Б) дерматит
В) потница
Г) гемангиома
398. [Т000860] ЧАСТОТА КУПАНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО
А) ежедневно
Б) 2 раза в неделю
В) 1 раз в неделю
Г) 1 раз в 10 дней
399. [Т000861] СДАВЛЕННЫЙ "ПЕТУШИНЫЙ" КРИК НА ВДОХЕ У РЕБЕНКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
А) ларингоспазме
Б) бронхиальной астме
В) бронхите
Г) фарингите
400. [Т000862] СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПУЛЬСА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА (В МИН)
А) 140
Б) 170
В) 110
Г) 90
401. [Т000863] ПРИ РАХИТЕ В ОСНОВНОМ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ
А) фосфорно-кальциевого обмена
Б) обмена железа
В) жирового обмена
Г) углеводного обмена
402. [Т000864] ПРОДУКТ, СОДЕРЖАЩИЙ ВИТАМИН Д
А) рыбий жир
Б) ячневая крупа
В) морковь
Г) шпинат
403. [Т000865] К ПАРАТРОФИИ ОТНОСЯТСЯ СОСТОЯНИЯ
А) с избытком массы тела более 10%
Б) с избытком массы тела от 5 до 9%
В) с дефицитом массы тела более 10%
Г) с избытком массы тела и роста более 10%

404. [T000868] ГИПЕРЕМИЯ И ШЕЛУШЕНИЕ КОЖИ ЩЕК ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ НАЗЫВАЕТСЯ
А) молочным струпом
Б) строфулюсом
В) экземой
Г) гнейсом
405. [T000869] ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ОСТРИЦАМИ, НАЗЫВАЕТСЯ
А) энтеробиоз
Б) аскаридоз
В) трихоцефалез
Г) лямблиоз
406. [T000871] У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ В ПОКОЕ НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МИН)
А) 100
Б) 80
В) 60
Г) 120
407. [T000872] ГИПОТРОФИЯ – ЭТО РАССТРОЙСТВО ПИТАНИЯ
А) с дефицитом массы тела
Б) с нормальной массой тела
В) без нарушений массы тела
Г) с превышением массы тела
408. [T000876] ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КАНДИДОЗНОГО СТОМАТИТА
А) творожистые высыпания на слизистой полости рта
Б) молочный струп на лице
В) язвочки на слизистой полости рта
Г) боль при глотании и увеличение лимфоидной ткани
409. [T000877] АУТОИНВАЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ
А) энтеробиоза
Б) аскаридоза
В) трихоцефалеза
Г) для всех гельминтозов
410. [T000878] ГЕМОФИЛИЯ – ЭТО
А) наследственные нарушения свертывания крови
Б) заболевание, возникающее вследствие уменьшения количества тромбоцитов
В) инфекционно-аллергическое заболевание
Г) авитаминоз
411. [T000879] ХАРАКТЕР КАШЛЯ ПРИ ЛАРИНГОТРАХЕИТЕ
А) грубый, “лающий”
Б) продуктивный, влажный
В) сухой, навязчивый
Г) приступообразный
412. [T000880] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ
А) курение
Б) ОРВИ
В) переохлаждение
Г) гиповитаминоз
413. [T000881] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) пневмококк
Б) вирус
В) микоплазма
Г) стафилококк
414. [T000882] ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ ВОСПАЛЕНИЯ В РАСШИРЕННЫХ БРОНХАХ ЯВЛЯЕТСЯ
А) бронхоэктатическая болезнь
Б) абсцесс легкого
В) крупозная пневмония
Г) экссудативный плеврит
415. [T000883] ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ
А) бета-гемолитический стрептококк

- Б) хеликобактерпилори
 - В) кишечная палочка
 - Г) золотистый стафилококк
416. [Т000884] К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ
- А) высокий уровень холестерина
 - Б) занятия физической культурой
 - В) неотягощенная наследственность
 - Г) рациональное питание
417. [Т000885] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ
- А) аорта и крупные артерии
 - Б) венулы и крупные вены
 - В) соединительная ткань и суставы
 - Г) капилляры
418. [Т000886] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) гиподинамия
 - Б) гиповитаминоз
 - В) гипотония
 - Г) переохлаждение
419. [Т000887] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) атеросклероз коронарных артерий
 - Б) порок сердца
 - В) ревматический эндокардит
 - Г) ревматический миокардит
420. [Т000890] ПОЛИФАГИЯ - ЭТО
- А) чрезмерное потребление пищи
 - Б) чрезмерное потребление жидкости
 - В) повышенное выделение мочи
 - Г) уменьшение количества мочи
421. [Т000895] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫДЕЛЯЕТСЯ
- А) небольшое количество вязкой стекловидной мокроты
 - Б) большое количество гнойной мокроты
 - В) мокрота в виде «малинового желе»
 - Г) «ржавая» мокрота
422. [Т000896] ПАЦИЕНТ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ
- А) бронхоэктатической болезни
 - Б) экссудативном плеврите
 - В) крупозной пневмонии
 - Г) бронхиальной астме
423. [Т000897] ВОСПАЛЕНИЕ ЦЕЛОЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
- А) крупозной пневмонии
 - Б) остром бронхите
 - В) бронхиальной астме
 - Г) сухом плеврите
424. [Т000898] ОТЕКИ СЕРДЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ
- А) вечером на ногах
 - Б) утром на лице
 - В) вечером на лице
 - Г) утром на ногах
425. [Т000899] ТВЕРДЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ ПУЛЬС НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
- А) гипертоническом кризе
 - Б) коллапсе
 - В) кардиогенном шоке
 - Г) обмороке
426. [Т000900] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) боль в области сердца
 - Б) головная боль
 - В) снижение аппетита
 - Г) слабость
427. [Т000901] ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ
- А) острая боль в сердце

Б) выбухание вен шеи

В) удушье

Г) головная боль

428. [Т000902] ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

А) боль за грудиной продолжительностью более 20 минут

Б) низкое артериальное давление

В) брадикардия или тахикардия

Г) холодный пот и резкая слабость

429. [Т000903] ВЕДУЩИМИ ПРИЧИНАМИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ

А) стресс, хеликобактерная инфекция

Б) переохлаждение, переутомление

В) ОРВИ, переохлаждение

Г) гиповитаминоз, переутомление

430. [Т000904] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КАЛ БЫВАЕТ

А) дегтеобразный

Б) жирный

В) обесцвеченный

Г) кровавистый

431. [Т000907] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА МОЖЕТ БЫТЬ СПРОВОЦИРОВАНО

А) приемом жирной пищи

Б) острой респираторной вирусной инфекцией

В) приемом углеводов

Г) переохлаждение

432. [Т000908] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

А) боль в правом подреберье, горечь во рту

Б) отрыжка тухлым, рвота

В) рвота «кофейной гущей», мелена

Г) асцит, сосудистые звездочки

433. [Т000910] ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) пищеводное кровотечение

Б) желтуха

В) снижение аппетита

Г) кожный зуд

434. [Т000911] ПЕЧЕНОЧНАЯ КОЛИКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

А) желчнокаменной болезни

Б) гастрите

В) панкреатите

Г) язвенной болезни

435. [Т000913] ПРИЗНАК ИНФИЦИРОВАНИЯ КРОВИ ВО ФЛАКОНЕ

А) плазма мутная, с хлопьями

Б) плазма окрашена в розовый цвет

В) плазма прозрачная

Г) кровь 3-х слойная, плазма прозрачная

436. [Т000915] ОГРАНИЧЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ГНОЯ В ТКАНЯХ-

А) абсцесс

Б) гематома

В) флегмона

Г) атерома

437. [Т000917] ВОСПАЛЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ-ЭТО

А) лимфаденит

Б) гидраденит

В) лимфангит

Г) лимфаденопатия

438. [Т000918] ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ

А) костного мозга и кости

- Б) фаланг пальцев
 - В) коленного сустава
 - Г) венозных сосудов
439. [Т000921] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) патологическая подвижность костных отломков
 - Б) отек
 - В) деформация сустава
 - Г) деформация мягких тканей
440. [Т000922] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА
- А) пружинящая фиксация
 - Б) нарушение функции
 - В) боль
 - Г) гиперемия
441. [Т000923] РАНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ, ЕСЛИ
- А) повреждены мягкие ткани и пограничная серозная оболочка
 - Б) в ней находится инородное тело
 - В) повреждены только кожа и подкожная клетчатка
 - Г) повреждены мышцы и кости
442. [Т000924] МЕСТНЫЙ СИМПТОМ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ
- А) гиперемия кожи с четкими границами
 - Б) разлитое покраснение кожи
 - В) подергивание мышц
 - Г) инфильтрация с цианотичным оттенком кожи
443. [Т000928] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) проникновение в организм токсигенных микроорганизмов
 - Б) проникновение в организм непатогенной микрофлоры
 - В) нарушение личной гигиены
 - Г) употребление ядохимикатов с продуктами
444. [Т000929] ПРИЧИНОЙ ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) возможные осложнения с развитием неотложных состояний
 - Б) наличие свободных мест в стационаре
 - В) неадекватное поведение пациента
 - Г) бессознательное состояние пациента
445. [Т000931] СЫПНОЙ ТИФ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) наличием гепатолиенального синдрома
 - Б) постепенным началом болезни
 - В) высокой лихорадкой длительностью до 7-10 дней
 - Г) полиаденопатией
446. [Т000932] ПРИЧИНОЙ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ С МОЖЕТ БЫТЬ
- А) прямое переливание крови без обследования донора
 - Б) употребление недоброкачественной воды
 - В) употребление просроченных продуктов питания
 - Г) пользование общей посудой
447. [Т000934] ПРИЧИНОЙ НАЛОЖЕНИЯ КАРАНТИНА НА ГРУППУ ДЕТСКОГО САДА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) наличие контактных детей в группе
 - Б) перевод детей в другую группу
 - В) проведение дезинфекции
 - Г) бактериологическое обследование персонала
448. [Т000935] ОСНОВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) платяная вошь
 - Б) постельный клещ
 - В) травяной клещ
 - Г) комар
449. [Т000937] ИСТОЧНИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ БЕШЕНСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ
- А) собаки, лисы, кошки, волки
 - Б) утки, гуси
 - В) иксодовые клещи
 - Г) полевые мыши

450. [T000938] КОЛИЧЕСТВО МОЧИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ УМЕНЬШАЕТСЯ В
- А) олигурическом периоде
 - Б) лихорадочном периоде
 - В) полиурическом периоде
 - Г) период реконвалесценции
451. [T000941] НАЗОВИТЕ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ШИГЕЛЛЕЗА
- А) контактно-бытовой
 - Б) воздушно-капельный
 - В) парентеральный
 - Г) воздушно-пылевой
452. [T000942] НАЗОВИТЕ ВЕДУЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ГРИППА
- А) лихорадка, катаральные явления
 - Б) диспептические расстройства, цианоз
 - В) головная боль, головокружение
 - Г) тахикардия, одышка
453. [T000944] ЧАЩЕ ВСЕГО ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ БОЛЕЮТ ДЕТИ
- А) посещающие детские учреждения
 - Б) живущие в домашних условиях
 - В) с достаточным иммунитетом
 - Г) с нарушением слуха
454. [T000945] УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА А
- А) фекально-оральный
 - Б) аэрогенный
 - В) половой
 - Г) вертикальный
455. [T000946] К АНТРОПОЗООНОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
- А) сибирская язва, бешенство
 - Б) грипп, корь, рожа свиней
 - В) куриная холера, грипп
 - Г) сальмонеллез, холера
456. [T000947] ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) больной человек
 - Б) реконвалесцент
 - В) животные - резервуар вируса
 - Г) птицы-резервуар вируса
457. [T000948] ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНО
- А) невралгические боли
 - Б) разлитая гиперемия кожных покровов
 - В) зуд в ночное время
 - Г) отрубевидное шелушение
458. [T000950] ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОРОДАВОК ЯВЛЯЕТСЯ
- А) фильтрующий вирус
 - Б) стрептококк
 - В) аллергия организма
 - Г) заболевание пищеварительного тракта
459. [T000952] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ГОНОРЕИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) гнойные выделения из уретры
 - Б) лихорадка
 - В) зуд гениталий
 - Г) нарушения сна
460. [T000953] ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ОСТРОЙ АНГИНЫ
- А) боль при глотании
 - Б) нарушение носового дыхания
 - В) снижение слуха
 - Г) потеря голоса
461. [T000956] ВОСПАЛЕНИЕ ГОРТАНИ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) ларингит
 - Б) фарингит

- В) тонзиллит
Г) эзофагит
462. [T000958] ТИПИЧНАЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
- А) одиночество
Б) склонность к суициду
В) отказ от участия в общественной жизни
Г) злоупотребление алкоголем
463. [T000960] ОСНОВНЫЕ РАННИЕ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ:
- А) длительный субфебрилитет, покашливание
Б) одышка, "ржавая" мокрота
В) приступ удушья, стекловидная мокрота
Г) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
464. [T000965] ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) атеросклероз сосудов головного мозга
Б) психо - эмоциональное перенапряжение
В) нерациональное питание
Г) избыточный вес
465. [T000968] ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
- А) потеря зрения
Б) остеопороз
В) легочное кровотечение
Г) печеночная кома
466. [T000969] ПЯТНА БЕЛЬСКОГО-ФИЛАТОВА-КОПЛИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ НА
- А) слизистой оболочке щек
Б) туловище
В) конечностях
Г) лице
467. [T000971] ПРИЗНАКИ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ
- А) гиперемия, отек, усиление боли
Б) побледнение краев
В) промокание повязки кровью
Г) выходение кишечных петель под кожу
468. [T000972] ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗАНОЙ РАНЫ
- А) края ровные, зияет
Б) большая глубина, точечное входное отверстие
В) края неровные, вокруг кровоизлияние
Г) края неровные, зияет
469. [T000973] ХАРАКТЕР БЕЛЕЙ ПРИ ТРИХОМОНИАЗЕ
- А) пенистые, с неприятным запахом
Б) гнойные
В) творожистые
Г) кровянистые
470. [T000974] ДЛЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ХАРАКТЕРНО
- А) тремор кистей
Б) нарушение координации
В) умственная деградация
Г) параличи конечностей
471. [T000975] ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- А) приступообразные боли в одной половине лица
Б) ригидность затылочных мышц
В) рвота
Г) отсутствие складок на лбу при поднимании бровей
472. [T000976] ОЩУЩЕНИЕ "ТРЕСКА" В ШЕЕ ПРИ ПОВОРОТАХ ГОЛОВЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ
- А) остеохондроза
Б) энцефалита
В) опухоли головного мозга
Г) менингита
473. [T000977] НАИБОЛЕЕ ОБЩИЙ СИМПТОМ ШИЗОФРЕНИИ

А) отгороженность, отрыв от реальности, погружение в мир собственных переживаний

Б) амбулаторный автоматизм

В) маниакальное возбуждение

Г) отвлекаемость

474. [T000978] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ МЕСТА ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫПИ ПРИ ЧЕСОТКЕ

А) межпальцевые складки кистей

Б) слизистые оболочки

В) ладони и подошвы

Г) лицо

475. [T000979] ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ

А) пузырьки, эрозии, корки

Б) узелки, чешуйки, гиперпигментация

В) лихорадка, лимфаденит

Г) опоясывающие боли, зуд

476. [T000980] РАНЫ НАЗЫВАЮТСЯ СКВОЗНЫМИ, ЕСЛИ

А) имеются входное и выходное отверстия

Б) имеется только входное отверстие

В) имеется поверхностное повреждение мягких тканей, в виде желоба

Г) повреждена кожа

477. [T000981] ВОСПАЛЕНИЕ КРАЕВ ВЕК НАЗЫВАЕТСЯ

А) блефарит

Б) халазион

В) конъюнктивит

Г) ячмень

478. [T000982] ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛЛИНОЗНОГО (СЕННОГО) КОНЪЮНКТИВИТА ЯВЛЯЕТСЯ

А) аллергия

Б) травма

В) гиповитаминоз

Г) инфекция

479. [T000983] ДЛЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ ХАРАКТЕРНЫ

А) постепенное безболезненное падение зрения

Б) радужные круги вокруг источника света

В) выраженные распирающие боли в глазу

Г) острые приступы повышения внутриглазного давления

480. [T000985] ПЕРВИЧНЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ

А) пустула

Б) лихенизация

В) трещина

Г) рубец

481. [T000986] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ

А) симптом "тугой повязки"

Б) опистотонус

В) судорожное сокращение поперечнополосатых мышц

Г) стихание болей в ране

482. [T000991] ГИПЕРСАЛИВАЦИЯ – ЭТО

А) увеличение слюнообразования

Б) нарушение всасывания в кишечнике

В) расстройство переваривания в желудке

Г) нарушение желчевыделения

483. [T000993] АХОЛИЯ – ЭТО

А) нарушение поступления желчи в кишечник

Б) нарушение всасывания в кишечнике

В) расстройство переваривания в желудке

Г) уменьшение слюнообразования

484. [T000994] ОБСТРУКТИВНЫЙ СИНДРОМ – ЭТО

А) нарушение проходимости воздухоносных путей

Б) нарушение растяжимости легочной ткани

В) утолщение альвеоло-капиллярной мембраны

- Г) нарушение вентиляционно-перфузионных отношений
485. [Т001000] ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРИМЕНЯЮТ
- А) сальбутамол
 - Б) пропранолол (анаприлин)
 - В) метопролол
 - Г) бисопролол
486. [Т001003] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ РЕФЛЕКТОРНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ФУНКЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
- А) раствор аммиака
 - Б) морфин
 - В) налоксон
 - Г) фенобарбитал
487. [Т001008] ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИМЕНЯЮТ
- А) налоксон
 - Б) феназепам
 - В) афобазол
 - Г) диазепам
488. [Т001010] ПРЕПАРАТОМ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) парацетамол
 - Б) галоперидол
 - В) хлорпромазин (аминазин)
 - Г) флуоксетин
489. [Т001011] СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА
- А) ксенон
 - Б) парацетамол
 - В) кофеин
 - Г) эфедрин
490. [Т001015] СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО
- А) нитразепам
 - Б) пирацетам
 - В) налоксон
 - Г) ибупрофен
491. [Т001017] К БЛОКАТОРАМ СА-КАНАЛОВ ОТНОСИТСЯ
- А) верапамил
 - Б) метопролол
 - В) эналаприл
 - Г) лозартан
492. [Т001018] К ГРУППЕ НИТРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИБС, ОТНОСИТСЯ
- А) нитроглицерин
 - Б) ивабрадин
 - В) триметазидин
 - Г) верапамил
493. [Т001019] К ГИПОТЕНЗИВНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗ ГРУППЫ ИНГИБИТОРОВ АПФ ОТНОСИТСЯ
- А) эналаприл
 - Б) метопролол
 - В) лозартан
 - Г) нитроглицерин
494. [Т001021] К АНТИКОАГУЛЯНТАМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ
- А) гепарин
 - Б) алтеплаза
 - В) протамина сульфат
 - Г) клопидогрел
495. [Т001048] ГОНАДОТРОПНЫЙ ГОРМОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ В
- А) гипофизе
 - Б) надпочечниках
 - В) гипоталамусе
 - Г) яичниках
496. [Т001065] ПОДВЗДОШНАЯ КИШКА ИМЕЕТ

А) брыжейку

Б) сальниковые отростки

В) кишечные ленты

Г) гаустры

497. [Т001068] К ДОБАВОЧНОМУ СКЕЛЕТУ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ

А) кости верхних конечностей

Б) кости черепа

В) позвонки

Г) ребра и грудина

498. [Т001069] К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ

А) лучевая кость

Б) лопатка

В) грудина

Г) ребро

499. [Т001071] К ОТДЕЛУ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ОТНОСИТСЯ

А) ободочная кишка

Б) подвздошная кишка

В) тощая кишка

Г) двенадцатиперстная кишка

500. [Т001089] К МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА

А) устранение причин и условий возникновения заболеваний

Б) организацию производства

В) охрану труда работодателем

Г) систему средств массовой информации

501. [Т001096] В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

А) руководителя медицинской организации, в которой он работает

Б) федеральный орган исполнительной власти в сфере управления здравоохранением

В) органы прокуратуры

Г) федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

502. [Т001105] ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

А) введение лекарственных препаратов ингаляционным способом

Б) назначение диеты

В) создание возвышенного положения

Г) организация досуга ребенка

503. [Т001107] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО МЕТОДУ НЕЧИПОРЕНКО У РЕБЕНКА ДОСТАТОЧНО СОБРАТЬ

А) 10мл

Б) 100мл

В) 50мл

Г) суточное количество

504. [Т001108] ПРИ ГЕМОФИЛИИ ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕБЕНКУ ВВОДЯТСЯ ТОЛЬКО

А) внутривенно

Б) внутримышечно

В) подкожно

Г) внутрикочно

505. [Т001109] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У РЕБЕНКА ОТНОСЯТСЯ

А) бледность, ломкость ногтей, тусклые волосы, плохой аппетит, извращение вкуса

Б) гиперемия лица, ускоренный рост волос

В) бледность, ломкость ногтей и волос, увеличение селезенки, геморрагическая сыпь

Г) бледность, носовые кровотечения, извращение вкуса, поражение суставов

506. [Т001110] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) наследственность

Б) инфекция

- В) перегревание
Г) переохлаждение
507. [T001111] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
- А) проведении отвлекающих процедур
Б) введении эуфиллина внутривенно
В) введении антибиотиков внутримышечно
Г) проведении оксигенотерапии
508. [T001112] ЗУД В ПЕРИАНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
- А) энтеробиоза
Б) описторхоза
В) аскаридоза
Г) трихоцефалеза
509. [T001113] ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ У ДЕТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 38,5. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
- А) физическое охлаждение
Б) введение жаропонижающих
В) проведение промывания желудка
Г) постановка очистительной клизмы
510. [T001114] ГЕМАТУРИЯ, ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ И ОТЕЧНЫЙ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
- А) гломерулонефрита
Б) цистита
В) пиелонефрита
Г) нефроптоза
511. [T001115] ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВИБРАЦИОННОГО МАССАЖА ДЕТЯМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ЕГО
- А) через 30 минут после приема препарата, направленного на разжижение и выведение мокроты из верхних дыхательных путей
Б) в первый день заболевания
В) перед сном, через 30 минут после ужина
Г) через 30 минут после физиотерапевтического лечения
512. [T001116] КОМПЛЕКС ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ОЧИЩЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ СЛИЗИ И МОКРОТЫ ВКЛЮЧАЕТ
- А) постуральный дренаж
Б) лечебную физкультуру
В) проведение ингаляций
Г) постановку горчичников на грудную клетку
513. [T001119] ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) одышка
Б) повышение температуры
В) недомогание
Г) головная боль
514. [T001120] ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) приступ удушья с затрудненным выдохом
Б) кашель с выделением пенистой мокроты
В) одышка смешанного характера
Г) инспираторная одышка
515. [T001123] ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЦА ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ
- А) ограничить прием жидкости и соли
Б) увеличить прием жидкости и соли
В) ограничить прием белков и жиров
Г) увеличить прием белков и жиров
516. [T001124] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧАСТО ПОЯВЛЯЕТСЯ
- А) перемежающаяся хромота
Б) одышка
В) отеки
Г) слабость

517. [T001125] ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ

- А) почек
- Б) печени
- В) селезенки
- Г) желудочно-кишечного тракта

518. [T001126] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ

- А) каптоприла
- Б) адреналина
- В) преднизолона
- Г) гепарина

519. [T001127] ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ СТЕНОКАРДИИ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНИТЬ

- А) нитроглицерин под язык
- Б) кордиамин внутрь
- В) папаверин внутримышечно
- Г) мезатон внутривенно

520. [T001128] ПРИЗНАКОМ АТЕРОСКЛЕРОЗА АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) головная боль
- Б) загрудинная боль
- В) снижение аппетита
- Г) лихорадка

521. [T001129] ПРИ ОБМОРОКЕ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) горизонтальное, с приподнятым ножным концом
- Б) горизонтальное, без подушки
- В) сидя с опущенными ногами
- Г) горизонтальное, с приподнятым головным концом

522. [T001131] БОЛЬНОМУ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕОБХОДИМА ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

- А) в первый час
- Б) на 2-е сутки
- В) через 3-е суток
- Г) для профилактического лечения

523. [T001133] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЕРДЕЧНОЙ АСТМЕ

- А) наложить венозные жгуты на конечности
- Б) придать положение с приподнятым ножным концом
- В) поставить горчичники на грудную клетку
- Г) обложить грелками

524. [T001134] ПОЯВЛЕНИЕ НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОБИЛЬНОЙ ПЕНИСТОЙ РОЗОВОЙ МОКРОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

- А) отека легких
- Б) бронхиальной астмы
- В) крупозной пневмонии
- Г) легочного кровотечения

525. [T001135] ПРИ РАЗВИТИИ ПРИСТУПА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) полусидя с опущенными вниз ногами
- Б) горизонтальное
- В) горизонтальное с приподнятым ножным концом
- Г) горизонтальное с приподнятым головным концом

526. [T001136] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ У ПАЦИЕНТА ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) рвота в виде кофейной гущи
- Б) изжога
- В) дегтеобразный стул
- Г) рвота пищей, съеденной накануне

527. [T001137] ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО

- А) промыть желудок
- Б) положить грелку на живот
- В) поставить масляную клизму
- Г) провести дуоденальное зондирование

528. [T001138] ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЛЕЙКОЗЕ

- А) стерильная пункция
- Б) УЗИ печени
- В) биохимический анализ крови
- Г) пункция лимфоузла

529. [T001139] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НЕОБХОДИМО

- А) проводить дыхательную гимнастику, массаж
- Б) предложить средство, купирующие кашаи
- В) следить за соблюдением строгого постельного режима
- Г) запретить курение

530. [T001140] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА РВОТЫ «КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ» ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО

- А) срочно госпитализировать
- Б) наблюдать амбулаторно
- В) ввести анальгетики
- Г) направить в поликлинику

531. [T001141] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

- А) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- Б) сифонная клизма вечером
- В) масляная клизма утром
- Г) сифонная клизма за 2 часа до исследования

532. [T001142] ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПАЦИЕНТУ

- А) положить пузырь со льдом на живот
- Б) положить грелку на живот
- В) промыть желудок
- Г) поставить масляную клизму

533. [T001144] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ИЛИ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ К ВВЕДЕНИЮ

- А) инсулин короткого действия
- Б) клофелин
- В) папаверина гидрохлорид
- Г) гепарин

534. [T001145] ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) утренняя скованность мелких суставов
- Б) слабость
- В) одышка
- Г) боль в животе

535. [T001148] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) получить согласие пациента на проведение манипуляции
- Б) получить согласие лечащего врача
- В) не предупреждать пациента о манипуляции
- Г) вызвать дежурного врача

536. [T001149] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) информировать пациента о ходе проведения манипуляции
- Б) получить согласие старшей медицинской сестры на проведение манипуляции
- В) не предупреждать пациента о манипуляции
- Г) вызвать врача

537. [T001151] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОВОДЯТ

- А) бронхографию
- Б) флюорографию
- В) рентгенографию органов грудной клетки
- Г) спирометрию

538. [T001152] ПАЦИЕНТАМ С БРЮШНЫМ ТИФОМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА РЕКОМЕНДУЮТ

- А) продукты, богатые клетчаткой
- Б) массаж живота

- В) слабительные
Г) щадящую очистительную клизму
539. [T001153] ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ
А) диагностике IV стадии болезни
Б) на ранних стадиях
В) при отсутствии метастазов
Г) при наличии кровотечения
540. [T001155] ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
А) строгий постельный режим в течение 3-4 недель
Б) строгий постельный режим в течение 2 месяцев
В) палатный режим
Г) постельный режим
541. [T001156] "РЖАВЫЙ" ХАРАКТЕР МОКРОТЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ
А) крупозной пневмонии
Б) бронхиальной астме
В) остром бронхите
Г) сухом плеврите
542. [T001157] ДИЕТА ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ОГРАНИЧЕНИЕ
А) жидкости, соли, белков
Б) жидкости, углеводов, белков
В) соли, белков, жиров
Г) жидкости, жиров, белков
543. [T001158] ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТУ РЕКОМЕНДУЮТ
А) обильное витаминизированное питье
Б) принимать антибиотики
В) обеззараживать испражнения
Г) снижать температуру ниже 38 С
544. [T001159] ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА
А) сосудистые звездочки
Б) лакированный язык
В) узловая эритема
Г) ногти в виде «часовых стекол», пальцы в виде «барабанных палочек»
545. [T001161] ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ВЕЗИКУЛЫ НА КОЖЕ ОБРАБАТЫВАЮТ
А) 2% спиртовым раствором бриллиантового зеленого
Б) 2% раствором перекиси водорода
В) 5% спиртовым раствором йода
Г) камфорным спиртом
546. [T001162] УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ЗАДНЕШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ -
ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ
А) краснухи
Б) хронического тонзиллита
В) ветряной оспы
Г) ангины
547. [T001163] ПЯТНИСТО-ПАПУЛЕЗНАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ
А) кори
Б) ветряной оспы
В) менингококковой инфекции
Г) стафилококковой инфекции
548. [T001165] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ
А) обеспечение дробного питания
Б) проведение инфузионной терапии
В) наблюдение за контактными в течение 30 дней
Г) назначение постельного режима до 5-6 дня нормальной температуры
549. [T001167] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СИБИРСКУЮ ЯЗВУ ПЕРСОНАЛ НАДЕВАЕТ
А) противочумные костюмы
Б) маски
В) халаты, застегивающиеся сзади
Г) второй халат
550. [T001168] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ

ТОКСИКОИНФЕКЦИИ

- А) обильное питье
- Б) внутривенное введение жидкости
- В) дача антибиотиков
- Г) оксигенотеропия

551. [Т001169] ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПРИ БЕШЕНСТВЕ

- А) организация индивидуального медицинского поста
- Б) помещение пациента в общую палату
- В) иссечение краев раны
- Г) обеспечение физического метода охлаждения

552. [Т001170] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ЛЕГКОЙ ФОРМЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА

- А) уход при рвоте
- Б) внутримышечное введение ампициллина
- В) проведение витаминотерапии
- Г) парентеральное введение солевых растворов

553. [Т001171] ПРИ УХОДЕ ЗА РЕБЕНКОМ С ГИПОТРОФИЕЙ НЕОБХОДИМО

- А) обеспечить оптимальный двигательный режим
- Б) обеспечить полный физический покой
- В) создать гипоаллергенный быт
- Г) увеличить физическую нагрузку

554. [Т001173] ОБСЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ 3-Х МЕСЯЧНОМУ ЗДОРОВОМУ РЕБЕНКУ В ПОЛИКЛИНИКЕ

- А) клинический анализ крови и общий анализ мочи
- Б) анализ мочи и по Нечипоренко и общий анализ крови
- В) клинический анализ крови и определение фракций холестерина в сыворотки крови
- Г) тест толерантности к глюкозе и общий анализ мочи

555. [Т001174] ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У РЕБЕНКА В ЕГО ПИТАНИИ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИТЬ

- А) жидкость, поваренную соль
- Б) белки, углеводы
- В) жидкость, углеводы
- Г) белки, жиры

556. [Т001175] ПРИ УГРОЗЕ СТЕНОЗА ГОРТАНИ У РЕБЕНКА С ЛАРИНГОТРАХЕИТОМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ

- А) срочная госпитализация
- Б) направление в поликлинику
- В) проведение оксигенотерапии
- Г) выполнение физиотерапевтических процедур

557. [Т001179] ПАЛЬЦЫ В ВИДЕ «БАРАБАННЫХ ПАЛОЧЕК» И НОГТИ В ВИДЕ «ЧАСОВЫХ СТЕКОЛ» ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

- А) хронических заболеваниях дыхательной системы
- Б) острых заболеваниях дыхательной системы
- В) острых заболеваниях пищеварительной системы
- Г) хронических заболеваниях пищеварительной системы

558. [Т001180] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЁГКОГО ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) рентгенография органов грудной клетки
- Б) эхокардиография
- В) электрокардиография
- Г) спирография

559. [Т001182] ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ СТОРОНЕ ПРИ

- А) крупозной пневмонии
- Б) бронхиальной астме
- В) бронхоэктатической болезни
- Г) бронхите

560. [Т001183] ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) фиброгастроскопию
- Б) рентгенографию органов грудной клетки

- В) ультразвуковое исследование органов малого таза
Г) эхокардиографию
561. [T001184] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДИЕТА С
- А) ограничением жирных и соленых блюд
Б) повышенным количеством белка
В) механическим и химическим щажением
Г) пониженным количеством белка
562. [T001185] ДИЕТА ПРИ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРЕДПОЛАГАЕТ
- А) ограничение жидкости и соли
Б) увеличение жидкости и белков
В) ограничение жиров и углеводов
Г) увеличение жиров и белков
563. [T001186] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ
- А) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
Б) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
В) колющая боль в области сердца
Г) ноющая боль в области сердца
564. [T001187] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ РЕКОМЕНДУЮТ ОГРАНИЧИТЬ В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
- А) жиры животного происхождения
Б) железо
В) калий
Г) витамин С
565. [T001188] В ПЕРВЫЕ ДНИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ
- А) строгий постельный
Б) постельный
В) палатный
Г) общий
566. [T001189] В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ
- А) растительные жиры
Б) мясо и сливочное масло
В) кофе, крепкий чай
Г) продукты, богатые углеводами
567. [T001190] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЛАКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ
- А) витамины группы В
Б) растительную клетчатку
В) углеводы
Г) микроэлементы
568. [T001191] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИРРИГОСКОПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ
- А) постановка очистительной клизмы вечером и утром
Б) прием активированного угля
В) исключение из рациона продуктов, содержащих железо
Г) постановка очистительной клизмы вечером
569. [T001192] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К СБОРУ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ВКЛЮЧАЕТ
- А) полоскание рта кипяченой водой
Б) полоскание рта спиртом
В) полоскание рта раствором фурацилина
Г) полоскание рта раствором гидрокарбоната натрия
570. [T001193] ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ КИШЕЧНИКА НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН
- А) овощи, фрукты, кисломолочные продукты
Б) цельное молоко
В) газированные напитки, соки
Г) хлеб белый
571. [T001194] ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
- А) плотность и диурез

- Б) количество форменных элементов, бактерий
В) наличие уробилина, желчных пигментов
Г) количество сахара, ацетона
572. [T001197] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ
А) гормоны Т3, Т4, ТТГ
Б) гемоглобин, цветовой показатель
В) лейкоциты, СОЭ
Г) инсулин, глюкагон
573. [T001198] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ОТМЕЧАЕТСЯ
А) гипергликемия
Б) гипопроотеинемия
В) гиперпротеинемия
Г) гипербилирубинемия
574. [T001199] ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА РЕКОМЕНДУЮТ СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ
А) с пониженной калорийностью
Б) с пониженным содержанием белка
В) с повышенным содержанием белка
Г) основной вариант стандартной диеты
575. [T001200] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ УГРОЗЕ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
А) создание покоя
Б) назначение сокращающих средств
В) введение прогестерона, вызов врача
Г) проведение катетеризации
576. [T001201] ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА МЕДИЦИНСКИЙ АБОРТ ВКЛЮЧАЕТ:
А) анализ крови на RW, ВИЧ-инфекцию
Б) исследование крови на холестерин
В) анализ мочи по Нечипоренко
Г) кольпоскопию
577. [T001202] СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ИНФЕКЦИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ
А) сбор субъективной информации
Б) бимануальное исследование
В) рентгенологическое исследование
Г) исследование мочи
578. [T001203] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ МИОМЕ МАТКИ
А) подготовка пациентки к гинекологическому осмотру
Б) введение гормонов
В) осмотр шейки матки в зеркалах
Г) введение газоотводной трубки
579. [T001204] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ РИСКЕ РАЗВИТИЯ ЗАСТОЙНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
А) проведение дыхательной гимнастики
Б) применение отхаркивающих средств
В) проведение оксигенотерапии
Г) применение антибиотиков
580. [T001205] ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ
А) кровохарканья
Б) снижения аппетита
В) общей слабости
Г) недомогания
581. [T001206] ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ
А) безопасность пациента
Б) рациональное питание пациента
В) проведение мероприятий личной гигиены

- Г) сохранение социальных контактов
582. [T001207] У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАРУШЕНА ПОТРЕБНОСТЬ
- А) в выделениях
 - Б) в дыхании
 - В) в питании
 - Г) в питье
583. [T001208] НЕЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
- А) обеспечение мочеприемником
 - Б) резкое ограничение жидкости
 - В) резкое ограничение соли
 - Г) катетеризация мочевого пузыря
584. [T001209] РЕКОМЕНДУЕМЫМ ВАРИАНТОМ ДИЕТЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИЕТА С
- А) повышенным количеством белка
 - Б) избыточным содержанием углеводов
 - В) механическим и химическим щажением
 - Г) ограничением соли и сахара
585. [T001210] МЕТОД РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
- А) флюорография
 - Б) спирография
 - В) томография
 - Г) бронхография
586. [T001211] ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ НЕОБХОДИМО
- А) избегать изменений положения головы
 - Б) приподнять ноги
 - В) часто менять положение головы и туловища
 - Г) убрать из-под головы подушку
587. [T001212] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЧАЩЕ ИССЛЕДУЮТ
- А) кал
 - Б) мочу
 - В) кровь
 - Г) желчь
588. [T001215] ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПСОВОЙ ПОВЯЗКОЙ НЕОБХОДИМО
- А) следить за кровоснабжением поврежденной конечности
 - Б) содержать пациента в тепле
 - В) следить за соблюдением диеты
 - Г) следить за активностью пациента
589. [T001217] АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) патологическая подвижность костных отломков
 - Б) деформация сустава
 - В) отечность места повреждения
 - Г) боль
590. [T001218] ПРИ УКУСЕ ЧЕЛОВЕКА БЕШЕНЫМ ЖИВОТНЫМ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ
- А) заражения бешенством
 - Б) заражения туберкулезом
 - В) развития вирусной инфекции
 - Г) перелома костей
591. [T001220] НЕЗАВИСИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
- А) оказание помощи пациентам в самообслуживании
 - Б) инъекции антибактериальных препаратов
 - В) смена дренажей
 - Г) назначение пациенту рациональной диеты
592. [T001224] ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ОТМОРОЖЕНИЕМ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) горячее питье, термоизоляционная повязка
Б) горячее питье, полуспиртовый компресс
В) растирание пораженного участка подручными средствами
Г) горячее питье, растирание пораженного участка
593. [Т001225] ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ НЕОБХОДИМЫ
А) холод на живот, госпитализация
Б) обезболивающее
В) антибактериальные средства
Г) грелка на живот
594. [Т001226] ПРИ ПОДГОТОВКЕ К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧИТЬ
А) овощи
Б) гречневую кашу
В) рыбу
Г) мясо
595. [Т001227] ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ПРИ РОЖИСТОМ ВОСПАЛЕНИИ
А) гиперемия кожи с четкими границами
Б) подергивание мышц
В) разлитое покраснение кожи
Г) ограниченный инфильтрат кожи
596. [Т001228] ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ С ЛЕГОЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ НА ДОКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ
А) наложение холода на грудную клетку
Б) проведение инъекции сосудосуживающих препаратов
В) подготовку набора для плевральной пункции
Г) измерение температуры
597. [Т001229] СИМПТОМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СКОПЛЕНИЕ КРОВИ В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
А) отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление перкуторного звука
Б) алая пятнистая кровь из полости рта
В) рвота «кофейной гущей»
Г) кровохарканье
598. [Т001230] СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ ИЗ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ
А) наложение артериального жгута выше места повреждения
Б) тампонаду раны
В) применение гемостатической губки
Г) наложение давящей повязки
599. [Т001231] К ВОЗМОЖНОМУ РАННЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ ОТНОСИТСЯ
А) рвота
Б) острая задержка мочи
В) ограничение двигательной активности
Г) повышение артериального давления
600. [Т001232] СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ НАГНОЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ
А) гиперемия, отек, усиление боли
Б) побледнение краев раны
В) промокание повязки кровью
Г) гематома
601. [Т001233] НЕЗАВИСИМЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ УСИЛЕНИИ БОЛИ У ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАЦИЕНТА
А) создание удобного положения пациента в постели, вызов врача
Б) введение обезболивающего препарата
В) применение ванночки с раствором перманганата калия
Г) измерение температуры
602. [Т001235] ТАКТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ У ПАЦИЕНТА ФУРУНКУЛА НОСА
А) срочное направление к врачу

- Б) вскрытие и дренаж гнояника
 - В) назначение антибиотиков
 - Г) применение тепловых процедур
603. [T001236] СИМПТОМ ПЕРЕЛОМА ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
- А) симптом «прилипшей пятки»
 - Б) крепитация большеберцовой кости
 - В) крепитация в области нижней трети бедра
 - Г) крепитация в области малоберцовой кости
604. [T001237] ЗАВИСИМОЕ СЕСТРИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПРИ ФУРУНКУЛЕЗЕ
- А) введение антибиотиков
 - Б) обучение пациента принципам рационального питания
 - В) обеспечение приема жидкости
 - Г) обеспечение гигиены кожи
605. [T001239] ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЯСНОЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВКЛЮЧАЕТ
- А) проведения очистительной клизмы и ограничение пищевого режима
 - Б) проведения промывания желудка
 - В) рекомендации пациенту к отказу от курения перед исследованием
 - Г) введение газоотводной трубки
606. [T001240] У ПАЦИЕНТА С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ ОТМЕЧАЕТСЯ
- А) резкое снижение артериального давления
 - Б) головная боль
 - В) возбуждение
 - Г) повышение артериального давления
607. [T001242] ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К ОПЕРАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ
- А) опорожнение мочевого пузыря
 - Б) при.м стакана жидкости
 - В) чистку зубов
 - Г) при.м пищи
608. [T001243] КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ
- А) падение артериального давления и тахикардия
 - Б) хрипы в легких
 - В) тошнота и рвота
 - Г) задержка газов и стула
609. [T001244] ПРОБЛЕМА ПАЦИЕНТА В ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
- А) страх операции
 - Б) боль
 - В) рвота
 - Г) учащенное мочеиспускание
610. [T001249] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ
- А) температура - 180°C 60 мин
 - Б) температура - 100°C 60 мин
 - В) температура - 120°C 40 мин
 - Г) температура - 100°C 40 мин
611. [T001251] ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЗАНИМАЮТ
- А) гнойно-септические инфекции
 - Б) инфекции кожных покровов
 - В) кишечные инфекции
 - Г) инфекция мочевыводящих путей
612. [T001252] ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ПЕРЧАТОК
- А) при асептических процедурах, контактах с кровью и другими биологическими жидкостями
 - Б) при работе с воздушным стерилизатором
 - В) при работе с паровым стерилизатором
 - Г) при беседе с пациентом
613. [T001256] ЧИСЛО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
- А) 16-20 в минуту
 - Б) 10-12 в минуту
 - В) 12-14 в минуту

- Г) 22-24 в минуту
614. [Т001259] ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГОРЧИЧНИКОВ
- А) трахеит, бронхит, пневмония, гипертонический криз, приступ стенокардии
 - Б) трахеит, бронхит, невралгии, заболевания кожи
 - В) трахеит, бронхит, пневмония, туберкулез легких
 - Г) трахеит, бронхит, пневмония, рак легких
615. [Т001260] ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ ТЕЛА ВОДА В ГРЕЛКЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ В ПРЕДЕЛАХ (__ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ)
- А) 60-65
 - Б) 20-30
 - В) 40-45
 - Г) 30-35
616. [Т001261] МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРАЗДНУЕТСЯ
- А) 12 мая
 - Б) 17 июня
 - В) 7 января
 - Г) 25 октября
617. [Т001262] КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ
- А) наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной профессиональной деятельности
 - Б) сохранение сведений о пациенте
 - В) подчинение старшему по должности младшему
 - Г) организация образа жизни пациентов, способствующую его выздоровлению
618. [Т001264] СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ
- А) уничтожение микроорганизмов и их спор
 - Б) уничтожение грызунов
 - В) уничтожение патогенной микрофлоры
 - Г) уничтожение вредных насекомых
619. [Т001265] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАРОВОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ
- А) 132 градуса °С, 2 атм, 20 минут
 - Б) 120 градусов °С, 4 атм, 20 минут
 - В) 180 градусов °С, 3 атм, 20 минут
 - Г) 120 градусов °С, 1 атм, 20 минут
620. [Т001268] ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЛЕРА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ
- А) полул.жа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
 - Б) на боку, руки согнуты в локтевых суставах
 - В) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
 - Г) промежуточное положение между положением л.жа на боку и л.жа на животе
621. [Т001271] САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА В ПРИЁМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ
- А) осмотр на педикул.з и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, обтирание, переодевание в больничную одежду
 - Б) дезинсекцию, ванну или душ, антропометрию
 - В) осмотр на педикул.з и чесотку, дезинсекцию, ванну или душ, транспортировка в лечебное отделение
 - Г) осмотр на педикул.з и чесотку, дезинфекция вещей больного
622. [Т001273] ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГРЕЛКИ СОСТАВЛЯЕТ
- А) 2/3 объема грелки
 - Б) 1/3 объема грелки
 - В) 1/4 объема грелки
 - Г) 1/2 объема грелки
623. [Т001274] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СЛОЕВ В СОГРЕВАЮЩЕМ КОМПРЕССЕ
- А) влажная салфетка, компрессная бумага, вата, бинт
 - Б) влажная салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
 - В) компрессная бумага, влажная салфетка, вата, бинт
 - Г) вата, влажная салфетка, компрессная бумага, бинт
624. [Т001275] ПУЛЬС ЧАЩЕ ВСЕГО ИССЛЕДУЮТ НА
- А) лучевой и сонной артерии
 - Б) локтевой артерии и аорте

- В) брюшной аорте и мозговой артерии
Г) подколенной артерии
625. [Т001276] ПРИ КРИТИЧЕСКОМ ПАДЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
- А) снижается
Б) повышается незначительно
В) резко повышается
Г) не изменяется
626. [Т001277] ТЕМПЕРАТУРУ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВ ИЗМЕРЯЮТ
- А) утром натощак (7 до 9час) и вечером (с17 до 19час)
Б) раз в день с 12 до 13 часов
В) сразу после завтрака
Г) перед сном
627. [Т001278] ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА 37,0. - 37,9.С НАЗЫВАЕТСЯ
- А) субфебрильной
Б) фебрильной
В) пиретической
Г) гиперпиретической
628. [Т001280] ПРОЯВЛЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОЗНАЧАЕТ
- А) выполнение указаний старшего по должности и уважительное руководство деятельностью младшего по должности
Б) сохранение сведений о пациенте
В) организацию условий, способствующих выздоровлению пациента
Г) ч.точное выполнение медицинской сестрой своих профессиональных обязанностей
629. [Т001281] К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ПЕДИКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ
- А) шампуни медифокс, нитифор, лосьон анти-бит
Б) 3% раствор перекиси водорода, 5% раствор перманганата калия
В) хлорамин
Г) дегтярное мыло
630. [Т001283] МЕДИЦИНСКИЙ ПРЕДМЕТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ
- А) ундинка
Б) пробирка
В) грушевидный баллончик
Г) шприц Жане
631. [Т001284] ПОЛОЖЕНИЕ СИМСА ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ
- А) промежуточное положение, между положением л.жа на боку и л.жа на животе
Б) полулежа, с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60 градусов
В) полусидя, с приподнятым изголовьем кровати под углом 25-30 градусов
Г) на боку, руки согнуты в локтевых суставах
632. [Т001286] СТЕРИЛЬНОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ В МЯГКОЙ БЯЗЕВОЙ УПАКОВКЕ СОХРАНЯЕТСЯ
- А) 3 суток
Б) 2 суток
В) 1 сутки
Г) 5 суток
633. [Т001288] ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ГИРУДОТЕРАПИИ ВЫРАЖЕН В
- А) снижении свертываемости крови
Б) уменьшении боли
В) повышении артериального давления
Г) повышении свертываемости крови
634. [Т001289] СЕСТРИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВО 2 ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ
- А) холодный компресс, теплое пить.
Б) холодный примочка, теплые ножные ванны
В) применение жаропонижающих препаратов разных форм
Г) использование грелки к ногам, горячий чай
635. [Т001290] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ
- А) 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт
Б) 8-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, зажим

- В) 8 -слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, зажим
Г) 4-слойную салфетку, компрессную бумагу, вату, этиловый спирт, бинт
636. [T001291] ПРИЗНАКИ 3-Й СТАДИИ ПРОЛЕЖНЕЙ
А) образование пузырей и язв
Б) мацерация кожи
В) покраснение кожи с синюшным оттенком
Г) некроз кожи и подкожной клетчатки
637. [T001292] ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
А) спирография
Б) бронхоскопия
В) флюорография
Г) бронхография
638. [T001293] УКАЖИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОЙ КЛИЗМЫ
А) очистительная клизма
Б) капельная клизма
В) промывание желудка
Г) гипертоническая клизма
639. [T001294] КИШЕЧНИК ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (__ ЧАС.)
А) 6-8
Б) 2
В) 4
Г) 10-12
640. [T001295] СИФОННАЯ КЛИЗМА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ
А) терапии состояния обтурации (запора)
Б) перед постановкой лекарственной клизмы
В) введения питательных веществ
Г) для местного воздействия на слизистую прямой кишки
641. [T001298] МОКРОТА НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОБИРАЕТСЯ
А) трижды, в стерильные емкости, в специальном помещении
Б) после тщательного туалета ротовой полости
В) утром натощак, в теплом виде в лабораторию
Г) дважды, до и после применения антибиотиков
642. [T001299] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К УЛЬТРАЗВУКОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРОВОДЯТ
А) водную нагрузку перед исследованием
Б) прием углеводов вечером и утром перед исследованием
В) обязательный прием активированного угля и ферментных препаратов
Г) психологическую подготовку
643. [T001301] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ
А) острая задержка мочи более 6-ти часов
Б) недержание мочи
В) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
Г) появление отеков
644. [T001302] ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ПОЯВИЛОСЬ ВЗДУТИЕ ЖИВОТА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОБЯЗАНА
А) проконсультироваться с врачом
Б) ввести газоотводную трубку
В) провести массаж живота
Г) ввести но-шпу внутримышечно
645. [T001303] МЕРОПРИЯТИЯ, С КОТОРЫХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ БОРЬБУ С ЗАПОРАМИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
А) введение в рацион питания овощей и фруктов
Б) прием солевых слабительных
В) постановка очистительных клизм
Г) прием растительных слабительных
646. [T001305] МЕТЕОРИЗМОМ НАЗЫВАЮТ
А) патологическое газообразование в кишечнике

- Б) частый жидкий стул
 - В) задержку стула более 48 часов
 - Г) спастические боли в кишечнике
647. [T001307] ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО
- А) определение количества форменных элементов осадка мочи
 - Б) определение функционального состояния почек
 - В) определение суточного диуреза
 - Г) определение микрофлоры мочи
648. [T001308] ТЕРМИН "ПРОТЕИНУРИЯ" СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ В МОЧЕ
- А) белка
 - Б) лейкоцитов
 - В) эритроцитов
 - Г) глюкозы
649. [T001310] ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ -ЭТО
- А) графическая запись электрических явлений, возникающих при работе сердца
 - Б) исследование сердца при помощи ультразвука
 - В) графическая запись звуков, возникающих при работе сердца
 - Г) выслушивание сердца при помощи фонендоскопа
650. [T001312] ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ
- А) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 10% раствор хлорида натрия
 - Б) грушевидный баллон, шприц Жане, вазелин, 10% раствор хлорида натрия
 - В) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелин, 0,9% раствор хлорида натрия
 - Г) грушевидный баллон, газоотводная трубка, вазелиновое масло, 0,9% раствор хлорида натрия
651. [T001316] ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ К ПРОМЫВАНИЮ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) отравление ядами
 - Б) острое желудочное кровотечение
 - В) инфаркт миокарда
 - Г) нарушение мозгового кровообращения
652. [T001318] АНАЛИЗ МОЧИ НА САХАР СОБИРАЕТСЯ В
- А) течение суток в одну емкость
 - Б) стерильную пробирку
 - В) течение 10 часов в одну емкость
 - Г) течение суток, 8 банок, каждые 3 часа
653. [T001328] В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ
- А) мексидол
 - Б) дипиридамол
 - В) прокаинамид
 - Г) амиодарон
654. [T001337] К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ МОЖНО ОТНЕСТИ
- А) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
 - Б) мебеверин (дюспаталин)
 - В) панкреатин (фестал)
 - Г) дротаверин (но-шпа)
655. [T001338] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЛИЯЮЩИЙ НА СНЯТИЕ СПАЗМА ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
- А) дротаверин (но-шпа)
 - Б) панкреатин (фестал)
 - В) эссенциальные фосфолипиды (эссенциале н)
 - Г) адеметионин (гептрал)
656. [T001339] ЛОПЕРАМИД ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЕМ
- А) противодиарейным
 - Б) гепатопротекторным
 - В) ферментативным
 - Г) противорвотным

657. [T001340] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
- А) хилак форте
 - Б) аллохол
 - В) магния сульфат
 - Г) лоперамид
658. [T001341] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КАК ПРАВИЛО, НАЗНАЧАЕМЫЙ СОВМЕСТНО С ПРОТИВОМИКРОБНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
- А) линекс
 - Б) аллохол
 - В) магния сульфат
 - Г) лоперамид
659. [T001343] ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СНИЖАЮЩИЙ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ЗА СЧЕТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ HCL (АНТАЦИДНОЕ СРЕДСТВО)
- А) алюминия гидроокись + магния гидроокись (альмагель)
 - Б) омепразол
 - В) фамотидин
 - Г) ранитидин
660. [T001358] СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОСЛЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ В МАТКУ И ТРУБЫ СОХРАНЯЮТ СПОСОБНОСТЬ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ
- А) 24-48 часов
 - Б) 6-12 часов
 - В) 3-5 суток
 - Г) 10 суток
661. [T001359] ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО 15 ЛЕТ, ИМЕЮТ ПРАВО
- А) один из родителей ребенка или законный представитель
 - Б) любой близкий родственник
 - В) только мама ребенка
 - Г) педагоги, воспитатели
662. [T001361] ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ, ЯВЛЯЕТСЯ
- А) затруднение выдоха
 - Б) затруднение вдоха
 - В) затруднение вдоха и выдоха
 - Г) шумный вдох
663. [T001363] ПОКАЗАНИЕМ К КАТЕТЕРИЗАЦИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) острая задержка мочи в послеоперационный период более 6-ти часов
 - Б) появление отеков
 - В) недержание мочи
 - Г) задержка мочеиспускания, вызванная травмой мочеиспускательного канала
664. [T001364] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ -ТАК НАЗЫВАЕТСЯ
- А) разница между систолическим и диастолическим давлением
 - Б) напряжение пульса
 - В) сумма систолического и диастолического давления
 - Г) аритмичный пульс
665. [T001373] ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО КОРМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГАСТРОСТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) непроходимость пищевода, опухоли, травмы, ожоги пищевода
 - Б) бессознательное состояние, переломы челюстей
 - В) нарушение глотания, отсутствие рвотного рефлекса
 - Г) послеоперационный период
666. [T001375] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РЕКОМЕНДУЮТ
- А) ограничить употребление рафинированных углеводов
 - Б) усилить питание
 - В) ограничить употребление жидкости
 - Г) ограничить употребление солей
667. [T001377] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ПАЦИЕНТУ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

- А) ограничить употребление соли и жидкости
Б) усилить питание
В) ограничить употребление животных жиров
Г) ограничить употребление рафинированных углеводов
668. [T001378] СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ
А) солкосерил, алазоль, пантенол
Б) алмагель, ихтиоловая мазь, тетрациклиновая мазь
В) бензил-бензоата, бом-бенге, Вишневского мазь
Г) оксолиновая мазь, ампициллиновая мазь
669. [T001379] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ-ЭТО
А) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний
Б) уничтожение микроорганизмов в окружающей среде
В) режим, который устанавливается в отделении
Г) комплекс мероприятий, направленный на выполнение дезинфекции в медицинской организации
670. [T001381] ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С ОЖИРЕНИЕМ НЕЗАВИСИМЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ БУДЕТ
А) измерение массы тела
Б) составление индивидуальной диеты
В) определение степени ожирения
Г) назначение лечения
671. [T001382] ТЕМПЕРАТУРА МОЮЩЕГО РАСТВОРА К МОМЕНТУ ПОГРУЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ СОСТАВЛЯЕТ (___ГРАДУСОВ)
А) 50
Б) 40
В) 30
Г) 100
672. [T001383] РИТМ ПУЛЬСА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО
А) интервалу между пульсовыми волнами
Б) силе, с которой нужно прижать лучевую артерию чтобы полностью прекратились ее пульсовые колебания
В) наполнению артерии кровью
Г) числу пульсовых волн за 1 минуту
673. [T001385] ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРОИСХОДИТ НАРУШЕНИЕ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ
А) поджелудочной железы
Б) печени
В) гипофиза
Г) щитовидной железы
674. [T001386] ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ
А) гангрена
Б) образование мозолей
В) подагра
Г) полиартрит
675. [T001387] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ ПРИ ЗАПОРЕ УПОТРЕБЛЯТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
А) продуктов с пищевыми волокнами и растительной клетчаткой
Б) белков
В) жиров
Г) соли
676. [T001389] ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПУНКЦИЮ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ
А) удаления жидкости из плевральной полости, взятия е. на бактериологическое исследование, введения в полость лекарственных препаратов
Б) только удаления жидкости из плевральной полости и взятия е. на бактериологическое исследование
В) только введения в полость лекарственных препаратов
Г) для удаления воздуха из плевральной полости
677. [T001394] БРОНХОСКОПИЯ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А) эндоскопическим
- Б) лабораторным
- В) рентгенологическим
- Г) радиоизотопным

678. [Т001400] ТЮБАЖ НАЗНАЧАЕТСЯ С ЦЕЛЮЮ

- А) промывания желчного пузыря
- Б) промывания гайморовых пазух
- В) подготовки к холецистографии
- Г) промывания желудка

679. [Т001406] РЕАНИМАЦИЯ – ЭТО

- А) комплекс лечебных мероприятий, направленных на восстановление жизнедеятельности организма
- Б) разновидность несчастных случаев у детей
- В) угнетение жизненных функций
- Г) совокупность неотложных состояний

680. [Т001407] НЕОБРАТИМЫЙ ЭТАП УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА

- А) биологическая смерть
- Б) клиническая смерть
- В) агония
- Г) предагония

681. [Т001409] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) 3–6 минут
- Б) 1-2 минуты
- В) 10-12 минут
- Г) более 20 минут

682. [Т001410] ПРИЗНАК КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- А) потеря сознания, отсутствие дыхания и отсутствие пульса на сонной артерии
- Б) спутанность сознания
- В) заторможенность
- Г) помутнение роговицы

683. [Т001411] ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ

- А) отсутствие сознания, дыхания и сердечной деятельности
- Б) отсутствие сознания
- В) резкое падение артериального давления
- Г) резкое повышение артериального давления

684. [Т001413] К ПЕРВОМУ ЭТАПУ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) обеспечение проходимости верхних дыхательных путей
- Б) проведение искусственной вентиляции легких
- В) контроль показателей кровообращения
- Г) подключение к аппарату искусственного дыхания

685. [Т001414] ВТОРЫМ ЭТАПОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проведение искусственной вентиляции л.гких
- Б) непрямой массаж сердца
- В) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- Г) прямой массаж сердца

686. [Т001415] СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И ДЫХАНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ СПАСАТЕЛЕМ

- А) на 30 компрессий - 2 вдоха
- Б) на 2 вдоха-15 компрессий
- В) на 1 вдох-5 компрессий
- Г) на 3 вдоха-6 компрессий

687. [Т001416] СПОСОБ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- А) наложение кровоостанавливающего жгута
- Б) сосудистый шов
- В) перевязка сосуда
- Г) переливание крови

688. [Т001417] ПРИЗНАК ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ

- А) слабый частый пульс
- Б) повышение температуры тела

- В) повышения артериального давления
Г) гиперемия кожных покровов
689. [T001418] УЧАЩЕНИЕ ДЫХАНИЯ ОБОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНОМ
А) тахипноэ
Б) брадипноэ
В) диспноэ
Г) апноэ
690. [T001420] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ПОВЕХНОСТЬ, НА КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ
А) жесткой
Б) мягкой
В) наклонной
Г) неровной
691. [T001421] ПРИЗНАК ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
А) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков
Б) отсутствие экскурсии грудной клетки
В) расширенные зрачки
Г) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии
692. [T001422] ОСНОВНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА
А) перелом ребер
Б) перелом ключицы
В) повреждение трахеи
Г) перелом позвоночника
693. [T001423] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЛАДОНИ СЛЕДУЕТ РАСПОЛОЖИТЬ
А) на границе средней и нижней трети грудины
Б) на верхней трети грудины
В) на границе верхней и средней трети грудины
Г) в пятом межреберном промежутке слева
694. [T001424] ОТСУТСТВИЕ ДЫХАНИЯ - ЭТО
А) апноэ
Б) тахипноэ
В) брадипноэ
Г) диспноэ
695. [T001426] ПОКАЗАНИЯ К ПРЕКРАЩЕНИЮ РЕАНИМАЦИИ
А) появление признаков биологической смерти
Б) отсутствие признаков эффективного кровообращения
В) отсутствие самостоятельного дыхания
Г) широкие зрачки
696. [T001427] ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ХАРАКТЕРНО
А) патологическое дыхание
Б) отсутствие самостоятельного дыхания
В) отсутствие пульса на сонной артерии
Г) отсутствие сознания
697. [T001428] КРИТЕРИЙ ПРАВИЛЬНОСТИ ВДУВАНИЯ ПРИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ
А) экскурсия грудной клетки
Б) урежение пульса
В) появление пульса
Г) сужение зрачков
698. [T001429] ЕСЛИ СЕРДЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ЧЕРЕЗ
А) 30 минут
Б) 3-6 минут
В) 2 часа
Г) 15-20 минут
699. [T001430] ДОСТОВЕРНЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
А) симптом «кошачьего глаза»
Б) прекращение дыхания

- В) расширение зрачка
Г) прекращение сердечной деятельности
700. [Т001431] ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ УРЕЖЕНИЕ ДЫХАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ
А) брадикардия
Б) тахикардия
В) апноэ
Г) диспноэ
701. [Т001433] КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ ОКРАШЕНЫ В
А) голубой цвет
Б) серый цвет
В) черный цвет
Г) белый цвет
702. [Т001434] НА ЭЛЕКТРОДЫ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА НАКЛАДЫВАЮТСЯ САЛФЕТКИ, СМОЧЕННЫЕ
А) физиологическим раствором
Б) спиртом
В) нашатырным спиртом
Г) фурацилином
703. [Т001435] СМЕНА ПОВЯЗКИ ФИКСИРУЮЩЕЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР, ВЫПОЛНЯЕТСЯ
А) по мере загрязнения, не реже 1 раза в сутки
Б) еженедельно
В) 3 раза в день
Г) ежедневно
704. [Т001436] ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОТЕРЕ КРОВИ ВОЗНИКАЕТ
А) геморрагический шок
Б) анафилактический шок
В) гемотрансфузионный шок
Г) инфекционно-токсический шок
705. [Т001437] К ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ ОТНОСИТСЯ
А) вызов скорой медицинской помощи, устранение причины вызвавшую боль, остановка кровотечения, проведение иммобилизации конечности
Б) проведение иммобилизации и транспортировка
В) транспортировка в травматологическое отделение
Г) остановка кровотечения и перенос пострадавшего на ровную поверхность
706. [Т001438] УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) тахикардией
Б) аритмией
В) брадикардией
Г) экстрасистолией
707. [Т001439] МЕШОК «АМБУ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А) для проведения искусственной вентиляции легких
Б) для сбора отходов класса А
В) для проведения непрямого массажа сердца
Г) для сбора отходов класса Б
708. [Т001442] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ I СТЕПЕНИ:
А) переодеть в сухую одежду
Б) обезболить
В) наложить мазевую повязку
Г) наложить повязку с фурациллином
709. [Т001443] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ
А) устранить причину, наложить асептическую повязку
Б) устранить причину, наложить мазевую повязку
В) обработать обожженную поверхность 70% этиловым спиртом
Г) обработать обожженную поверхность 96% этиловым спиртом
710. [Т001444] ПРИЧИНАМИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) передозировка инсулина
Б) несоблюдение предписаний врача
В) самостоятельная отмена лекарств
Г) пропуск инъекций инсулина

711. [T001445] ПРИЕМ «ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ + ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ
- А) проходимость дыхательных путей
 - Б) адекватное кровообращение
 - В) устойчивое положение туловища
 - Г) адекватный уровень артериального давления
712. [T001446] ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ:
- А) обеспечить полный покой, холод на эпигастральную область
 - Б) отвести в ближайшую поликлинику
 - В) провести промывание желудка
 - Г) обезболить
713. [T001447] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА:
- А) вызвать врача, уложить с приподнятым головным концом, обеспечить полный физический и психологический покой
 - Б) проводить в поликлинику на прием к участковому врачу
 - В) успокоить и уложить на правый бок, вызвать врача
 - Г) вызвать врача, уложить с приподнятым ножным концом
714. [T001450] ПРИЕМ ГЕЙМЛИХА-ЭТО
- А) метод «брюшных толчков»
 - Б) запрокидывание головы и открывание рта
 - В) введение воздуховода
 - Г) сочетание искусственной вентиляции легких с непрямым массажем сердца
715. [T001451] КОНТРОЛИРУЯ ПАРАМЕТРЫ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ, МЕДСЕСТРА РЕГУЛИРУЕТ
- А) частоту дыхательных движений
 - Б) частоту сердечных сокращений
 - В) артериальное давление
 - Г) центральное венозное давление
716. [T001452] ОБМОРОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) кратковременной потерей сознания
 - Б) снижением зрачковых реакций
 - В) выпадением корнеального рефлекса
 - Г) полным выключением сознания с тотальной утратой восприятия
717. [T001453] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ:
- А) вывести пострадавшего из зоны загазованности, вызвать врача, расстегнуть стесняющую одежду
 - Б) вывести пострадавшего из зоны загазованности, ввести сердечные гликозиды
 - В) вызвать врача, одеть на пострадавшего противогаз
 - Г) вызвать газовую службу
718. [T001454] ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ КОЛЛАПСЕ
- А) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым ножным концом
 - Б) вызвать врача, уложить на ровную поверхность с приподнятым головным концом
 - В) вызвать врача, провести искусственную вентиляцию легких
 - Г) успокоить пациента
719. [T001455] НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ
- А) наложение окклюзионной повязки
 - Б) пункция плевральной полости
 - В) наложение ватно-марлевой повязки
 - Г) остановка легочного кровотечения
720. [T001456] ПРИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОБМОРОКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
- А) вдыхание положения с приподнятым ножным концом
 - Б) введение назогастрального зонда
 - В) внутривенное введение раствора сульфата магния
 - Г) придание вертикального положения тела
721. [T001457] ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РОГОВИЦЫ БОЛЬНОМУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В КОМЕ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА
- А) периодически закапывать в глаза изотонический раствор натрия хлорида
 - Б) провести инфузионную терапию по назначению врача

В) смазать веки солкосерилом

Г) наложить биную повязку

722. [T001458] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО

А) устранить тепловое воздействие, поместить пострадавшего в тень, смочить лицо прохладной водой

Б) укрыть влажной простыней

В) нанести крем на тело

Г) дать теплое питье.

723. [T001459] ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ РЕБЕНКА НЕОБХОДИМО

А) усадить, слегка наклонив голову вниз

Б) усадить, запрокинув голову назад

В) уложить на бок

Г) уложить на ровную поверхность с возвышенным головным концом

724. [T001460] ПРИ РАННЕЙ СТАДИИ СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА НАБЛЮДАЕТСЯ

А) гиперемия кожи

Б) гипотермия

В) брадикардия

Г) олигурия

725. [T001461] К ОСТРЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ОКАЗАНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ

А) анафилактический шок

Б) гипергликемическое состояние

В) гипертермический синдром

Г) гипогликемическое состояние

726. [T001462] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У РЕБЕНКА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРОВОДИТЬ

А) ручные и ножные горячие ванны

Б) общую горячую ванну

В) лечебную ванну с морской солью

Г) воздушную ванну

727. [T001464] ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИГОТОВИТ

А) инсулин короткого действия, физиологический раствор

Б) 40% раствор глюкозы

В) 5% раствор глюкозы

Г) раствор Рингера

728. [T001465] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УШИБЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

А) наложить давящую повязку и приложить пузырь со льдом или холодный компресс

Б) обезболить место ушиба

В) наложить асептическую повязку

Г) наложить гипсовую повязку

729. [T001466] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА НЕОБХОДИМО

А) вызвать бригаду скорой медицинской помощи, оставив больного в том же положении, в котором он был найден

Б) обезболить

В) уложить на спину

Г) уложить на левый бок

730. [T001467] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ

А) иммобилизация поврежденной конечности

Б) давящая повязка на поврежденную конечность

В) обезболивание

Г) воротник Шанца

731. [T001468] ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ ИСПОЛЬЗУЮТ

А) плазмозаменители

Б) физиологический раствор

В) гипертонический раствор

- Г) солевые растворы
732. [Т001469] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ
- А) предотвратить травмы больного
Б) выпрямить конечности
В) к голове приложить холод
Г) усадить больного
733. [Т001470] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВКЛЮЧАЕТ
- А) использование карманного ингалятора
Б) проведение постурального дренажа
В) введение преднизалона
Г) проведение дыхательной гимнастики
734. [Т001471] ОПТИМАЛЬНЫМ ПРИ КОЛЛАПСЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА
- А) с приподнятым ножным концом
Б) с приподнятым головным концом
В) полусидя на кушетке
Г) сидя на стуле
735. [Т001472] ТРАНСФУЗИЯ - ЭТО
- А) переливание крови и ее компонентов
Б) введение синтетических препаратов
В) введение лекарственных средств
Г) введение антибиотиков
736. [Т001477] ПРИЗНАКИ ПРАВИЛЬНО НАЛОЖЕННОГО КРОВЕОСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА
- А) прекращение кровотечения и исчезновение пульса на периферии конечности
Б) чувство онемения в конечности
В) прекращение кровотечения и онемение конечности
Г) падение артериального давления
737. [Т001478] НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ
- А) сублингвально
Б) внутрь
В) подкожно
Г) ректально
738. [Т001479] СЕРДЕЧНАЯ АСТМА – ЭТО ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ, ДЛЯ КОТОРОГО ХАРАКТЕРНЫ
- А) приступы удушья
Б) боли за грудиной, иррадиирующие в область левого плеча
В) потеря сознания
Г) головокружение
739. [Т001480] ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАЗВИТИЯ ТЕРМИНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
- А) кровопотеря более 60% объема циркулирующей крови
Б) хроническое заболевание желудка
В) компенсированный сахарный диабет
Г) стадия реконвалесценции вирусного гепатита В
740. [Т001481] ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ХАРАКТЕРЕН
- А) для гипергликемической комы
Б) для гипогликемической комы
В) для уремической комы
Г) для мозговой комы
741. [Т001482] СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИ РАНЕНИИ В ЗАТЫЛОК
- А) лежа на боку
Б) лежа на спине
В) лежа на животе
Г) в полусидящем положении
742. [Т001483] ПРИ СИЛЬНЫХ БОЛЯХ В ЖИВОТЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
- А) нельзя вводить анальгетик
Б) необходимо ввести анальгетик
В) можно дать спазмолитическое средство
Г) приложить к животу грелку

743. [T001485] МЕТОД ГЕЙМЛИХА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- А) при попадании инородного предмета в верхние дыхательные пути
- Б) при травме позвоночника
- В) при инспираторной одышке
- Г) при астматическом статусе

744. [T001487] ПРИ НАРУЖНОМ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно
- Б) кровь алого цвета, бьет струей
- В) кровь темно-вишневого цвета, бьет струей
- Г) кровь алого цвета, вытекает медленно

745. [T001489] ПОТЕРПЕВШЕМУ С СИНДРОМОМ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛИВАНИЯ

- А) накладывают жгут выше места сдавления перед освобождением конечности
- Б) накладывают жгут выше места сдавления после освобождения конечности
- В) накладывают асептическую повязку
- Г) проводят профилактику пролежней

746. [T001492] ИНТЕНСИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВКЛЮЧАЕТ

- А) мониторинг жизненно важных функций
- Б) выявление проблем пациента
- В) выполнение мероприятий гигиенического ухода
- Г) определение основных биохимических показателей крови

747. [T001493] ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ПАЦИЕНТА ДЫХАНИЯ ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) наклонится к лицу пациента, что бы щекой ощутить движение воздуха
- Б) провести подсчет дыхательных движений
- В) измерить физиологические показатели кровообращения
- Г) осуществить прием Геймлиха

748. [T001494] РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ

- А) биологической смерти
- Б) острой почечной недостаточности
- В) отравлении организма различными ядами
- Г) кровопотере

749. [T001495] ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЮЮ

- А) для поддержания водно-электролитного баланса
- Б) переливание крови
- В) переливание плазмы
- Г) обезболивания

750. [T001502] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ШОК

- А) кардиогенный
- Б) травматический
- В) анафилактический
- Г) гемотранфузионный

751. [T001503] ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ РАЗВИВАЕТСЯ ШОК

- А) травматический
- Б) кардиогенный
- В) анафилактический
- Г) гемотранфузионный

752. [T001504] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗВИВАЕТСЯ КОМА

- А) уремическая
- Б) кетоацидотическая
- В) гипергликемическая
- Г) гипогликемическая

753. [T001505] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА РАЗВИВАЕТСЯ КОМА

- А) гипогликемическая
- Б) уремическая
- В) кетоацидотическая
- Г) гипергликемическая

754. [T001506] ПРИ КРОВОПОТЕРЕ РАЗВИВАЕТСЯ КОЛЛАПС

- А) гиповолемический
- Б) кардиогенный
- В) ангиогенный
- Г) ортостатический

755. [T001508] ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) отсутствие дыхания и пульса на сонной артерии
- Б) отсутствие сознания
- В) отсутствие пульса на лучевой артерии
- Г) изменение величины зрачков

756. [T001509] ЕСЛИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВЫЯВЛЕНО ОТСУТСТВИЕ СОЗНАНИЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- А) позвать на помощь и определить наличие дыхания
- Б) вызвать «скорую помощь»
- В) придать пострадавшему устойчивое боковое положение
- Г) начать проведение сердечно-легочной реанимации

757. [T001510] ВЫЗОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ДРУГИХ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ К МЕСТУ ПРОИШЕСТВИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

- А) после определения состояний, представляющих угрозу жизни пострадавших
- Б) немедленно после прибытия на место происшествия
- В) в случае неэффективности мероприятий первой помощи
- Г) при выявлении пострадавших в значительном количестве

758. [T001512] ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ СЛЕДУЕТ

- А) убедиться в отсутствии опасности для лица ее оказывающую
- Б) получить разрешение у диспетчера экстренных служб
- В) получить разрешение у пострадавшего
- Г) получить разрешение у родственников пострадавшего

759. [T001513] ОПТИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ И КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) первые 5 минут
- Б) до 15-20 минут
- В) до 12-15 минут
- Г) до 8-10 минут

760. [T001515] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) компрессия грудной клетки, электро дефибриляция
- Б) прекардиальный удар, согревание
- В) внутрисердечное введение адреналина, массаж воротниковой зоны
- Г) искусственное дыхание, активизация рефлексов

761. [T001516] ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПРЕССИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГЕЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ, НЕОБХОДИМО НАДАВЛИВАТЬ НА ГРУДИНУ НА ГЛУБИНУ

- А) 5-6 см.
- Б) 2-3 см.
- В) 3-4 см.
- Г) 4-5 см

762. [T001519] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) иммобилизацию табельными и подручными средствами
- Б) сопоставление отломков кости
- В) вправление вышедшей наружу кости
- Г) наложение стерильной повязки

763. [T001520] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ

- А) все перечисленное
- Б) наложение стерильной повязки
- В) иммобилизацию табельными средствами
- Г) иммобилизацию подручными средствами

764. [T001523] ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВМЕСТО КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- А) закрутку

Б) давящую повязку

В) холод к ране

Г) компресс

765. [T001524] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ДОСТУПНЫМ СРЕДСТВОМ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

А) давящая повязка

Б) максимальное сгибание конечности

В) пальцевое прижатие артерии

Г) прямое давление на рану

766. [T001526] ТИПИЧНЫМ МЕСТОМ ПАЛЬЦЕВОГО ПРИЖАТИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) места ниже середины паховой складки

Б) верхняя треть задней поверхности бедра

В) выше середины паховой складки

Г) средняя треть внутренней поверхности бедра

767. [T001527] ПНЕВМОТОРАКС - ЭТО

А) скопление воздуха в плевральной полости

Б) открытое ранение живота

В) затрудненное дыхание

Г) иммобилизация грудной клетки

768. [T001528] ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО С ТРАВМОЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

А) полусидячее

Б) лежа на спине

В) лежа на боку неповрежденной стороны

Г) лежа на спине, плечеголовной конец приподнят

769. [T001529] ПРИ ОТКРЫТОЙ РАНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НЕОБХОДИМО

А) наложить окклюзионную повязку

Б) перевязать рану

В) наложить шину

Г) наложить шину с возвращением костей в исходное положение

770. [T001531] НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАВШИМ, КОТОРОМУ ОКАЗАНА ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

А) до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи

Б) до прибытия бригады скорой медицинской помощи

В) до улучшения его самочувствия

Г) в течение первого часа

771. [T001532] ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ТЕЛА ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) обеспечение ему комфорта, уменьшающего степень его страданий, не усугубление нарушения жизненно важных функций

Б) повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь

В) обеспечение доступа для наложения повязок

Г) предупреждение самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

772. [T001533] ДЛЯ ОЦЕНКИ СОЗНАНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО

А) осторожно встряхнуть его за плечи

Б) похлопать его по щекам

В) поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

Г) надавить на болевые точки

773. [T001534] ЕСЛИ ПРИ ПОПЫТКЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ

ЕГО ПОВЕДЕНИЕ УГРОЖАЕТ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТО ВЫ ДОЛЖНЫ

А) отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, позвать на помощь

Б) попытаться успокоить пострадавшего

В) постараться усмирить пострадавшего

Г) говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

774. [T001535] ПРИ ОТСУТСТВИИ СОЗНАНИЯ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ

А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение, поместив голову на бок ниже уровня туловища

Б) положить пострадавшему под голову валик из одежды

В) повернуть пострадавшего на бок

Г) подложить валик из одежды под плечи пострадавшего

775. [T001536] ПРИЗНАКОМ НЕПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

А) отсутствие или затруднение дыхания, невозможность объяснить ситуацию, багровое лицо

Б) жалоба на наличие инородного тела в дыхательных путях

В) захват горла, кашель, просьба о помощи

Г) надрывной кашель, попытка что-то сказать

776. [T001537] ПОВЕДЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО С ЧАСТИЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ПОПАДАНИЕМ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

А) хватается за горло, кашляет, просит о помощи

Б) не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое)

В) жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях

Г) хватается за горло, не может говорить, только кивает

777. [T001538] К ПЕРЕЧНЮ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

А) санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты

Б) комплект первой помощи санитарного дружинника

В) индивидуальный комплект первой помощи при ЧС

Г) сумка неотложной помощи при ЧС

778. [T001540] ПОСТРАДАВШЕМУ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ, НО ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ НАХОДИТСЯ БЕЗ СОЗНАНИЯ. ЧТО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДАЛЕЕ

А) придать пострадавшему устойчивое боковое положение

Б) продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью

В) позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи

Г) сообщить об этом диспетчеру по номеру экстренного вызова

779. [T001541] ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРАДАВШЕМУ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО

А) запрокинуть голову, приподняв подбородок

Б) приподнять голову, поддерживая шею

В) дыхательные пути открывать не обязательно

Г) запрокинуть голову, подложить под шею импровизированный валик

780. [T001542] ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАНЕ ИНОРОДНОГО ПРЕДМЕТА НЕОБХОДИМО

А) не извлекать его из раны, наложить повязку вокруг него

Б) извлечь его из раны

В) извлечь его, далее контролировать кровотечение из раны

Г) не предпринимать никаких действий, вызвать скорую медицинскую помощь

781. [T001543] ЦЕЛЬ ПОДРОБНОГО ОСМОТРА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

А) выявление различных травм

Б) оценка общего состояния пострадавшего

В) выявление наружного кровотечения

Г) определение оптимального положения пострадавшего

782. [T001545] К ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ СТРУКТУРА САНИТАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕРАКТАХ, ОТНОСЯТСЯ

А) место, применяемое террористами оружие и цели теракта

Б) морально-нравственные качества террористов

В) санитарно-гигиеническое благополучие места теракта

Г) неблагоприятные метеорологические условия

783. [T001546] ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЕЖНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ С ПОМОЩЬЮ ПОВЯЗКИ

А) Т-образной

- Б) черепашьей
- В) колосовидной
- Г) пращевидной

784. [Т001547] ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НА КУЛЬТЕ КОНЕЧНОСТИ МОЖНО УДЕРЖАТЬ БИНТОВОЙ ПОВЯЗКОЙ

- А) возвращающейся
- Б) колосовидной
- В) циркулярной
- Г) черепашьей

785. [Т001548] СИМПТОМЫ КРОВОТЕЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА

- А) местные, общие
- Б) наружные, внутренние
- В) первичные, вторичные
- Г) единичные, множественные

786. [Т001549] ВРЕМЕННЫЙ ГЕМОСТАЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) давящей повязкой
- Б) наложением сосудистого шва
- В) протезированием сосуда
- Г) лигированием сосуда в ране

787. [Т001550] НЕПРЕРЫВНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ НАЛОЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ЖГУТА НА НИЖНЮЮ КОНЕЧНОСТЬ ЗИМОЙ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 час
- Б) 4 часа
- В) 3 часа
- Г) 2 часа

788. [Т001551] СИМПТОМОМ ВЫВИХА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) изменение относительной длины конечности
- Б) изменение абсолютной длины конечности
- В) патологическая подвижность в поврежденном суставе
- Г) крепитация костных отломков

789. [Т001552] ГРАНИЦЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ У ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

- А) пальцы - лопатка здоровой стороны
- Б) кисть - лопатка больной стороны
- В) лучезапястный сустав - лопатка больной стороны
- Г) лучезапястный сустав - плечевой сустав больной стороны

790. [Т001553] ЭЛЕМЕНТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ С ПЕРЕЛОМОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ:

- А) иммобилизация конечности транспортной шиной
- Б) выполнение скелетного вытяжения
- В) выполнение репозиции отломков
- Г) использование шины Белера

791. [Т001554] ПЕРИОД КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ (30-31 ГРАДУС °С) СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

- А) десять
- Б) три
- В) пять
- Г) двадцать

792. [Т001555] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА

- А) тридцать минут
- Б) пятнадцать минут
- В) пять минут
- Г) шестьдесят минут

793. [Т001557] К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- А) введение адреналина
- Б) наружный массаж сердца
- В) прием Сафара
- Г) искусственное дыхание «рот в рот»

794. [T001558] АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ (ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ) ЯВЛЯЕТСЯ
- А) этиловый спирт
 - Б) гидрокарбонат натрия
 - В) перманганат калия
 - Г) атропин
795. [T001559] ЛЕЧЕНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ПРЕПАРАТОВ КРОМЕ
- А) пенициллина
 - Б) физиологического раствора
 - В) преднизалона
 - Г) супрастина
796. [T001560] РЕГУРГИТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) затекание жидкости или газов в направлении, противоположном нормальному
 - Б) затекание содержимого ротоглотки в трахею
 - В) гиперсаливация
 - Г) вид носового кровотечения
797. [T001561] РАННИМ ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ
- А) пульса на сонной артерии
 - Б) дыхательных движений
 - В) артериального давления
 - Г) реакции на свет
798. [T001563] ИНСТРУКТАЖИ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫВАЮТ
- А) вводными, первичными, повторными
 - Б) вводными, начальными
 - В) первичными, профессиональными
 - Г) повторными, профилактическими
799. [T001564] ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ С ЛИЦАМИ
- А) принимаемыми на временную и постоянную работу
 - Б) с высшим профессиональным образованием по специальности
 - В) со стажем работы в такой же должности более 25 лет
 - Г) назначенным главным врачом медицинской организации
800. [T001565] ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ
- А) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своих профессиональных обязанностей
 - Б) после прохождения работником испытательного срока
 - В) по окончании первого трудового дня
 - Г) по распоряжению руководителя медицинской организации
801. [T001566] ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ
- А) не реже одного раза в полгода
 - Б) не реже одного раза в год
 - В) не реже одного раза в два года
 - Г) ежемесячно
802. [T001568] МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ,
- А) не допускают к работе
 - Б) штрафуют
 - В) увольняют с работы
 - Г) направляют на принудительное обследование
803. [T001586] ИЗГИБОМ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА К ПЕРЕДИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) шейный лордоз

- Б) грудной сколиоз
В) крестцово-копчиковый кифоз
Г) грудной кифоз
804. [T001588] РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНО В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ РАСПОЛОЖЕНА
А) двенадцатиперстная кишка
Б) тощая кишки
В) подвздошная кишка
Г) слепая кишка
805. [T001589] ЭПИФИЗАРНЫМ ХРЯЩОМ В СУСТАВЕ ЯВЛЯЕТСЯ
А) хрящевая пластинка роста между эпифизом и диафизом
Б) суставной хрящ эпифиза
В) эпифиз на хрящевой стадии развития
Г) патологическое включение хрящевой ткани в костный эпифиз
806. [T001591] К ТРУБЧАТЫМ КОСТЯМ ОТНОСИТСЯ
А) лучевая
Б) пяточная
В) грудина
Г) ребро
807. [T001593] НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОВЯЗКА ДЕЗО НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ
А) переломе ключицы
Б) переломе ребер
В) ранении легкого
Г) ранении сердца
808. [T001594] ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ (АСЕПТИЧЕСКОЙ) ПОВЯЗКИ
А) профилактика вторичного инфицирования
Б) остановка кровотечения
В) постоянный доступ лекарственного вещества
Г) герметизация раны
809. [T001595] ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
А) возвышенное, полусидячее
Б) с приподнятым ножным концом кровати
В) горизонтальное
Г) горизонтальное, с приподнятой головой
810. [T001599] НЕОТЛОЖНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОМ УДАРЕ:
А) перенести пациента в прохладное место, положить холод на проекции крупных сосудов
Б) непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких
В) введение кардиамин
Г) уложить пациента в боковое положение, дать прохладное питье
811. [T001600] ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕН
А) расширением коронарных артерий
Б) расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
В) расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
Г) урежением сердечного ритма
812. [T001601] РЕАНИМАЦИЮ МОЖНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИ
А) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 30 минут
Б) отсутствии признаков эффективности сердечно-легочной реанимации на протяжении 10 минут
В) попадании желудочного содержимого в дыхательные пути
Г) появлении пенистой мокроты из верхних дыхательных путей
813. [T001603] МЕСТОМ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ
А) граница между средней и нижней третями грудины
Б) верхняя треть грудины
В) средняя треть грудины
Г) нижняя треть грудины

814. [T001604] НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ОБМОРОКЕ:

- А) уложить, приподняв ножной конец
- Б) уложить в горизонтальное положение, холод к голове
- В) уложить, голову приподнять, горчичник на затылок
- Г) уложить, дать горячее питье

815. [T001605] НАЖАТИЕ НА ГРУДИНУ ПРИ НЕПРЯМОМ МАССАЖЕ СЕРДЦА ПРОВОДИТСЯ

- А) запястьями, не сгибая рук в локтях
- Б) всей ладонной поверхностью, не сгибая рук в локтях
- В) запястьями, умеренно согнув руки в локтях
- Г) ладонью, сжатой в кулак

816. [T001606] ЖИЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ ИЗМЕРЯЕТСЯ

- А) спирометром
- Б) тонометром
- В) барометром
- Г) анемометром

817. [T001607] РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА

- А) не разрешается
- Б) разрешается по согласованию с главврачом
- В) разрешается по согласованию с инженером по технике безопасности
- Г) разрешается по усмотрению медсестры

818. [T001609] НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ ЖЕНЩИНЫ (__ ЛЕТ)

- А) 20-25
- Б) 18-30
- В) 25-35
- Г) 25-45

819. [T001610] БАКТЕРИЦИДНЫЕ (КВАРЦЕВЫЕ) ЛАМПЫ ИЗЛУЧАЮТ

- А) ультрафиолетовые лучи
- Б) инфракрасные лучи
- В) видимые лучи
- Г) ионизирующие лучи

820. [T001611] ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ МЫТЬЯ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ДОЛЖНО ИМЕТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ PH

- А) 5,5
- Б) 3,0
- В) 8,5
- Г) 10,0

821. [T001612] ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПАЦИЕНТОВ ДОЛЖЕН РАЗМОРАЖИВАТЬСЯ И ПОДВЕРГАТЬСЯ ОБРАБОТКЕ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- А) неделю
- Б) месяц
- В) 3 месяца
- Г) полгода

822. [T001613] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ В СТАЦИОНАРЕ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОВО ОДИН РАЗ В

- А) 7 дней
- Б) день
- В) 2 недели
- Г) месяц

823. [T001614] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

- А) через 2 часа
- Б) после каждой манипуляции
- В) через 6 часов
- Г) 1 раз в смену

824. [Т001615] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ

- А) после каждой манипуляции
- Б) в конце рабочего дня
- В) не меняет, двукратно протирая спиртом
- Г) не меняет, однократно протирая спиртом

825. [Т001616] БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ

- А) для обеззараживания воздуха в помещениях.
- Б) для освещения помещения
- В) для отопления помещения
- Г) для вентиляции помещения

826. [Т001617] ПЕРЧАТКИ, КОТОРЫЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩАЮТ РУКИ ОТ ПОРЕЗОВ РЕЖУЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НАЗЫВАЮТСЯ

- А) кольчужные
- Б) латексные
- В) нитриловые
- Г) виниловые

827. [Т001620] ЦВЕТ ПАКЕТОВ И КОНТЕЙНЕРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

- А) красный
- Б) желтый
- В) белый
- Г) черный

828. [Т001621] МНОГОРАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СРАЗУ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОГРУЖАЮТ В

- А) дезинфицирующий раствор
- Б) моющий раствор
- В) раствор гипохлорида кальция
- Г) растворе перекиси водорода

829. [Т001625] ПОДКЛАДНОЕ СУДНО ДЕЗИНФИЦИРУЮТ ПОГРУЖЕНИЕМ В

- А) дезинфицирующий раствор
- Б) моющий раствор
- В) раствор 3% перекиси водорода
- Г) раствор 70% этилового спирта

830. [Т001627] УВЛАЖНЕНИЕ КИСЛОРОДА ПРИ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА

- А) Боброва
- Б) Илизарова
- В) Кузнецова
- Г) Дитерикса

831. [Т001628] МАММОГРАФ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- А) состояния молочных желез
- Б) центральной нервной системы
- В) внутренних органов брюшной полости
- Г) внутренних органов грудной клетки

832. [Т001629] БРОНХОФИБРОСКОП ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ СЛИЗЕСТЫХ ОБОЛОЧЕК

- А) трахеобронхиального дерева
- Б) пищевода и желудка
- В) тонкого кишечника
- Г) толстого кишечника

833. [Т001630] РЕКТОМАНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

- А) прямой кишки
- Б) тонкой кишки
- В) двенадцатиперстной кишки
- Г) желудка

834. [Т001631] ГЛЮКОМЕТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- А) глюкозы в крови
- Б) глюкозы в моче

- В) кетоновых тел в моче
Г) глюкозы в пищевых продуктах
835. [T001632] ШПРИЦ – РУЧКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ
А) инсулина
Б) вакцины
В) гепарина
Г) глюкозы
836. [T001633] ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И УРЕТРЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ
А) цистоскопа
Б) ректоманоскопа
В) колоноскопа
Г) бронхофиброскопа
837. [T001634] ТОНОМЕТР МАКЛАКОВА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
А) внутриглазного давления
Б) артериального давления
В) венозного давления
Г) капиллярного давления
838. [T001635] КОЛОНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
А) толстой кишки
Б) тонкой кишки
В) желудка
Г) желчного пузыря
839. [T001636] УСТРОЙСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ
А) небулайзер, ингалятор
Б) мешок Амбу
В) кислородная лицевая маска
Г) носовая канюля
840. [T001638] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ГАЗООТВОДНОЙ ТРУБКИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) метеоризм
Б) запор
В) непроходимость кишечника
Г) операция
841. [T001639] КРУЖКА ЭСМАРХА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
А) постановки очистительной клизмы
Б) постановки сифонной клизмы
В) введения жидкости тяжелобольным
Г) постановки гипертонической клизмы
842. [T001640] ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОП ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОСМОТРА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
А) пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Б) толстой кишки
В) прямой кишки
Г) мочевого пузыря
843. [T001642] МЕДИЦИНСКИЙ ТОНОМЕТР ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
А) артериального давления
Б) внутриглазного давления
В) венозного давления
Г) капиллярного давления
844. [T001643] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ
А) весы
Б) секундомер
В) пульсомер
Г) шагомер
845. [T001644] КАРМАННЫЙ ИНГАЛЯТОР ПРИМЕНЯЮТ ПАЦИЕНТЫ С
А) бронхиальной астмой
Б) пневмонией
В) ринитом

- Г) отитом
846. [T001646] МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД ТРАНСПОРТИРУЮТ В БАЛЛОНАХ (ЦВЕТА)
- А) голубого
Б) красного
В) серого
Г) черного
847. [T001649] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРМАННАЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА НА 1/4 ЧАСТЬ РАСТВОРОМ
- А) дезинфицирующим
Б) изотоническим
В) гипертоническим
Г) физиологическим
848. [T001650] ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) ректороманоскопия
Б) дуоденоскопия
В) эзофагоскопия
Г) гастроскопия
849. [T001651] ПРИ НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРЕДМЕТЫ УХОДА
- А) мочеприемник, абсорбирующее белье
Б) резиновый катетер
В) грушевидный баллон
Г) резиновое судно
850. [T001653] ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА ДЛИНОЙ 10 – 16 ММ ОПТИМАЛЬНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЪЕКЦИИ
- А) внутривенной
Б) подкожной
В) внутримышечной
Г) внутривенной
851. [T001654] ВТОРОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОГРЕВАЮЩЕГО КОМПРЕССА НАЗЫВАЕТСЯ
- А) изолирующий – компрессная бумага
Б) лечебный - салфетка
В) согревающий – вата
Г) фиксирующий - бинт
852. [T001655] ЯЧЕЙКИ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА ЗАПОЛНЕННЫ
- А) воздухом
Б) ватой
В) водой
Г) песком
853. [T001656] ГАЗООТВОДНАЯ ТРУБКА ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ
- А) 20 – 30 см на 1 час
Б) 7 – 8 см на 2 часа
В) 10 – 15 см на 1 час
Г) 25 – 30 см на всю ночь
854. [T001657] ГРЕЛКУ ЗАПОЛНЯЮТ ВОДОЙ НА (___ ОБЪЕМА)
- А) 2/3
Б) 3/4
В) 1/2
Г) 1/3
855. [T001660] ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧЕРЕЗ НАЗОГАСТРАЛЬНЫЙ ЗОНД ИСПОЛЬЗУЮТ ШПРИЦ
- А) Жане
Б) тюбик
В) инъекционный
Г) ручку
856. [T001662] ЛЕЧЕНИЕ КИСЛОРОДОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
- А) в барокамере
Б) в кислородной палате
В) через носовой катетер из кислородного баллона

- Г) через маску при централизованной подаче кислорода
857. [T001671] ЗОНА ПОКРАСНЕНИЯ И ОТЕКА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ШВА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ
- А) воспаления
Б) апоптоза
В) репарации
Г) склероза
858. [T001672] ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБЛАСТЬ УРЕТРЫ
- А) антисептическим раствором
Б) 5% раствором перманганата калия
В) 0,5% раствором хлорамина
Г) раствором йода
859. [T001673] КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО СМОЧИТЬ
- А) стерильным глицерином
Б) 70% раствором спирта
В) раствором фурацилина
Г) раствором хлоргексидина
860. [T001675] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТА ПЕРЕМЕЩАЮТ В ПОСТЕЛИ КАЖДЫЕ (____ ЧАС.)
- А) 2
Б) 1
В) 3
Г) 10
861. [T001677] ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (____ ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ)
- А) 38 – 40
Б) 15 – 20
В) 25 – 30
Г) 45 – 50
862. [T001679] В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ОТЕКАМИ ВРАЧ НАЗНАЧАЕТ
- А) определение суточного диуреза
Б) измерение температуры тела
В) подсчет частоты дыхательных движений каждые 30 минут
Г) измерение артериального давления
863. [T001680] НАЗОВИТЕ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ
- А) крестец
Б) висок
В) грудная клетка
Г) предплечье
864. [T001681] ОСНОВНОЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЙ ПУТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЯДОВ В ОРГАНИЗМ
- А) ингаляционный
Б) трансдермальный
В) пероральный
Г) резорбтивный
865. [T001684] СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ПОДПИСЫВАЕТ
- А) опекун
Б) попечитель
В) главный врач
Г) прокурор
866. [T001685] ПРАВО ПАЦИЕНТА НА ДОПУСК К НЕМУ АДВОКАТА ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНО
- А) по желанию пациента
Б) с разрешения главного врача
В) с разрешения врачебной комиссии
Г) по решению суда

867. [T001687] ИГЛА ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)
А) 90
Б) 60
В) 45
Г) 30
868. [T001688] ИГЛА ПРИ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)
А) 45
Б) 60
В) 90
Г) 30
869. [T001689] ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ОСТАВЛЯЮТ В КИШЕЧНИКЕ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧАСА, ТАК КАК
А) могут образоваться пролежни в стенке кишечника
Б) утомительно для пациента
В) прекращается лечебный эффект
Г) заканчивается е. стерильность
870. [T001690] МЕШОК АМБУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А) при искусственной вентиляции л.гких
Б) при оксигенотерапии
В) для предупреждения западения языка
Г) при обеспечении проходимости дыхательных путей
871. [T001691] ЖГУТ ЭСМАРХА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А) для остановки артериального кровотечения
Б) для остановки венозного кровотечения
В) для остановки капиллярного кровотечения
Г) при внутривенных инъекциях
872. [T001692] ШИНА ДИТЕРИХСА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
А) бедренной кости
Б) плечевой кости
В) локтевой кости
Г) ключицы
873. [T001693] ШИНА КРАМЕРА НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПРИ
А) переломах плечевой кости
Б) переломах ключицы
В) повреждении тазобедренного сустава
Г) повреждении коленного сустава
874. [T001695] ТЕСТ ПОЛОСКИ НА НАЛИЧИЕ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ В МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
А) сахарный диабет
Б) мочекаменную болезнь
В) цистит и уретрит
Г) гломерулонефрит
875. [T001696] ДЕФИБРИЛЛЯТОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
А) электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма
Б) исследования работы головного мозга
В) ультразвуковых исследований сердца и его клапанного аппарата
Г) регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца
876. [T001699] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЦИАНОЗА, КАШЛЯ ВО ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНОГО ЗОНДА НЕОБХОДИМО
А) немедленно извлечь зонд
Б) вызвать врача
В) временно прекратить введение зонда
Г) начать искусственную вентиляцию легких
877. [T001701] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
А) беротек
Б) морфин
В) папаверин

- Г) клонидин (клофелин)
878. [T001703] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ТРЕБУЕТСЯ ДИЕТА, БОГАТАЯ
- А) калием
 - Б) углеводами
 - В) железом
 - Г) йодом
879. [T001708] ПРИ ПРИЕМЕ АНТИБИОТИКОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДИСБАКТЕРИОЗА ПРИМЕНЯЮТ
- А) линекс
 - Б) де-нол
 - В) гевискон
 - Г) флутиказон
880. [T001712] ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
- А) ацетилсалициловая кислота
 - Б) ацетаминофен
 - В) ибупрофен
 - Г) фенацетин
881. [T001713] К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ
- А) раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта
 - Б) дисбактериоз
 - В) гипотензия
 - Г) тромбоз
882. [T001714] ПРИЕМ АНТИГИСТАМИННЫХ СРЕДСТВ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
- А) сонливость, ухудшение внимания
 - Б) брадикардию
 - В) остеопороз
 - Г) гипертензию
883. [T001716] ПРИЗНАК ПЕРЕДОЗИРОВКИ ГЕПАРИНА
- А) гематурия
 - Б) дизурия
 - В) никтурия
 - Г) полиурия
884. [T001717] ПРЕПАРАТАМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) нитроглицерин
 - Б) нифедипин
 - В) верапамил
 - Г) каптоприл
885. [T001719] ПРИ ПРИЕМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ
- А) снижение артериального давления
 - Б) остеопороза
 - В) затруднение дыхания
 - Г) олигурии
886. [T001720] СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВВОДЯТ ВНУТРИВЕННО ПОД КОНТРОЛЕМ
- А) пульса
 - Б) частоты дыхания
 - В) артериального давления
 - Г) диуреза
887. [T001721] СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА
- А) подкожно, внутривенно
 - Б) внутрикочно, внутривенно
 - В) внутривенно, в полости
 - Г) подкожно, эндолюмбально
888. [T001723] ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА АНТАЦИДОВ
- А) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи и на ночь
 - Б) за час до еды
 - В) спустя 1,5 - 2 часа после приема пищи
 - Г) во время еды

889. [T001724] ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА КАЛ ОКРАШИВАЕТСЯ
А) в черный цвет
Б) в зеленый цвет
В) в желтый цвет
Г) в белый цвет
890. [T001730] В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПАЦИЕНТАМ ЧАСТО РЕКОМЕНДУЮТ НАСТОИ ИЗ
А) толокнянки, медвежьих ушек, листьев брусники
Б) плодов шиповника, цветков пижмы, травы чистотела
В) корня одуванчика, травы полыни горькой, травы тысячелистника
Г) коры калины, листьев крапивы, травы пастушьей сумки
891. [T001732] ПРИЕМ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
А) запор
Б) повышение аппетита
В) понос
Г) гипертензию
892. [T001733] ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ
А) за час до еды
Б) во время еды
В) сразу после еды
Г) не связано с приемом пищи
893. [T001737] ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА НАСТУПАЕТ
А) через 1-2 минуты
Б) через 10-15 минут
В) через 15-20 минут
Г) через 20-25 минут
894. [T001738] ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ
А) хлоргексидин
Б) перекись водорода
В) фурацилин
Г) протаргол
895. [T001739] ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПО ВИШНЕВСКОМУ ИСПОЛЬЗУЮТ
А) 0,25% раствор новокаина
Б) 2% раствор новокаина
В) 1% раствор тримекаина
Г) 10% раствор лидокаина
896. [T001740] ПРИ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТОМ РИФАМПИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА МОЧА ОКРАШИВАЕТСЯ В ЦВЕТ
А) оранжевый
Б) синий
В) фиолетовый
Г) зеленый
897. [T001741] ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНСУЛИНА НЕОБХОДИМО
А) постоянно менять места инъекций
Б) не дожидаться полного испарения спирта
В) ввести иглу параллельно поверхности кожи
Г) поесть через час после инъекции
898. [T001742] ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВОДЯТ ИНСУЛИН
А) короткого действия
Б) среднего действия
В) длительного действия
Г) сверхдлительного действия
899. [T001743] ОСНОВНОЙ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ БРОНХАЛЬНОЙ АСТМЕ
А) ингаляционный
Б) внутримышечный
В) через рот

- Г) сублингвальный
900. [Т001744] ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ
- А) после еды
Б) запивать небольшим количеством воды
В) не размельчать перед употреблением
Г) запивать апельсиновым соком
901. [Т001748] ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРОТИВОПОКАЗАН С ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЙ ЦЕЛЬЮ
- А) аспирин
Б) парацетамол
В) ибупрофен
Г) панadol
902. [Т001749] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ МОРФИНА СОСТАВЛЯЕТ
- А) 4-6 часов
Б) 1-2 часа
В) 8-10 часов
Г) 10-12 часов
903. [Т001751] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ
- А) преноксдиазин (либексин)
Б) лазолван (амброксол)
В) АЦЦ (ацетилцистеин)
Г) флуифорт (карбоцистеин)
904. [Т001752] ПРИЕМ ПРЕДНИЗОЛОНА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗВИТИЕ
- А) стероидной язвы
Б) гипотензии
В) гиперкалиемии
Г) дистрофии
905. [Т001753] АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ
- А) бактериальной инфекции
Б) лихорадке
В) кашле
Г) вирусной инфекции
906. [Т001754] ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ ИСПОЛЬЗУЮТ
- А) 0,9% раствор натрия хлорида
Б) 5% раствор глюкозы
В) 2% раствор новокаина
Г) 10% раствор хлористого кальция
907. [Т001755] АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ
- А) 70%
Б) 30%
В) 40%
Г) 95%
908. [Т001756] ВОССТАНАВЛИВАЕТ КИШЕЧНУЮ МИКРОФЛОРУ
- А) хилак форте
Б) лоперамид
В) холензим
Г) панкреатин
909. [Т001759] ГИПОТЕНЗИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТ ОКАЗЫВАЕТ ПРИ ВВЕДЕНИИ
- А) внутривенно
Б) перорально
В) энтерально
Г) ректально
910. [Т001761] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ РАН ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ РАСТВОР
- А) хлоргексидина
Б) Люголя
В) фенола

- Г) бриллиантовой зелени
911. [T001763] ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕПАРАТОВ НИТРОФУРАНОВОГО РЯДА РЕКОМЕНДУЮТ
- А) обильное питье
 - Б) прием витамина С
 - В) прием препарата до еды
 - Г) ограничение молочных продуктов
912. [T001764] ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ
- А) морфин
 - Б) диклофенак
 - В) анальгин
 - Г) парацетамол
913. [T001766] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИЕМ НЕКОТОРЫХ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ АНТАЦИДОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ
- А) профузного поноса
 - Б) задержки жидкости в организме
 - В) нарушения вкуса
 - Г) спазма гладких мышц кишечника
914. [T001768] ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА С НАРУШЕНИЕМ ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, РЕЧИ ПРИМЕНЯЮТ
- А) циннаризин
 - Б) амитриптилин
 - В) феназепам
 - Г) гипотиазид
915. [T001769] ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДКА СОЛЯНУЮ КИСЛОТУ НЕЙТРАЛИЗУЮТ
- А) антацидные препараты
 - Б) ферменты
 - В) антибиотики
 - Г) слабительные средства
916. [T001771] ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА РЕГУЛЯРНОСТЬЮ ПРИЕМА
- А) эналаприла
 - Б) мезатона (фенилэфрина)
 - В) строфантина
 - Г) добутамина
917. [T001774] АНЕСТЕТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
- А) лидокаин (ксикаин)
 - Б) анальгин (метамизол-натрий)
 - В) диклофенак
 - Г) трамадол
918. [T001775] ПРИ ВВЕДЕНИИ НОРАДРЕНАЛИНА ПОДКОЖНО ВОЗНИКАЕТ
- А) некроз
 - Б) аллергия
 - В) бронхоспазм
 - Г) коллапс
919. [T001776] ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛЧЕГОННОЕ ДЕЙСТВИЕ
- А) холензим
 - Б) лоперамид
 - В) бисакодил
 - Г) панкреатин
920. [T001781] КОДЕИН
- А) противокашлевое средство
 - Б) ноотроп
 - В) местный анестетик
 - Г) ненаркотический анальгетик
921. [T001782] ТРИМЕПЕРИДИН (ПРОМЕДОЛ)
- А) наркотический анальгетик
 - Б) психостимулятор
 - В) аналептик
 - Г) ненаркотический анальгетик
922. [T001783] ФЕНТАНИЛ

А) наркотический анальгетик

Б) психостимулятор

В) аналептик

Г) ненаркотический анальгетик

923. [Т001786] АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К

А) противовосполительным препаратам

Б) гормональным препаратам

В) гипотензивным средствам

Г) противоглистным средствам

924. [Т001787] МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ (АНАЛЬГИН)

А) ненаркотический анальгетик

Б) гипотензивное средство

В) противоглистное средство

Г) гормональный препарат

925. [Т001790] СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) нефрон

Б) ацинус

В) долька

Г) фолликул

926. [Т001796] В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДМЕТА ТРУДА ВСЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТНОСЯТСЯ К ТИПУ

А) «человек – человек»

Б) «человек – живая природа»

В) «человек – техника» (неживая природа)

Г) «человек – знаковая система»

927. [Т001798] ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕДИЦИНСКИХ, ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫ

А) Федеральным законом РФ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

Б) Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

В) Федеральным законом РФ «О безопасности»

Г) Федеральным законом «Уголовный кодекс РФ»

928. [Т001800] ВО ВРЕМЯ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОДВЕРГАЮТСЯ

А) воздействию факторов физической, химической, биологической и психофизиологической природы

Б) давлению и притеснениям со стороны руководства медицинских организаций

В) коррупционному воздействию

Г) уголовному преследованию

929. [Т001801] К ФАКТОРАМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

А) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

Б) психологические переживания за результаты лечения пациентов

В) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций

Г) контроль за профессиональной деятельностью

930. [Т001802] К ФАКТОРАМ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

А) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций

Б) вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций

В) психологические переживания за результаты лечения пациентов

Г) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

931. [T001803] К ФАКТОРАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ НА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ТРУДА, ОТНОСЯТСЯ

- А) вирусы и микроорганизмы, способствующие возникновению и распространению внутрибольничных инфекций
- Б) пары химических веществ и лекарственных препаратов в воздушной среде функциональных подразделений медицинских организаций
- В) контроль за профессиональной деятельностью
- Г) рентгеновское, ультрафиолетовое, лазерное и ионизирующее излучение, ультразвук

932. [T001806] ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА ЧАСТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

- А) постоянного напряжения и стресса
- Б) желания сменить профессию
- В) уйти в отпуск
- Г) посещения ближайшего учреждения культуры (театр, музей и т.п.)

933. [T001809] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) этиотропным
- Б) патогенетическим
- В) симптоматическим
- Г) паллиативным

934. [T001810] УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) радикальным
- Б) паллиативным
- В) симптоматическим
- Г) патогенетическим

935. [T001811] НАЛОЖЕНИЕ ГАСТРОСТОМЫ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕЧЕНИЕМ

- А) паллиативным
- Б) радикальным
- В) симптоматическим
- Г) патогенетическим

936. [T001815] ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) сальбутамол
- Б) кодеин
- В) либексин
- Г) тусупрекс

937. [T001816] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

- А) антибиотики, отхаркивающие
- Б) антибиотики, диуретики
- В) бронхолитики, глюкокортикостероиды
- Г) бронхолитики, диуретики

938. [T001818] ПРИМЕНЕНИЕ МОРФИНА В НАЧАЛЕ ТЕРАПИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- А) рвоты и поноса
- Б) запора
- В) гипотонии
- Г) бессонницы

939. [T001819] ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЛИПИДНЫХ БЛЯШЕК ВНУТРИ АРТЕРИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) атеросклероз
- Б) сахарный диабет
- В) ревматизм
- Г) подагра

940. [T001821] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

- А) фентанила, дроперидола, морфина
- Б) максигана, лазикса
- В) пентамина, дибазола

- Г) галоперидола, но-шпы
941. [T001822] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОТВАР ИЗ
- А) ольховых соплодий, коры дуба
 - Б) мяты
 - В) цветов бессмертника
 - Г) толокнянки
942. [T001825] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БОЛЬ КУПИРУЕТСЯ
- А) наркотическими анальгетиками
 - Б) бета-блокаторами
 - В) диуретиками
 - Г) статинами
943. [T001826] ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТАДИИ ПРОВОДЯТ
- А) постоянно
 - Б) коротким курсом
 - В) при ухудшении эпизодически
 - Г) сезонно
944. [T001827] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИМЕНЯЮТ
- А) эналаприл, атенолол
 - Б) дигоксин, димедрол
 - В) целанид, корвалол
 - Г) атропин, аспаркам
945. [T001828] ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИМЕНЯЮТ
- А) нитроглицерин
 - Б) панангин
 - В) морфин
 - Г) гепарин
946. [T001829] АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ МЕДСЕСТРА РЕКОМЕНДУЕТ ПРИНИМАТЬ
- А) через 10 мин после еды
 - Б) за 10 мин. до еды
 - В) за 20 мин. до еды
 - Г) за 30 мин. до еды
947. [T001835] РАСТВОР ПРИ ЗАКАПЫВАНИИ В УХО ПОДОГРЕВАЮТ ДО
- А) 37 град. С
 - Б) 40 град. С
 - В) 49 град. С
 - Г) 24 град. С
948. [T001836] ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПОДКОЖНО ВВОДЯТ В ОБЪЕМЕ НЕ БОЛЕЕ
- А) 2 мл
 - Б) 3 мл
 - В) 4 мл
 - Г) 5 мл
949. [T001837] СТЕРИЛЬНЫЙ МАСЛЯНЫЙ РАСТВОР ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ ПОДОГРЕВАЮТ ДО
- А) 38 град. С
 - Б) 40 град. С
 - В) 34 град. С
 - Г) 28 град. С
950. [T001838] ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ
- А) 0,9%
 - Б) 10%
 - В) 1%
 - Г) 0,1%
951. [T001839] СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЗАПИВАЮТ
- А) молоком
 - Б) киселем
 - В) водой
 - Г) кефиром

952. [T001841] ПРИ ПРИЕМЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ ПАЦИЕНТАМИ - БЛОКАТОРОВ МЕДСЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ
- А) артериальное давление, пульс
 - Б) массу тела
 - В) состояние полости рта
 - Г) суточный диурез
953. [T001844] ДЛИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПИАТОВ У ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ОТ БОЛИ
- А) вызывает психологическую зависимость
 - Б) не вызывает психологической зависимости
 - В) не вызывает физической зависимости
 - Г) вызывает изменение типа личности человека
954. [T001847] НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫЗЫВАЮТ
- А) желудочно-кишечные кровотечения
 - Б) анемию
 - В) одышку
 - Г) снижение артериального давления
955. [T001848] ПРИ МИКСЕДЕМЕ НАЗНАЧАЕТСЯ
- А) тиреоидин
 - Б) радиоактивный йод
 - В) мерказолил
 - Г) адреналин
956. [T001854] ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБИОТИКОВ ПОКАЗАНО ПРИ
- А) ревматизме
 - Б) бронхите
 - В) гепатите
 - Г) холецистите
957. [T001855] ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
- А) бронхоскопии
 - Б) рентгеноскопии
 - В) томографии
 - Г) флюорографии
958. [T001856] ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ
- А) кандидоз полости рта
 - Б) лунообразное лицо
 - В) стероидный диабет
 - Г) стероидная язва
959. [T001857] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПРИМЕНЕНИИ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ РЕКОМЕНДУЮТ
- А) тщательное полоскание рта
 - Б) применение до еды
 - В) применение сразу после еды
 - Г) запивать соком
960. [T001858] ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗАГРЕГАНТ
- А) ацетилсалициловую кислоту
 - Б) конкор
 - В) нитроглицерин
 - Г) анаприлин
961. [T001859] СПАЗМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
- А) галидор
 - Б) анальгин
 - В) пепсин
 - Г) фестал

962. [T001861] К ОТСРОЧЕННЫМ ЭФФЕКТАМ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ

- А) канцерогенные
- Б) токсические
- В) фармакогенетические
- Г) синдром отмены

963. [T001865] КЛИРЕНС - ЭТО

- А) мера способности организма элиминировать лекарственный препарат
- Б) мера длительности нахождения лекарственного препарата в организме
- В) скорость кровотока через почки
- Г) скорость метаболизма лекарства в печени

964. [T001866] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ

- А) подозрении на инфекционное заболевание
- Б) подтверждении диагноза инфекционного заболевания
- В) установлении границ эпидемического очага
- Г) установлении числа контактных

965. [T001867] «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ

- А) в территориальный орган Роспотребнадзора
- Б) в управление здравоохранения
- В) в районную бактериологическую лабораторию
- Г) в дезинфекционную станцию

966. [T001868] В СЛУЧАЕ ПЕДИКУЛЕЗА НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАВЯТ ОБОЗНАЧЕНИЕ

- А) «Р»
- Б) «А»
- В) «В»
- Г) «В-20»

967. [T001869] СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ХРАНИТСЯ

- А) у пациента
- Б) у участкового врача
- В) в регистратуре медицинской организации
- Г) в прививочном кабинете поликлиники

968. [T001870] УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ БОЛЬНЫХ, ВЗЯТЫХ НА ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) контрольная карта диспансерного наблюдения
- Б) медицинская карта амбулаторного больного
- В) статистический талон
- Г) выписка из медицинской карты стационарного больного

969. [T001871] ТЕМПЕРАТУРУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, ГДЕ ХРАНЯТ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, РЕГИСТРИРУЮТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- А) каждые 12 часов
- Б) каждый час
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в 7 дней

970. [T001872] ДОКУМЕНТОМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) паспорт здоровья
- Б) справка о здоровье
- В) выписка из медицинской карты
- Г) заключение о результатах обследования

971. [T001873] ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- А) выявления инфекционного заболевания
- Б) вызова скорой медицинской помощи
- В) оказания доврачебной помощи
- Г) производственной травмы

972. [Т001874] МЕДИЦИНСКИЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ХРАНИТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЕЕ ВЛИЯНИЕМ НА ЗДОРОВЬЕ

- А) паспорт здоровья
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) карта диспансерного наблюдения
- Г) обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы

973. [Т001877] ПРИ ПОБОЧНОМ ДЕЙСТВИИ ВАКЦИНЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) экстренное извещение
- Б) карта здоровья
- В) медицинская карта стационарного больного
- Г) единый талон амбулаторного пациента

974. [Т001878] К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ ИЗ ГРУППЫ АНТИБИОТИКОВ ОТНОСИТСЯ

- А) кларитромицин
- Б) феноболит
- В) натрия фторид
- Г) лоратадин (кларитин)

975. [Т001879] К ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- А) арбидол
- Б) дроперидол
- В) парацетамол
- Г) протамина сульфат

976. [Т001881] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи
- Б) комплекс мероприятий направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов в окружающей среде
- В) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
- Г) регулярный контроль выполнения требований асептики и антисептики

977. [Т001882] ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ

- А) на 3-5 день жизни
- Б) в 1-й день жизни
- В) в 1-й месяц
- Г) в 3 месяца

978. [Т001883] ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) вакцины
- Б) витамины
- В) антибиотики
- Г) пробиотики

979. [Т001884] ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ АНТРОПОНОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) человек
- Б) животное
- В) насекомое
- Г) пресмыкающееся

980. [Т001885] МАССОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ НА НЕСКОЛЬКО СТРАН И КОНТИНЕНТОВ – ЭТО

- А) пандемия
- Б) эпидемия
- В) эндемия
- Г) спорадические заболевания

981. [Т001886] К СПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ ВЫЗЫВАТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАКРООРГАНИЗМЕ ОТНОСИТСЯ

- А) патогенность
- Б) профильность
- В) комплиментарность
- Г) востребованность

982. [T001887] ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ОТ МОМЕНТА ВНЕДРЕНИЯ ПАТОГЕННОГО МИКРООРГАНИЗМА ДО ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) инкубационный период
- Б) продромальный период
- В) период развития основных клинических явлений
- Г) исход

983. [T001888] ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, НЕ ЧАЩЕ ЧЕМ ОДИН РАЗ В

- А) год
- Б) три года
- В) два года
- Г) четыре года

984. [T001889] ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО НЕ ЧАЩЕ, ЧЕМ ОДИН РАЗ В

- А) один год
- Б) три года
- В) четыре года
- Г) два года

985. [T001890] В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ВХОДЯТ

- А) маршрутная карта диспансеризации, паспорт здоровья
- Б) амбулаторная карта пациента, карта выбывшего из стационара
- В) карта стационарного больного, амбулаторная карта
- Г) маршрутная карта диспансеризации, паспорт болезни

986. [T001891] ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕШЕННОЛЕТНИХ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ ВНОСЯТСЯ В

- А) паспорт здоровья
- Б) учетную форму № 25/у-04
- В) маршрутную карту
- Г) карту учета диспансеризации

987. [T001892] ЖУРНАЛ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) после каждой генеральной уборки
- Б) 1 раз в месяц
- В) ежедневно
- Г) 1 раз в 10 дней

988. [T001893] ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ВНОСИТ В ЖУРНАЛ

- А) контроля стерилизации инструментов и мягкого инвентаря
- Б) учета азопирамовых и фенолфталеиновых проб
- В) кварцевания кабинета
- Г) генеральной уборки

989. [T001898] ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП) РАЗВИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

- А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
- Б) источника инфекции, механизмов и факторов передачи
- В) источника инфекции
- Г) источника инфекции и восприимчивого человека

990. [T001901] К ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОЛИКЛИНИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях
- Б) медицинская карта стационарного больного
- В) статистическая карта выбывшего из стационара
- Г) направление на лечение в стационарных условиях

991. [T001903] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ПОДОЗРЕНИИ НА НЕГО ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного образования
- Б) экстренное извещение об инфекционном заболевании

- В) листок нетрудоспособности
Г) направление на госпитализацию
992. [Т001905] В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА ЗАПОЛНЯЮТ
А) паспортную часть истории болезни
Б) карту стационарного больного
В) карту выбывшего из стационара
Г) бланки направлений на лабораторные исследования
993. [Т001906] К МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НЕ ПЕРЕДАЮЩЕЙСЯ ПОСТОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПО СМЕНЕ, ОТНОСИТСЯ
А) порционное требование в 2-х экземплярах
Б) журнал регистрации температурающих пациентов
В) журнал учета ядовитых и сильнодействующих препаратов
Г) журнал приема и передачи дежурств
994. [Т001907] ЖУРНАЛ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ДЕЖУРСТВ СОДЕРЖИТ
А) перечень срочных назначений
Б) температурный лист
В) паспортные данные пациента
Г) отказ от госпитализации
995. [Т001908] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ
А) медицинскую карту стационарного больного
Б) порционное требование
В) журнал учета инъекций
Г) температурный лист
996. [Т001909] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПЕДИКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ
А) экстренное извещение об инфекционном заболевании
Б) журнал учета приема больных и отказов в госпитализации
В) журнал учета амбулаторных больных
Г) статистическую карту выбывшего из стационара
997. [Т001910] ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ
А) ежедневно
Б) 2 раза в неделю
В) при поступлении пациента
Г) 1 раз в неделю
998. [Т001911] НАЗНАЧЕННАЯ ВРАЧОМ ДИЕТА ФИКСИРУЕТСЯ В
А) листе назначений
Б) требованиях на лекарственные препараты
В) истории болезни
Г) температурном листе
999. [Т001913] В ЖУРНАРЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НА КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТДЕЛЬНО ОТВОДИТСЯ
А) лист
Б) графа
В) строка
Г) тетрадь
1000. [Т001914] ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗЯТИЯ КРОВИ НА ВИЧ ЗАПОЛНЯЕТ
А) процедурная медицинская сестра
Б) палатная медицинская сестра
В) старшая медицинская сестра
Г) операционная медицинская сестра
1001. [Т001915] В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ОТДЕЛЕНИЯ ЗАПОЛНЯЕТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДЕ
А) каждого их применения
Б) ежедневно
В) еженедельно
Г) 1 раз в месяц
1002. [Т001916] ЖУРНАЛ НАЗНАЧЕНИЙ ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ
А) ежедневно
Б) всегда после каждой выполненной манипуляции

- В) 2 раза в день
Г) 1 раз в неделю
1003. [Т001917] ТРЕБОВАНИЕ В АПТЕКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ЗАВЕРЯЕТСЯ
А) главным врачом
Б) старшей медсестрой
В) главной медсестрой
Г) заведующим отделением
1004. [Т001918] ПОРЦИОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАПОЛНЯЕТ
А) постовая медсестра
Б) медсестра процедурного кабинета
В) участковая медсестра
Г) старшая медсестра
1005. [Т001919] ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОМЕТРИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАНОСИТ В
А) температурный лист
Б) историю болезни
В) лист назначений
Г) дневник наблюдений
1006. [Т001922] ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ЛЕЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВЕДЕТ
А) постовая медицинская сестра
Б) старшая медицинская сестра
В) медсестра приемного отделения
Г) медсестра процедурного кабинета
1007. [Т001923] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ЗАПОЛНЯЕТ
А) журнал учета работы бактерицидной лампы
Б) журнал отказа от госпитализации
В) журнал учета санпросвет работы
Г) журнал перевязок
1008. [Т001924] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ ЗАПОЛНЯЕТ
А) приемную квитанцию
Б) медицинскую карту стационарного больного
В) журнал учета приема больных
Г) статистическую карту выбывшего из стационара
1009. [Т001925] КНИГИ УЧЕТА И ЖУРНАЛЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
А) заверены печатью и подписью главного врача медицинской организации
Б) подписаны постовой медицинкой сестрой
В) подписаны заведующим отделением
Г) заполнены в произвольной форме
1010. [Т001928] ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ УДОСТОВЕРЯЕТ ОБОСНОВАННОСТЬ ВРЕМЕННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ
А) листок временной нетрудоспособности
Б) медицинская карта
В) полис ОМС
Г) СНИЛС
1011. [Т001929] ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ А) паспорт
Б) полис ОМС
В) медицинская карта амбулаторного больного
Г) СНИЛС
1012. [Т001931] ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ
А) не допускается ни одной
Б) возможна одна
В) возможны две
Г) допускается не более трех

1013. [Т001933] ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПЫ (УСТАНОВКИ) ЗАПОЛНЯЕТСЯ

А) при каждом включении

Б) ежедневно

В) 1 раз в неделю

Г) 1 раз в месяц

1014. [Т001934] ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ДИФТЕРИЮ НЕОБХОДИМО

А) подать экстренное извещение в Роспотребнадзор

Б) ввести противодифтерийную сыворотку

В) наблюдение и лечение на дому

Г) сообщить врачу

1015. [Т001935] ЗАПИСЬ О ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В

А) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а так же в истории болезни

Б) листе назначений

В) журнале учета лекарственных препаратов

Г) процедурном журнале

1016. [Т001936] ПРИ ПЛАНОВОМ ПРИЕМЕ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО

А) направление от врача поликлиники

Б) заключение КЭК

В) листок временной нетрудоспособности

Г) результат термометрии

1017. [Т001938] В СЛУЧАЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНЪЕКЦИОННОГО ИНФИЛЬТРАТА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

А) довести до сведения врача и сделать запись в журнал регистрации постинъекционных осложнений

Б) обработать инфильтрат 5% раствором йода

В) проконсультироваться с хирургом и направить пациента на УВЧ-терапию

Г) отменить последующие инъекции

1018. [Т001940] ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ

А) на руках у застрахованного гражданина

Б) на посту медицинской сестры

В) у врача в ординаторской

Г) в страховой организации

1019. [Т001941] В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ

А) фамилию, имя, отчество пациента и номер истории болезни

Б) диагноз болезни пациента

В) путь введения препарата

Г) количество препарата

1020. [Т001943] ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТУ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО И НАТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

А) делает запись о результатах выполнения в медицинской документации

Б) в устной форме сообщает о выполнении манипуляции сестре хозяйке

В) в устной форме сообщает о выполнении манипуляции лечащему врачу

Г) не делает соответствующей записи в медицинскую документацию

1021. [Т001945] ДОБРОВОЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ЛЮБОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

А) обязательно в письменном виде

Б) желательно

В) не обязательно

Г) зависит от конкретного случая

1022. [Т001946] ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ВЕДЕТСЯ

А) в приемном отделении

- Б) в каждом отделении
В) в каждом кабинете
Г) в поликлинике
1023. [Т001947] ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ ПАЦИЕНТА ВЫПОЛНЯЕТ
А) медицинская сестра палатная (постовая)
Б) заведующий отделением
В) процедурная медицинская сестра
Г) старшая медицинская сестра отделения
1024. [Т001948] В ПОЛИКЛИНИКЕ ОФОРМЛЯЮТ "МЕДИЦИНСКУЮ КАРТУ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
А) амбулаторных условиях
Б) стационарных условиях
В) санаторно-курортном учреждении
Г) женской консультации
1025. [Т001949] ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
А) азопирамовой пробы
Б) ортотолуидиновой пробы
В) бензидиновой пробы
Г) озоновой пробы
1026. [Т001950] ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ
А) ежедневно
Б) 1 раз в неделю
В) 1 раз в месяц
Г) ежемесячно
1027. [Т001952] ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ КВАРЦЕВАНИЯ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЛАЕТСЯ
А) после каждого кварцевания
Б) в конце рабочей смены
В) перед началом рабочей смены
Г) 1 раз в неделю
1028. [Т001955] ПАЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЗАПОЛНЯЕТ "ПОРЦИОННИК НА ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ (№ 1-84)"
А) ежедневно
Б) перед каждым приемом пищи
В) 2 раза в день
Г) 1 раз в неделю
1029. [Т001957] ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДОЛЖЕН БЫТЬ
А) пронумерован, прошнурован, иметь печать и подпись руководителя медицинской организации
Б) пронумерован, иметь печать подразделения
В) прошнурован, иметь печать и подпись руководителя подразделения
Г) пронумерован
1030. [Т001958] СПИСОК ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ В ОТДЕЛЕНИИ (ПОДРАЗДЕЛЕНИИ) МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ СПРАВОЧНОГО СТОЛА СОСТАВЛЯЕТСЯ
А) ежедневно медицинской сестрой ночной смены
Б) старшей медицинской сестрой
В) заведующим отделением
Г) процедурной медицинской сестрой
1031. [Т001966] ДНЕВНИК В "МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО" (ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ) Ф N 003/У-80 ЗАПОЛНЯЕТ
А) лечащий врач
Б) постовая медицинская сестра
В) старшая медицинская сестра
Г) заведующий отделением
1032. [Т001970] ЛИСТ УЧЕТА ВОДНОГО БАЛАНСА ЗАПОЛНЯЕТ

- А) медицинская сестра
- Б) пациент
- В) лечащий врач
- Г) старшая медсестра

1033. [Т001976] УНИЧТОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АМПУЛ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ

- А) специальной комиссией, с составлением акта
- Б) старшей медицинской сестрой
- В) лечащим врачом
- Г) дежурной медицинской сестрой

1034. [Т001977] ЗАПИСИ В "ТЕМПЕРАТУРНОМ ЛИСТЕ" ВЕДЕТ

- А) медицинская сестра
- Б) лечащий врач
- В) старшая медицинская сестра
- Г) процедурная медицинская сестра

1035. [Т001978] "ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЛИСТ" ПАЦИЕНТА ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- А) ежедневно утром и вечером
- Б) ежедневно утром
- В) ежедневно вечером
- Г) через день

1036. [Т001984] ЗА ПОДДЕЛКУ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- А) уголовная ответственность
- Б) выговор
- В) строгий выговор
- Г) наказание не предусматривается

1037. [Т001998] К ГРУППЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ

- А) ацикловир
- Б) дроперидол
- В) парацетамол
- Г) протамина сульфат

1038. [Т002000] ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ПРЕПАРАТОВ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИНСУЛИН

- А) гипогликемические средства
- Б) антисептики
- В) кардиопротекторы
- Г) ферментные препараты

1039. [Т002017] ПЛАНИРОВАНИЕМ СЕМЬИ ЗАНИМАЮТСЯ

- А) центры планирования семьи
- Б) смотровые кабинеты поликлиник
- В) родильные дома
- Г) врач-гинеколог участковый

1040. [Т002027] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) использование компьютерной информации
- Б) использование пишущих машинок
- В) учет в прошнурованных журналах
- Г) ведение картотеки

1041. [Т002029] ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В СТАЦИОНАР, ВЕДЕТСЯ

- А) журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации (ф001/у)
- Б) медицинская карта стационарного больного ф003/у
- В) листок учета движения больных и коечного фонда ф007/у
- Г) статистическая карта выбывшего из стационара ф066/у

1042. [Т002035] АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК (ОТЕК КВИНКЕ) ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ

- А) в области губ, щек, гортани
- Б) на передней поверхности груди и живота
- В) на спине
- Г) в области кистей и стоп

1043. [T002036] ПРОЯВЛЕНИЕМ КОЛЛАПСА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) потеря сознания
- Б) заторможенность
- В) гиперемия кожных покровов
- Г) проливной пот

1044. [T016325] ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- А) вакцины
- Б) витамины
- В) антибиотики
- Г) пробиотики

1045. [T016326] АКТИВНЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ФОРМИРУЕТСЯ ПОСЛЕ

- А) перенесенного инфекционного заболевания
- Б) при.ма препаратов интерферона
- В) вакцинации
- Г) введения иммуноглобулина

1046. [T016327] К МЕРОПРИЯТИЯМ В ОЧАГЕ ОСТРОГО КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- А) установление карантина 7 дней и обследование контактных лиц
- Б) установление карантина 35 дней в очаге инфекции
- В) проведение вакцинации в очаге инфекции
- Г) соблюдение безмолочной диеты

1047. [T016328] ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ

- А) стрептококковая инфекция
- Б) пищевая аллергия
- В) врожденный порок сердца
- Г) полиноз

1048. [T016329] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ

- А) вакцинации и ревакцинации
- Б) пробы Манту
- В) Диаскин-теста
- Г) рентгенографии

1049. [T016334] ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ГРИППА

- А) влажная уборка и проветривание помещения
- Б) бывшие в контакте с больными, не привитые и не болевшие подлежат срочной иммунизации
- В) разобщение контактных на 7 дней после последнего случая заболевания
- Г) очаговая дезинфекция

1050. [T016335] ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ КОРИ

- А) влажная уборка, проветривание помещения
- Б) двукратное бактериологическое обследование контактных
- В) очаговая дезинфекция
- Г) заключительная дезинфекция

1051. [T016336] ЕДИНИЦЕЙ УЧЕТА ВАКЦИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) доза
- Б) упаковка
- В) миллилитр
- Г) ампула

1052. [T016337] ОСНОВНЫМ НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) возраст
- Б) гиподинамия
- В) ожирение
- Г) дислипидемия

1053. [T016339] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА

- А) предупреждение отклонений в здоровье и заболеваний
- Б) выявление вируса
- В) общение с пациентом
- Г) организацию занятий

1054. [T016342] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- А) пациентом или его законным представителем (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1055. [T016345] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) дезинфекция
- Б) дератизация
- В) дезинсекция
- Г) стерилизация

1056. [T016346] НОВОРОЖДЕННЫМ В ПЕРВЫЕ 12 ЧАСОВ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ

- А) первая вакцинация против гепатита В
- Б) вакцинация против туберкулеза
- В) первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) вакцинация против полиомиелита

1057. [T016347] СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) хоспис
- Б) поликлиника
- В) пансионат
- Г) станция скорой медицинской помощи

1058. [T016348] ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ГЛАВНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ РФ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЭТО

- А) Федеральный Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Б) Конституция Российской Федерации
- В) Приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»
- Г) Приказ Минздрава России от 03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»

1059. [T016349] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) снижения восприимчивости к инфекционным заболеваниям
- Б) разрыва путей передачи возбудителей
- В) обезвреживания источника инфекции
- Г) уничтожения возбудителей заболеваний

1060. [T016350] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) стресс и психическое напряжение
- Б) низкое атмосферное давление
- В) длительное переохлаждение
- Г) прием снотворных

1061. [T016351] ДИЕТА ПРИ ХОЛЕЦИСТОПАНКРЕАТИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение жиров и углеводов
- Б) увеличение потребления жидкости и белков
- В) ограничение жидкости и соли
- Г) увеличение потребления жиров и минералов

1062. [T016352] ПРИЧИНАМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) поступления внутрь свинца и ртути
- Б) хронического панкреатита
- В) алкоголя и табака
- Г) избыточной массы тела

1063. [Т016353] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) пола и возраста
- Б) повышенного кровяного давления
- В) лишнего веса и ожирения
- Г) пониженной физической активности

1064. [Т016354] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ АДЕНОМЫ ПРОСТАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) половозрастная принадлежность
- Б) употребление табака и алкоголизм
- В) несбалансированное питание
- Г) недостаточная физическая актив

1065. [Т016355] САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

- А) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы в обмене веществ
- Б) облегчает течение всех болезней
- В) не оказывает влияния
- Г) способствует повышению устойчивости к болезням

1066. [Т016356] В РОССИИ ПРИ АКТИВНОЙ ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ К 2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) значительное снижение смертности от хронических неинфекционных заболеваний
- Б) исчезновение всех болезней
- В) рост «новых» инфекционных болезней
- Г) социальное благополучие населения

1067. [Т016361] СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ «0 – 1 – 6» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ

- А) вирусного гепатита В
- Б) гриппа
- В) дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) кори, ветряной оспы, краснухи

1068. [Т016362] К ВАКЦИНАЦИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ

- А) гриппа и бешенства
- Б) полиомиелита
- В) вирусного гепатита В
- Г) кори

1069. [Т016363] К МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- А) поликлиника
- Б) хоспис
- В) пансионат
- Г) санаторий-профилакторий

1070. [Т016364] ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) Федеральный Закон от 29.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- Б) Конституция Российской Федерации
- В) приказ МЗ СССР от 23.09.1981 г. №1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений»
- Г) приказ Минздрава России от 30.09.2015 г. №683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

1071. [Т016365] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАПРАВЛЕНА НА

- А) здоровое население, имеющее риск инфицирования
- Б) пути передачи возбудителей
- В) источник инфекции
- Г) возбудителей заболевания

1072. [T016366] В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ ПРИЕМ

- А) поваренной соли
- Б) углеводов
- В) перца и помидоров
- Г) растительного масла

1073. [T016367] В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- А) нарушение липидного обмена
- Б) очаг хронической инфекции
- В) длительное переохлаждение
- Г) прием снотворных

1074. [T016368] "СОСТОЯНИЕ ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НЕ ТОЛЬКО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ" ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ЭТО

- А) здоровье
- Б) диспансеризация
- В) профилактика
- Г) политика

1075. [T016369] ДИЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) ограничение острых и мясных блюд из свинины и баранины
- Б) увеличение потребления жидкости и сладостей
- В) ограничение жидкости и соли
- Г) увеличение потребления жиров и пряностей

1076. [T016370] ПРИЧИНОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) нарушение углеводного и липидного обмена
- Б) недосыпание
- В) алкоголизм
- Г) пребывание на солнце

1077. [T016371] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- А) наследственности
- Б) повышенного кровяного давления
- В) излишнего веса и ожирения
- Г) пониженной физической активности

1078. [T016372] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) половозрастная принадлежность
- Б) употребление табака и алкоголя
- В) несбалансированное питание
- Г) недостаточная физическая активность

1079. [T016373] АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

- А) усиливает и ускоряет негативные обменные процессы
- Б) облегчает течение всех болезней
- В) не оказывает влияния
- Г) способствует повышению устойчивости к болезням

1080. [T016374] ПРОГНОЗОМ В РОССИИ К 2030 ГОДУ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

- А) значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) исчезновение всех инфекционных болезней
- В) появление «новых» инфекционных болезней
- Г) рост социального обеспечения населения

1081. [T016375] КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВРАЧАМИ НЕСКОЛЬКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ – ЭТО

- А) диспансеризация
- Б) профилактика
- В) здоровье
- Г) политика

1082. [T016377] КОЛИЧЕСТВО ЭТАПОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ С 01.04.2015 Г. СЧИТАЕТСЯ

- А) 2
- Б) 10
- В) 5
- Г) 3

1083. [T016378] ЛИЦА, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ

- А) 1
- Б) 2
- В) 3а
- Г) 3б

1084. [T016381] ВАКЦИНАЦИЯ В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ПРОТИВ

- А) туберкулеза
- Б) гриппа
- В) дифтерии, коклюша, столбняка
- Г) кори, ветряной оспы, краснухи

1085. [T016382] ЛАБОРАНТАМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ

- А) сибирской язвы
- Б) ветряной оспы
- В) коклюша
- Г) полиомиелита

1086. [T016383] ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) определение состояния здоровья пациента
- Б) проведение реабилитационных мероприятий
- В) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- Г) своевременное выявление инфекционных заболеваний

1087. [T016384] МОДИФИЦИРОВАННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) активное и пассивное курение
- Б) проживание в местности с хвойным лесом
- В) гиподинамия
- Г) повышенные физические нагрузки

1088. [T016385] МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожирение
- Б) психорегические стрессы
- В) наследственность
- Г) артериальная гипертензия

1089. [T016387] МАММОГРАФИЯ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ЖЕНЩИНАМ

- А) 1 раз в два года
- Б) по показаниям
- В) 2 раза в год
- Г) ежегодно

1090. [T016388] ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) соблюдении режима физической активности, диеты, здорового образа жизни
- Б) физиотерапевтических методах лечения
- В) механических методах лечения, в занятиях лечебной физкультурой
- Г) медикаментозной терапии

1091. [T016389] СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ПРИВИВКЕ, КОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТСЯ В СЕРТИФИКАТЕ

- А) вид препарата, серия, контрольный номер
- Б) вид препарата, серия
- В) вид препарата, цвет вакцинного препарата
- Г) вид препарата, срок годности

1092. [Т016390] ЦЕЛЬЮ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) формирование знаний и умений самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся сохранения и укрепления здоровья
- Б) обучение правилам ведения домашнего хозяйства с учетом гигиенических и социально культурных традиций
- В) расширение знаний в медико-гигиенических вопросах, подготовка к действиям в экстремальных условиях
- Г) обучение правилам оказания первой помощи при заболеваниях и травмах

1093. [Т016392] К ДВИГАТЕЛЬНОМУ РЕЖИМУ, ПРИ КОТОРОМ РАЗРЕШЕНЫ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУРИЗМ) ОТНОСИТСЯ РЕЖИМ

- А) тренирующий
- Б) свободный
- В) щадящий
- Г) щадяще-тренирующий

1094. [Т016394] НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ И ЧАСТЫМ ВИДОМ ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППА ИНВАЛИДОВ

- А) по общему заболеванию
- Б) труда
- В) войны
- Г) с детства

1095. [Т016395] ПРИНЦИПОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса
- Б) выявление заболеваний на ранних стадиях и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий
- В) накопление контингентов в легких группах за счет уменьшения их в тяжелых
- Г) выявление ранних стадий заболеваний по степени активности

1096. [Т016396] ПОКАЗАТЕЛЬ «ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЕЙ» ОТРАЖАЕТ

- А) отношение количества лиц, прошедших диспансеризацию, к общему числу лиц, подлежащих диспансеризации
- Б) отношение числа зарегистрированных заболеваний к численности проживающего населения
- В) отношение численности населения, которому проведены необходимые исследования и осмотры врачей к числу зарегистрированных случаев заболеваний
- Г) отношение числа зарегистрированных заболеваний к общему числу лиц с временной и стойкой нетрудоспособностью

1097. [Т016397] ОДНОЙ ИЗ ГРУПП УЧЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) здоровые
- Б) женщины
- В) подростки
- Г) дети

1098. [Т016398] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПЕРВОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТ

- А) выявление бактерионосителей
- Б) соблюдение личной гигиены
- В) употребление доброкачественной воды
- Г) санитарно-просветительская работа

1099. [Т016399] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ВТОРОЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ

- А) заключительная дезинфекция
- Б) иммунопрофилактика
- В) госпитализация больных
- Г) санитарно-просветительская работа

1100. [Т016400] К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ТРЕТЬЕ ЗВЕНО ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ

- А) иммунопрофилактика контактных
- Б) дератизация

В) дезинфекция

Г) изоляция больных

1101. [T016401] ПОД ФАКТОРАМИ РИСКА ПОНИМАЮТ

А) факторы, способствующие развитию заболеваний

Б) мешающие факторы (конфаундеры), искажающие результаты исследований

В) случайные ошибки в исследованиях

Г) факторы, способствующие возникновению ошибок при анализе полученных результатов

1102. [T016402] ПОНЯТИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ОЧАГ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

А) место пребывания источника инфекции с окружающей его территорией в тех пределах, в которых он способен в данной конкретной обстановке, при данной инфекции передавать заразное начало окружающим

Б) территория, на которой осуществляется процесс взаимодействия популяции паразита и популяции хозяина

В) территория, на которой после отсутствия случаев инфекционных болезней в течение максимального инкубационного периода выявляется новый случай инфекционного заболевания

Г) территория, на которой длительное время сохраняются заболевания среди диких животных

1103. [T016403] ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

А) контагиозность

Б) тяжесть течения

В) острое течение

Г) переход в хроническую форму

1104. [T016404] НОСИТЕЛЬСТВО - ЭТО ТАКАЯ ФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРО- И МАКРООРГАНИЗМА, ПРИ КОТОРОЙ

А) микроб не вызывает патологических изменений в тканях

Б) возникают патологические изменения в органах и тканях

В) характерна крайне тяжелая степень поражения тканей

Г) происходит гибель микроорганизма

1105. [T016406] ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОКАЗЫВАЕТ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

А) увеличивает жизненную емкость легких

Б) нормализует процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга

В) улучшает периферическое кровообращение

Г) понижает артериальное давление

1106. [T016407] ПРЕВЕНТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ НАПРАВЛЕНА НА

А) сохранение здоровья населения за счет предупреждения заболеваний

Б) устранение стойкой нетрудоспособности

В) лечебный процесс

Г) сокращение временной нетрудоспособности

1107. [T016408] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

А) определить уровень глюкозы в крови натощак

Б) провести глюкозотолерантный тест

В) ограничить употребление углеводов

Г) определить уровень базального инсулина

1108. [T016409] БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

А) врача-аллерголога

Б) врача-инфекциониста

В) врача-онколога

Г) врача-хирурга

1109. [T016410] К МЕТОДАМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) обращаемость за медицинской помощью

Б) перепись населения

В) перепись больных

Г) антропометрическое измерение

1110. [T016411] К ЗАБОЛЕВАНИЯМ С НАСЛЕДСТВЕННЫМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ

А) бронхиальная астма

Б) туберкулез

В) легочный протеиноз

Г) пневмония

1111. [Т016412] ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

А) ожидаемая продолжительность жизни населения

Б) средняя продолжительность жизни

В) уровень детской смертности

Г) трудовой потенциал населения

1112. [Т016413] ИСТОЧНИКОМ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

А) статистический талон уточненных диагнозов

Б) медицинская карта стационарного больного

В) контрольная карта диспансерного наблюдения

Г) листок временной нетрудоспособности

1113. [Т016414] УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

Б) медицинская карта амбулаторного больного

В) медицинская карта стационарного больного

Г) статистический талон уточненных диагнозов

1114. [Т016415] В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНИМАЮТ

А) сердечно-сосудистые заболевания

Б) заболевания органов дыхания

В) травмы, несчастные случаи, отравления

Г) злокачественные образования

1115. [Т016416] ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ ЛИЦУ СО СТОЙКОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

А) медико-социальной экспертной комиссией

Б) клинико-экспертной комиссией

В) заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности

Г) заведующим отделением

1116. [Т016417] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТАБАКОЗАВИСИМОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ

А) психотерапия, заместительная терапия

Б) физиотерапия, фармакотерапия

В) дыхательная гимнастика, фитотерапия

Г) гелиотерапия, аэротерапия

1117. [Т016420] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ В СУТКИ ДО

А) 5 г

Б) 6 г

В) 10 г

Г) 15 г

1118. [Т016421] ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНТОСКОПИЮ ПРОВОДЯТ НА _____ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

А) втором

Б) первом

В) четвертом

Г) третьем

1119. [Т016423] К ОСМОТРУ ПАЦИЕНТА С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА С ЧАСТЫМИ РЕЦИДИВАМИ ПРИВЛЕКАЕТСЯ

А) врач-онколог

Б) врач-невролог

В) врач-эндокринолог

Г) врач-оториноларинголог

1120. [Т016425] ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА НАБЛЮДАТЬ ЗА РЕБЕНКОМ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 30 минут
- Б) 1-го часа
- В) 2-х часов
- Г) 3-х часов

1121. [Т016426] ПРИ ЛЮБОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЗАБОЛЕВАНИИ НЕОБХОДИМО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОВЕСТИ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

- А) выделений больного
- Б) одежды больного
- В) посуды больного
- Г) постельного белья

1122. [Т016427] ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

- А) воздух, пыль в помещении
- Б) вода
- В) насекомые
- Г) инъекционные инструменты

1123. [Т016428] ДЛИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ – ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

- А) злокачественные опухоли кожи
- Б) болезней сердечно-сосудистой системы
- В) болезни выделительной системы
- Г) болезней пищеварения

1124. [Т016429] СУХОЙ ВОЗДУХ, ПЫЛЬ – ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) органов дыхания
- Б) мочевыделительной системы
- В) эндокринной системы
- Г) нервной системы

1125. [Т016431] В СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ВЗРОСЛОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _____ ЧАСОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ _____ МИНУТ

- А) 2 часа; 15 минут
- Б) 3 часа; 15 минут
- В) 4 часа; 30 минут
- Г) 5 часов; 45 минут

1126. [Т016432] ЗАКАЛИВАЮЩАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ОРГАНИЗМА ДОЛЖНА ЗАКАНЧИВАТЬСЯ

- А) согреванием
- Б) охлаждением
- В) обливанием холодной водой
- Г) охлаждением стоп

1127. [Т016433] СТРЕССОВЫЕ СИТУАЦИИ, СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ, НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА И ОТДЫХА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ

- А) биоритмов
- Б) качества жизни
- В) стиля жизни
- Г) принципов рационального питания

1128. [Т016434] С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА И ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ ПРОВОДИТСЯ

- А) флюорографическое обследование прикрепленного контингента населения
- Б) работа в эпидемическом очаге
- В) организация и проведение школ здоровья
- Г) организация и проведение вакцинации на участке

1129. [Т016435] ОБЩЕЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ МОЖЕТ БЫТЬ

- А) повышение температуры
- Б) появление гиперемии кожи
- В) отечность мягких тканей
- Г) небольшой инфильтрат

1130. [Т016436] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ

- А) наклоны туловища
- Б) бег
- В) приседания
- Г) быструю ходьбу

1131. [T016437] ПРОФИЛАКТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) третичная
- Б) вторичная
- В) первичная
- Г) социальная

1132. [T016438] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) целевое санитарно-гигиеническое воспитание
- Б) предупреждение развития профессиональных заболеваний
- В) снижение влияния факторов риска
- Г) формирование здорового образа жизни

1133. [T016439] СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
- Б) ранней диагностикой заболеваний
- В) снижением инвалидности
- Г) воздействием через средства массовой информации

1134. [T016440] ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ БОГАТЫХ

- А) белками
- Б) калием
- В) углеводами
- Г) клетчаткой

1135. [T016441] ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА БОЛЬНОМУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЮ ЖЕЛУДКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) механически и химически щадящее питание
- Б) разгрузочные дни
- В) ограничение животных жиров
- Г) повышенное количество белка

1136. [T016442] В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЮ ОГРАНИЧИВАЮТ

- А) поваренную соль
- Б) белки
- В) растительные жиры
- Г) витамины

1137. [T016443] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- А) возраст
- Б) курение
- В) гиподинамия
- Г) нерациональное питание

1138. [T016444] ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) ожирение
- Б) возраст
- В) пол
- Г) наследственность

1139. [T016445] НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственность
- Б) табакокурение
- В) респираторные заболевания
- Г) гиподинамия

1140. [T016446] ОСНОВНЫМ МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) курение
- Б) возраст
- В) гиподинамия

- Г) пол
1141. [T016447] К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ
А) ожирение
Б) наследственность
В) возраст
Г) пол
1142. [T016448] К НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВТОРОГО ТИПА ОТНОСИТСЯ
А) наследственность
Б) ожирение
В) гиподинамия
Г) нерациональное питание
1143. [T016449] ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ РЕВМАТИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ
А) переохлаждение
Б) перегревание
В) переедание
Г) недостаточное питание
1144. [T016450] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
А) санации очагов инфекции
Б) санаторно-курортном лечении
В) диспансерном наблюдении
Г) противорецидивной терапии
1145. [T016451] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
А) гиподинамия и избыточный вес
Б) ревматизм
В) хронический очаг инфекции
Г) психическое перенапряжение
1146. [T016452] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПИТАНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ
А) ограничение жиров
Б) ограничение белков
В) увеличение углеводов
Г) увеличение содержания соли
1147. [T016453] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ
А) дыхательной системы
Б) нервной системы
В) сердечно-сосудистой системы
Г) эндокринной системы
1148. [T016454] ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) ведение здорового образа жизни
Б) восстановление после заболеваний
В) лечение обострений заболеваний
Г) профилактика осложнений
1149. [T016455] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ
А) формирование здорового образа жизни
Б) предотвращение осложнений заболевания
В) предотвращение рецидивов заболевания
Г) назначение белковой диеты
1150. [T016456] ПИЩЕВОЙ РАЦИОН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ
А) ограниченное количество углеводов
Б) большое количество углеводов
В) большое количество белка
Г) ограниченное количество белков

1151. [T016457] КУРЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) бронхита
- Б) гастрита
- В) гепатита
- Г) ожирения

1152. [T016458] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) наследственная предрасположенность
- Б) гиподинамия
- В) интенсивные физические нагрузки
- Г) нерациональное питание

1153. [T016459] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ

- А) заболеваний органов дыхания
- Б) сердечно-сосудистых заболеваний
- В) заболеваний почек
- Г) заболеваний пищеварительной системы

1154. [T016460] НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- А) сердечно-сосудистых заболеваний
- Б) обструктивного бронхита
- В) заболеваний почек
- Г) психических заболеваний

1155. [T016461] РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) проведении бесед по формированию здорового образа жизни
- Б) создании профилактических программ
- В) лечении заболеваний на ранних стадиях
- Г) предупреждении рецидива заболевания

1156. [T016462] ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА

- А) быть адекватной
- Б) уменьшаться
- В) увеличиваться
- Г) отсутствовать

1157. [T016463] ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КАНЦЕРОГЕНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- А) онкологических
- Б) сердечно-сосудистых
- В) эндокринных
- Г) нервных

1158. [T016464] ПРОФИЛАКТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) предупреждение аборт
- Б) высококалорийное питание
- В) лечение соматических заболеваний
- Г) низкокалорийное питание

1159. [T016465] ГИПОДИНАМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА

- А) ожирения
- Б) бронхита
- В) гепатита
- Г) гастрита

1160. [T016466] РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕРОПРИЯТИЕМ

- А) первичной профилактики
- Б) вторичной профилактики
- В) третичной профилактики
- Г) популяционной профилактики

1161. [T016467] ПРИ ОЖИРЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДУЮТ

- А) увеличить
- Б) уменьшить
- В) не изменять

- Г) исключить
1162. [T016468] ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ
- А) индекс курящего человека
 - Б) тест Фогестрема
 - В) тест Хорна
 - Г) тип курительного поведения
1163. [T016469] ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У ЛИЦ С
- А) индексом курящего человека больше 160
 - Б) высокой степенью никотиновой зависимости
 - В) низкой степенью готовности к отказу от курения
 - Г) высоким индексом курящего человека
1164. [T016472] ФАКТОРОМ, ПРОВОЦИРУЮЩИМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) чрезмерное физическое и психическое перенапряжение
 - Б) переохлаждение
 - В) недостаточное питание
 - Г) гиподинамия
1165. [T016473] К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- А) неблагоприятные условия труда
 - Б) качество медицинской помощи
 - В) возраст родителей
 - Г) загрязнение окружающей среды
1166. [T016474] К СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- А) отягощенная наследственность
 - Б) качество медицинской помощи
 - В) условия труда
 - Г) качество питания
1167. [T016475] К МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ
- А) низкий уровень доступности и качества медицинской помощи
 - Б) отягощенная наследственность
 - В) низкий материальный уровень жизни
 - Г) несбалансированное питание
1168. [T016476] К ИЗМЕНЯЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ
- А) табакокурение
 - Б) отягощенная наследственность
 - В) ослабление иммунитета
 - Г) возраст
1169. [T016477] ЭНДОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) наследственные иммунологические дефекты
 - Б) действие радиации
 - В) действие химических канцерогенов
 - Г) действие инфекционных агентов
1170. [T016478] ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) действие химических канцерогенов
 - Б) наследственная предрасположенность
 - В) иммунологические дефекты
 - Г) предрасполагающие заболевания
1171. [T016479] МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ
- А) целевыми
 - Б) предварительными
 - В) предупредительными
 - Г) текущими

1172. [T016480] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПРОВОДЯТ

- А) постоянно действующие комиссии по организации диспансеризации
- Б) Министерство здравоохранения
- В) медицинские университеты
- Г) ведущие специалисты, главные врачи, руководители предприятий

1173. [T016481] В ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ

- А) 2 этапа
- Б) 4 этапа
- В) 3 этапа
- Г) 6 этапов

1174. [T016483] ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) выявления ранних форм заболеваний и факторов риска
- Б) коррекции лечения
- В) выявления заболеваний на поздних стадиях
- Г) формирования отчетности

1175. [T016484] ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1-2 раза в год
- Б) 1 раз в год
- В) 3-6 раз в год
- Г) 3-5 раз в год

1176. [T016487] ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКУ ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВОДИТЬ

- А) медперсонал, прошедший подготовку в области вакцинопрофилактики
- Б) участковая медсестра
- В) фельдшер
- Г) процедурная медсестра

1177. [T016488] ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ, ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ

- А) вакцинация в 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет
- Б) вакцинация на 3 – 7 день жизни, первая ревакцинация в 7 лет, вторая ревакцинация в 14 лет
- В) первая вакцинация в 3 месяца, вторая вакцинация в 4,5 месяца, третья вакцинация в 6 месяцев
- Г) только по эпидемическим показаниям

1178. [T016489] АБСОЛЮТНОЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ВАКЦИН

- А) сильная реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение
- Б) острое респираторное вирусное заболевание
- В) переливание крови или иммуноглобулинов в анамнезе
- Г) наличие насморка без температуры

1179. [T016490] СЕРТИФИКАТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ (Ф.156/У-93) ХРАНИТСЯ

- А) у пациента
- Б) в регистратуре медицинской организации
- В) у участкового врача
- Г) в прививочном кабинете поликлиники

1180. [T016491] ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ

- А) в 3 месяца
- Б) на 3-7 сутки после рождения
- В) в первые 12 ч после рождения
- Г) в 12 месяцев

1181. [T016492] НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВАКЦИНАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) анафилактический шок
- Б) гиперемия на месте инъекции
- В) повышение температуры тела до 38.С
- Г) местное повышение температуры

1182. [T016493] В ДЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕНЕ

- А) не проводятся другие прививки
- Б) может проводится вакцинация против гриппа

- В) может проводится вакцинация против кори
Г) может проводится вакцинация против полиомиелита
1183. [T016495] ВАКЦИНА АКДС ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВВОДИТСЯ
- А) внутримышечно
Б) перорально
В) подкожно
Г) внутрикожно
1184. [T016496] ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ПРОВОДИТСЯ ТРЁХКРАТНО С ИНТЕРВАЛОМ
- А) 45 дней
Б) 15 дней
В) 30 дней
Г) 60 дней
1185. [T016497] РУБЧИК НА МЕСТЕ ВВЕДЕНИЯ БЦЖ-ВАКЦИНЫ ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ
- А) 3-6 месяцев
Б) 1-6 недель
В) 2-3 недели
Г) 10-12 месяцев
1186. [T016499] СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПОЛИОМИЕЛИТНОЙ ВАКЦИНЫ
- А) закапывают стерильной пипеткой за 1 час до еды
Б) внутривенно
В) подкожно
Г) внутрикожно
1187. [T016500] ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРИ
- А) напряженный стойкий
Б) не вырабатывается
В) кратковременный, в течении 1 года
Г) кратковременный, в течении 2 лет
1188. [T016501] ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИСПОЛЬЗУЮТ
- А) туберкулинодиагностику
Б) введение БЦЖ вакцины
В) флюорографическое обследование
Г) введение АКДС вакцины
1189. [T016502] ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ СХЕМУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ
- А) национальный календарь профилактических прививок
Б) прививочный сертификат
В) приказ Минздрава Росси от 03.12.2012 №1006н
Г) экстренное извещение об инфекционном заболевании
1190. [T016503] О ПРАВИЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА СУДЯТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ РУБЧИКА РАЗМЕРОМ
- А) 5-8 мм
Б) 0-12 мм
В) 2-3 мм
Г) 15-20 мм
1191. [T016504] ВАКЦИНУ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА ХРАНЯТ В
- А) холодильнике
Б) шкафу
В) сейфе
Г) контейнере
1192. [T016506] ВАКЦИНА БЦЖ ВВОДИТСЯ
- А) внутрикожно
Б) внутримышечно
В) подкожно
Г) внутривенно
1193. [T016507] ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ СТОЛБНЯКА ВВОДЯТ
- А) анатоксин столбнячный
Б) АДСК

- В) противостолбнячную вакцину
Г) пирогенал
1194. [Т016508] ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСНАЩЕН
- А) холодильником
Б) сейфом
В) сухожаровым шкафом
Г) шкафом для дезинфицирующих растворов
1195. [Т016509] ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ ПРОВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ
- А) 45 дней
Б) 15 дней
В) 30 дней
Г) 60 дней
1196. [Т016510] ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ
- А) 1 месяца
Б) 2 месяцев
В) 6 месяцев
Г) 2 недель
1197. [Т016511] К КОМБИНИРОВАННЫМ ВАКЦИНАМ ОТНОСИТСЯ
- А) «Бубо-М»
Б) БЦЖ
В) паротитная вакцина
Г) коревая вакцина
1198. [Т016512] ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ
- А) БЦЖ
Б) АКДС
В) АДС – М
Г) туберкулин
1199. [Т016513] ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ АКДС, СОГЛАСНО КАЛЕНДАРЮ ПРИВИВОК, ПРОВОДИТСЯ В
- А) 3 месяца
Б) 6 месяцев
В) 7 месяцев
Г) 5 месяцев
1200. [Т016514] КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) снижение артериального давления
Б) боль в суставах
В) повышение артериального давления
Г) эйфория
1201. [Т016515] ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
- А) проведении прививок
Б) проведении медицинских осмотров
В) улучшении условий труда и отдыха
Г) повышении материального благосостояния
1202. [Т016516] ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ВХОДИТ В СОСТАВ
- А) поликлиники
Б) стационара
В) диспансера
Г) родильного дома
1203. [Т016518] МЕДИЦИНСКИЙ СКРИНИНГ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОВОДИТСЯ ПУТЕМ
- А) профилактических медицинских осмотров
Б) привлечения населения к занятию физической культурой и спортом
В) проведения иммунопрофилактики
Г) проведения экологического и санитарно-гигиенического скрининга
1204. [Т016521] НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ МОНИТОРИНГА ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ
- А) анкетирование
Б) физикальные исследования

- В) лабораторные исследования
Г) инструментальные исследования
1205. [Т016523] ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) воздействием через средства массовой информации
Б) ранней диагностикой заболеваний
В) снижением факторов риска
Г) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
1206. [Т016524] СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
- А) ранней диагностикой заболеваний
Б) выявлением лиц с высоким уровнем факторов риска
В) снижением смертности
Г) воздействием через средства массовой информации
1207. [Т016528] НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ
- А) анкетирование
Б) консультация врача хирурга
В) сканирование брахицефальных артерий
Г) консультация врача уролога
1208. [Т016529] НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ ПЕДИАТР ПРОВОДИТ ОСМОТР РЕБЕНКА
- А) 1 раз в месяц
Б) 2 раза в месяц
В) 1 раз в полгода
Г) 1 раз в 3 месяца
1209. [Т016530] ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ
- А) 5 групп здоровья
Б) 3 группы здоровья
В) 4 группы здоровья
Г) 7 групп здоровья
1210. [Т016531] ПЕРВЫЙ ОСМОТР РЕБЕНКА ВРАЧОМ НЕВРОЛОГОМ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ
- А) 1 месяца
Б) 3 месяцев
В) 6 месяцев
Г) 1 года
1211. [Т016532] НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ
- А) консультация врача хирурга
Б) УЗИ органов брюшной полости
В) маммография
Г) флюорография легких
1212. [Т016533] ЛИЦА, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИМЕЮТСЯ ФАКТОРЫ РИСКА ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К
- А) второй группе здоровья
Б) третьей группе здоровья
В) первой группе здоровья
Г) четвертой группе здоровья
1213. [Т016534] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
- А) 1 раз в 3 года
Б) 1 раз в 2 года
В) 1 раз в 5 лет
Г) 2 раза в год
1214. [Т016536] НА ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ НУЖДАЮЩИЕСЯ
- В
- А) дополнительном обследовании
Б) уточнении диагноза
В) углубленном профилактическом консультировании
Г) лечении
1215. [Т016537] ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПОСРЕДСТВОМ
- А) анкетирования пациентов
Б) проведением физикальных методов исследования

- В) проведением ряда лабораторных и инструментальных исследований
Г) проведением ряда инструментальных исследований
1216. [T016538] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ
А) информированного добровольного согласия пациента или его законного представителя
Б) направления врача
В) заключения врача
Г) только информированного добровольного согласия пациента
1217. [T016539] ПРИ ПОВЫШЕННОМ ВНУТРИГЛАЗНОМ ДАВЛЕНИИ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К
А) врачу-офтальмологу
Б) врачу-оториноларингологу
В) врачу-неврологу
Г) врачу-акушер-гинекологу
1218. [T016540] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ АНАЛИЗА КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЮТ К
А) врачу-проктологу
Б) врачу-офтальмологу
В) врачу-неврологу
Г) врачу-оториноларингологу
1219. [T016541] ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЯМ ПРОВОДЯТ В ВОЗРАСТЕ
А) 15 лет
Б) 7 лет
В) 13 лет
Г) 10 лет
1220. [T016542] ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДЯТ
А) при поступлении на работу или учебу
Б) школьникам, студентам
В) для раннего выявления ряда заболеваний
Г) ежегодно
1221. [T016543] ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТ
А) школьникам, студентам
Б) при поступлении на работу или учебу
В) всем лицам, обращающимся за медицинской помощью
Г) только работающей части населения
1222. [T016544] ВАКЦИНЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В
А) холодильнике при температуре от +2 до +8
Б) специально отведенном шкафу
В) сейфе
Г) кабинете участковой медицинской сестры
1223. [T016546] ПРИВИВКИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДЯТ
А) проживающим на территориях с высоким риском заражения
Б) согласно Национального календаря профилактических прививок
В) реконвалесцентам инфекционных заболеваний
Г) больным инфекционными заболеваниями
1224. [T016547] РЕАКЦИЮ МАНТУ У ДЕТЕЙ ПРОВОДЯТ НАЧИНАЯ С ВОЗРАСТА
А) 12 месяцев
Б) 15 лет
В) 1 месяца
Г) 3 месяцев
1225. [T016548] ПРИВИВКИ ПРОТИВ ГРИППА ПРОВОДЯТ
А) при угрозе эпидемии гриппа
Б) больным гриппом
В) переболевшим гриппом
Г) выезжающим за границу страны
1226. [T016549] МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСЕЛЕНИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК
А) индивидуальная, групповая, популяционная
Б) индивидуальная и популяционная
В) индивидуальная и групповая

- Г) только групповая
1227. [Т016550] ОДНОЙ ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПИТАНИЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) снижение потребления насыщенных жиров
Б) потребление 300 г фруктов в день
В) потребление более 5 г соли
Г) потребление рыбы, не менее 2 раз в месяц
1228. [Т016551] МЕДИКО-АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
А) запрет въезда на неблагополучную территорию
Б) изоляцию больного
В) осмотр прибывших из неблагополучных регионов
Г) дезинфекцию помещений
1229. [Т016552] МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ КАРАНТИН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
А) изоляцию больного
Б) запрет въезда на неблагополучную территорию
В) закрытие государственных границ
Г) введение особых правил государственных границ пересечения
1230. [Т016553] НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ
А) использование индивидуальных мер защиты
Б) вакцинацию
В) введение сывороток
Г) введение вакцин и сывороток
1231. [Т016554] СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ
А) введение вакцин
Б) мытье рук
В) проветривание помещений
Г) повышение общей сопротивляемости организма
1232. [Т016555] ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ОРГАНИЗМЕ И СНИЖЕНИЕ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ
А) предболезнь
Б) болезнь
В) реабилитация
Г) заболеваемость
1233. [Т016556] ПРОЦЕСС, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ВИДЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, НАЗЫВАЕТСЯ
А) болезнь
Б) адаптация
В) заболеваемость
Г) предболезнь
1234. [Т016557] ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ХРОНИЧЕСКИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТСУТСТВУЮТ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ К
А) I группе состояния здоровья
Б) II группе состояния здоровья
В) III группе состояния здоровья
Г) IV группе состояния здоровья
1235. [Т016561] ОСНОВНОЙ МЕРОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
А) борьба с табакокурением
Б) соблюдение принципов рационального питания
В) адекватная физическая нагрузка
Г) борьба со стрессом
1236. [Т016562] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВКЛЮЧАЕТ
А) соблюдение принципов здорового образа жизни
Б) консультирование по бесплодию
В) выявление заболеваний репродуктивной системы
Г) лечение бесплодия

1237. [T016563] МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) употребление продуктов, богатых йодом
- Б) употребление продуктов, богатых железом
- В) ограничение в пищевом рационе белков
- Г) ограничение употребления соли

1238. [T016564] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ИМ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ СОСТОЯНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) первичной профилактикой
- Б) вторичной профилактикой
- В) третичной профилактикой
- Г) медицинской профилактикой

1239. [T016565] УМЕНЬШЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДИЗАЦИИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ

- А) вторичной профилактики
- Б) первичной профилактики
- В) третичной профилактики
- Г) социальной профилактики

1240. [T016566] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВОВ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ

- А) вторичной профилактики
- Б) организации специализированной медицинской помощи
- В) первичной профилактики
- Г) социальной профилактики

1241. [T016567] ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ БЕШЕНСТВА ПРОВОДЯТ

- А) ветеринарам
- Б) геологам
- В) всему населению начиная с 10-летнего возраста
- Г) всему населению начиная с 16-летнего возраста

1242. [T016569] СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) вакцинация
- Б) ношение лицевых масок
- В) кварцевание помещений
- Г) влажная уборка помещений

1243. [T016570] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ С АЭРОГЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ НЕОБХОДИМО

- А) проветривать помещение
- Б) строго соблюдать правила антисептики
- В) тщательно мыть овощи перед употреблением
- Г) осуществлять борьбу с насекомыми

1244. [T016571] ПРИ ВВЕДЕНИИ ВАКЦИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) активный искусственный иммунитет
- Б) пассивный искусственный иммунитет
- В) активный естественный иммунитет
- Г) стойкий иммунитет

1245. [T016572] ПРИ ВВЕДЕНИИ СЫВОРОТОК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

- А) пассивный приобретенный иммунитет
- Б) активный искусственный иммунитет
- В) активный естественный иммунитет
- Г) стойкий иммунитет

1246. [T016573] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) текущая
- Б) заключительная
- В) физическая
- Г) профилактическая

1247. [T016574] ГРАЖДАНИН ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В УЧРЕЖДЕНИИ

- А) первичной медико-санитарной помощи
- Б) медицинском специализированном
- В) социального обслуживания

- Г) диспансерного обслуживания
1248. [T016576] ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОВЕДЕНИЯ
А) вторичной профилактики
Б) первичной профилактики
В) социальной профилактики
Г) популяционной профилактики
1249. [T016577] МЕРОЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
А) рациональном питании населения
Б) приеме таблетированных витаминов
В) ограничении двигательной активности
Г) наблюдении у эндокринолога
1250. [T016578] В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
А) ежемесячно
Б) еженедельно
В) 1 раз в два месяца
Г) 1 раз в полгода
1251. [T016579] НАУЧНОЙ ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ
А) факторов риска
Б) здорового образа жизни
В) борьбы с вредными привычками
Г) индивидуальной профилактики
1252. [T016580] К МЕТОДАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ
А) режим питания, умеренная физическая нагрузка, контроль массы тела
Б) трехразовое обильное питание, гиподинамия
В) занятие с анаэробной физической нагрузкой
Г) ограничение физической нагрузки, прием биодобавок
1253. [T016581] ОСНОВНОЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) - ОТКАЗ ОТ
А) курения и профилактика инфекционных болезней легких
Б) легкоусвояемой и высококалорийной пищи
В) применения медикаментозной терапии
Г) вакцинации
1254. [T016582] ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ
А) отказ от курения, чрезмерного употребления алкоголя, гиподинамии
Б) выявление и лечение рецидивов заболеваний
В) раннее выявление и устранение онкологических заболеваний
Г) профилактика повторного возникновения опухолей после лечения
1255. [T016583] ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ
А) выявление и устранение предраковых заболеваний
Б) нормализация массы тела
В) соблюдение диеты
Г) регулярная физическая активность
1256. [T016584] В ОЧАГЕ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ
А) ежедневный осмотр видимых слизистых оболочек и кожных покровов, термометрию у контактных
Б) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе
В) бактериологическое обследование контактных
Г) введение контактным иммуноглобулина
1257. [T016585] В ОЧАГЕ СКАРЛАТИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ
А) разобщение контактных и наблюдение за ними
Б) активную иммунизацию контактных
В) введение контактным иммуноглобулина
Г) бактериологическое обследование контактных
1258. [T016586] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- А) пациентом на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1259. [Т016587] РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ПРИНИМАТЬСЯ

- А) законным представителем пациента (для детей младше 15 лет) на основе информированного согласия (в письменном виде), после ознакомления с полезными эффектами и возможными рисками процедуры
- Б) медицинской сестрой на основе рекомендаций врача, согласно Национальному календарю профилактических прививок
- В) врачом в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия законного представителя пациента
- Г) врачом в соответствии с индивидуальным графиком профилактических прививок, независимо от наличия информированного согласия пациента

1260. [Т016588] АСЕПТИКА – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- В) уничтожение болезнетворных микробов
- Г) уничтожение всего живого

1261. [Т016589] АНТИСЕПТИКА – ЭТО

- А) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- Б) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- В) уничтожение болезнетворных микробов
- Г) мероприятия по обеззараживанию помещений

1262. [Т016590] К ФИЗИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) дренирование раны
- Б) промывание раны антисептиком
- В) первичная хирургическая обработка раны
- Г) удаление некротических тканей из раны

1263. [Т016591] СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО

- А) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих
- Б) уничтожение патогенных микробов
- В) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов
- Г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения

1264. [Т016592] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 180° С - 1 час
- Б) 200° С - 40 мин
- В) 180° С - 3 часа
- Г) 120°С - 40 мин

1265. [Т016593] К ЭНДОГЕННУМУ ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ ОТНОСИТСЯ

- А) лимфогенный
- Б) воздушно-капельный
- В) воздушно-пылевой
- Г) контактный

1266. [Т016594] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ В ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

- А) парентеральным
- Б) воздушно-капельным
- В) алиментарным
- Г) воздушно-пылевым

1267. [Т016598] ПРИЧИНА ИММУНОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- А) поражении Т-лимфоцитов
- Б) поражении В-клеток

- В) поражении эритроцитов
Г) поражение моноцитов
1268. [Т016599] ДЕЗИНСЕКЦИЯ - ЭТО УНИЧТОЖЕНИЕ
А) клещей
Б) грызунов
В) вирусов
Г) патогенных микроорганизмов
1269. [Т016600] НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
А) химический
Б) термический
В) механический
Г) комбинированный
1270. [Т016601] ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОДИТСЯ
А) дезинфекция + предстерилизационная очистка + стерилизация
Б) дезинфекция
В) дезинфекция + предстерилизационная очистка
Г) стерилизация
1271. [Т016602] К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ОТНОСЯТ
А) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание или осложнение, у пациентов или медицинских работников, связанное с оказанием любых видов медицинской помощи
Б) любое инфекционное заболевание, возникшее в стационаре
В) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, с которым пациент поступил в стационар
Г) инфекцию, передающуюся половым путем
1272. [Т016603] СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
А) половой
Б) алиментарный
В) воздушно-капельный
Г) трансмиссивный
1273. [Т016604] ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А) СанПиН 2.1.3 2630-2010
Б) Трудовой кодекс Российской Федерации
В) Конституция Российской Федерации
Г) Этический Кодекс медицинской сестры России
1274. [Т016605] К УНИВЕРСАЛЬНЫМ МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСИТСЯ ПРАВИЛО
А) считать каждого пациента потенциально инфицированным
Б) мытья рук перед выполнением инвазивных манипуляций
В) мытья рук перед уходом за тяжелобольными пациентами
Г) использование антисептика для рук после инъекции
1275. [Т016606] ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЫТЬЕ РУК
А) под проточной водой с мылом
Б) достижения стерильности кистей рук на определенное время
В) под проточной водой с мылом с последующим одеванием перчаток
Г) антисептиком
1276. [Т016607] ЦСО - ЭТО
А) центральное стерилизационное отделение
Б) центральное специализированное отделение
В) централизованное специализированное отделение
Г) центральное стерильное отделение
1277. [Т016608] ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ
А) физическому
Б) механическому
В) химическому

- Г) комбинированному
1278. [T016609] К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
А) полное погружение в дезинфицирующий раствор
Б) пароформалиновый метод
В) паровоздушный метод
Г) газовый метод
1279. [T016610] ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ПАЦИЕНТА В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ
А) очаговая заключительная дезинфекция
Б) текущая дезинфекция
В) профилактическая дезинфекция
Г) очаговая текущая дезинфекция
1280. [T016611] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ
А) один раз в неделю
Б) два раза в неделю
В) один раз в две недели
Г) один раз в месяц
1281. [T016612] ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ
А) после окончания работы
Б) 1 раз в месяц
В) 2 раза в неделю
Г) 1 раз в неделю
1282. [T016613] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ШПРИЦЫ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩАЮТ В ПАКЕТЫ
А) желтого цвета
Б) белого цвета
В) красного цвета
Г) черного цвета
1283. [T016614] ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ
А) удаления дезинфектантов, белковых, жировых, лекарственных и др. загрязнений
Б) дезинфекции
В) удаления белковых загрязнений
Г) удаления лекарственных средств
1284. [T016615] ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБА
А) амидопириновая
Б) с суданом-3
В) с суданом-4
Г) фенолфталеиновая
1285. [T016616] ЦЕЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА
А) профилактика профессионального заражения
Б) обеспечение кратковременной стерильности
В) создание продолжительной стерильности
Г) удаление бытового загрязнения
1286. [T016617] ПРОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АНТИСЕПТИКИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ
А) средств биологического происхождения
Б) первичной хирургической обработки ран
В) дренирования ран
Г) обработки ран с 3% раствором перекиси водорода
1287. [T016618] САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛЬНОСТИ
А) бактериологический
Б) биологический
В) физический
Г) химический
1288. [T016619] К ИСКУССТВЕННОМУ (АРТИФИЦИАЛЬНОМУ) ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ГЕМОКОНТАКТНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ

- А) медицинский: через кровь и ее компоненты, руки медперсонала, инструменты, перевязочный материал
Б) трансмиссивный
В) контактно-бытовой
Г) аэрозольный
1289. [Т016620] САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ
А) посева на питательные среды
Б) использования химических индикаторов
В) использования биологических индикаторов
Г) использования физических индикаторов
1290. [Т016621] УРОВЕНЬ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСИТ ОТ
А) характера манипуляции
Б) вида используемых антисептиков
В) наличия перчаток
Г) степени загрязнения
1291. [Т016622] МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТИСЕПТИКА ЭТО
А) удаление из раны нежизнеспособных тканей
Б) дренирование раны марлевым тампоном
В) промывание раны раствором водорода пероксида
Г) наложение давящей повязки
1292. [Т016623] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
А) трансмиссивный
Б) фекально-оральный
В) воздушно-капельный
Г) половой
1293. [Т016624] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ГРИППА
А) воздушно-капельный
Б) фекально-оральный
В) трансмиссивный
Г) половой
1294. [Т016625] ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
А) фекально-оральный
Б) воздушно-капельный
В) трансмиссивный
Г) половой
1295. [Т016626] ЧЕРЕЗ ГРУДНОЕ МОЛОКО МОЖЕТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВОЗБУДИТЕЛЬ
А) ВИЧ-инфекции (СПИДа)
Б) холеры
В) бешенства
Г) коклюша
1296. [Т016627] HELYCOBACTER PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ
А) язвенной болезни желудка
Б) бронхоэктатической болезни
В) гипертонической болезни
Г) желчекаменной болезни
1297. [Т016631] ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
А) шерсть животных
Б) пищевые красители
В) лекарственные препараты
Г) моющие средства
1298. [Т016632] ВДЫХАНИЕ ПЫЛЬЦЫ РАСТЕНИЙ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА В ВИДЕ
А) сенной лихорадки (поллиноза)
Б) контактного дерматита
В) гемолитической анемии
Г) гранулематозного воспаления
1299. [Т016635] ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА У МУЖЧИН НАЧИНАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ С
А) периода полового созревания
Б) момента рождения

- В) 7 лет
Г) 18 лет
1300. [Т016636] К ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ
А) париетальным и висцеральным листками плевры
Б) легким и перикардом
В) плеврой и перикардом
Г) листками плевры
1301. [Т016637] В СЕРДЦЕ МЕЖДУ ЛЕВЫМ ПРЕДСЕРДИЕМ И ЛЕВЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ
РАСПОЛОЖЕН
А) двустворчатый клапан
Б) трехстворчатый клапан
В) полулунный клапан
Г) четырехстворчатый клапан
1302. [Т016638] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ
ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮТ ДЛЯ ГРАЖДАН
А) 39 лет и старше
Б) 30 лет и старше
В) 36 лет и старше
Г) 40 лет и старше
1303. [Т016642] ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРОВОДИТСЯ
А) 1 раз в 3 года
Б) 1 раз в год
В) 1 раз в 2 года
Г) 1 раз в 5 лет
1304. [Т016643] ОБЯЗАННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ ВОЗЛАГАЮТСЯ НА
А) работодателя
Б) медицинские организации
В) инженера по охране труда
Г) инженера по технике безопасности
1305. [Т016644] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
А) 280 дней
Б) 320 дней
В) 250 дней
Г) 380 дней
1306. [Т016645] РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПЕРИОД ЖЕНЩИНЫ ВКЛЮЧАЕТ ПЕРИОД
А) наиболее благоприятный для зачатия, вынашивания и рождения ребенка
Б) полового созревания
В) угасания детородной функции
Г) полового покоя
1307. [Т016646] В ПУБЕРТАТНОМ ПЕРИОДЕ ДЕВОЧКИ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
А) активно развивается
Б) полностью развита
В) находится в состоянии покоя
Г) угасает
1308. [Т016647] ЖЕНЩИНЕ ПОСЛЕ РОДОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЖИТЬ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ В
ТЕЧЕНИЕ
А) 1,5-2-х месяцев
Б) 10-ти дней
В) 2-х недель
Г) 3-х недель
1309. [Т016648] ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУЛЬВОВАГИНИТА У ДЕВОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ
А) несоблюдение правил личной гигиены
Б) аномалия развития
В) переохлаждение
Г) умеренная физическая активность

1310. [T016649] К ПРОЯВЛЕНИЮ КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У ЖЕНЩИНЫ ОТНОСИТСЯ

- А) нарушение менструального цикла
- Б) увеличение веса
- В) боль в животе
- Г) снижение аппетита

1311. [T016650] ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НОРМАЛЬНОЙ МЕНСТРУАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 7-8 дней
- Б) 6-10 дней
- В) 3-5 дней
- Г) 1-2 дня

1312. [T016652] ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), ЯВЛЯЕТСЯ

- А) множество лечебно-диагностических процедур
- Б) возраст человека
- В) антропометрические показатели
- Г) пол человека

1313. [T016653] НАРУШЕНИЕ АСЕПТИКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИНЪЕКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) абсцессу
- Б) некрозу окружающей ткани
- В) воздушной эмболии
- Г) аллергической реакции

1314. [T016654] МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ В МЕСТАХ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ ВКЛЮЧАЮТ

- А) профилактическую дезинфекцию
- Б) заключительную дезинфекцию
- В) предстерилизационную очистку
- Г) очаговую дезинфекцию

1315. [T016655] ВАЖНЫМ ЭТАПОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ И ИНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) оценка факторов риска в своей работе
- Б) ежегодное обследование
- В) обследование всех пациентов
- Г) уклонение от работы с инфицированными пациентами

1316. [T016656] К ВОЗМОЖНЫМ ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТСЯ

- А) случайные уколы и порезы при инвазивных процедурах
- Б) прием пищи из одной посуды, посещение мест общего пользования
- В) укусы насекомых
- Г) рукопожатия, поцелуи в щеку

1317. [T016657] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) дезинфекцией
- Б) дезинсекцией
- В) дератизацией
- Г) стерилизацией

1318. [T016659] ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ИСМП), СПОСОБСТВУЮТ

- А) тщательное соблюдение личной гигиены медицинским персоналом
- Б) использование дезинфицирующих средств в возможно больших концентрациях
- В) широкое применение антибиотиков
- Г) сокращение штатных единиц в медицинской организации

1319. [T016660] ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКИХ, АКУШЕРСКИХ, РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ И НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ

- А) 1 раз в день
- Б) 1 раз в 2 дня

- В) 1 раз в неделю
Г) 2 раза в неделю
1320. [Т016661] ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ
- А) дезинфекции
Б) промыванию
В) проветриванию
Г) уничтожению
1321. [Т016662] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ
- А) 1 раз в неделю
Б) 2 раза в месяц
В) 2 раза в неделю
Г) 1 раз в месяц
1322. [Т016663] САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ЭТО
- А) комплекс организационных и санитарно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний среди пациентов и персонала
Б) комплекс мероприятий, направленный на уничтожение болезнетворных микроорганизмов
В) меры предосторожности при работе с пациентами в медицинских организациях
Г) строгое соблюдение и регулярный контроль над выполнением требований асептики и антисептики
1323. [Т016664] ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ
- А) источника инфекции, факторов передачи, восприимчивого человека
Б) источника инфекции, механизмов передачи
В) источника инфекции
Г) источника инфекции и восприимчивого человека
1324. [Т016665] ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ
- А) условно-патогенные микроорганизмы
Б) бактерии, которые свободно живут в окружающей среде
В) вирусы
Г) платяные вши
1325. [Т016666] ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
- А) на 4-5 день жизни
Б) в 1-й день жизни
В) в 1-й месяц жизни
Г) в 3 месяца жизни
1326. [Т018267] ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО
- А) состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
Б) динамическая гармония личности с окружающей средой, достигнутая посредством адаптации, средство жизни
В) состояние полного физического благополучия
Г) отсутствие болезней
1327. [Т018268] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
- А) помогают в эмоциональной разгрузке медицинской сестры
Б) мешают профессиональной деятельности
В) наносят вред здоровью медицинской сестры
Г) не поощряются руководством медицинских организаций
1328. [Т018269] ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ В ВОПРОСАХ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
- А) личную ответственность индивидуума
Б) координацию усилий всех служб отрасли
В) ответственность семьи за здоровье каждого ее члена
Г) заботу работодателя о каждом работнике
1329. [Т018270] ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
- А) ограничение животных жиров с частичной заменой на растительные жиры
Б) цельные молочные продукты

- В) субпродукты
Г) колбасы высокой жирности
1330. [T018271] ЗДОРОВЫМ ПИТАНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО
- А) 400-500 г фруктов и овощей (не считая картофеля)
Б) до 1 л цельных молочных продуктов
В) 500 г мясных субпродуктов
Г) 200 г жирного мяса
1331. [T018272] ПРИ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ НЕОБХОДИМО
- А) ввести в режим дня регулярные умеренные физические нагрузки
Б) исключить физические нагрузки
В) порекомендовать участвовать в спортивных соревнованиях
Г) отказаться от любых видов спорта
1332. [T018273] НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
- А) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи
Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
В) умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки
Г) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения
1333. [T018274] ДОЗИРОВАННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
- А) умеренно повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки
Б) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи
В) составляет более 30 тысяч шагов в сутки вне помещения
Г) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)
1334. [T018275] ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
- А) значительно повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и сильной одышки («не хватает дыхания»)
Б) соответствует 30 тысячам шагов в сутки вне помещения
В) соответствует состоянию покоя, например, когда человек спит или лежа читает, или смотрит телепередачи
Г) несколько повышает частоту сердечных сокращений и оставляет ощущение тепла и легкой одышки
1335. [T018276] БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ХОЛЕСТЕРИНА СОДЕРЖАТ
- А) яйца, икра из рыб
Б) крупы, бобовые
В) овощи, фрукты
Г) рыба, ягоды
1336. [T018277] У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СНИЖАЕТСЯ
- А) слух, зрение
Б) болевая чувствительность
В) абстрактность мышления
Г) целостность восприятия
1337. [T018278] ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ВЫДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
- А) почками
Б) легкими
В) кожей
Г) желудочно-кишечным трактом
1338. [T018279] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ
- А) убедить подростка и его окружение, что употребление алкоголя не является признаком взрослости
Б) направить подростка на цикл лекций о вреде алкоголизма
В) при встрече с подростком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сделать ему внушения о вреде алкоголя
Г) публично высмеять подростка после алкогольного эксцесса
1339. [T018280] К ЧИСЛУ СОЦИАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ТОКСИКОМАНИЙ МОЖНО ОТНЕСТИ
- А) злоупотребление чаем и кофе
Б) употребление галлюциногенов
В) злоупотребление слабоалкогольными напитками
Г) табакокурение

1340. [T018281] САМООБСЛЕДОВАНИЕ ЯИЧЕК ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- А) раннего выявления опухолей
- Б) определения достижения половой зрелости
- В) сравнения с нормальными размерами
- Г) выявления аномалий развития

1341. [T018282] ГИПОДИНАМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий
- Б) уменьшением подвижности
- В) уменьшением объема движений
- Г) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

1342. [T018283] ГИПОКИНЕЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- А) уменьшением подвижности
- Б) пониженной двигательной активностью с уменьшением мышечных усилий
- В) уменьшением объема движений
- Г) увеличением двигательной активности с уменьшением мышечных усилий

1343. [T018284] АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- А) повышение тонуса мышц, усиление мышц
- Б) перестройку жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
- В) уменьшение потребности в пище
- Г) снижение приспособительных и компенсаторных реакций

1344. [T018285] ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СПОСОБСТВУЕТ

- А) поддержанию обмена веществ на оптимальном уровне
- Б) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
- В) уменьшению потребности в пище
- Г) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

1345. [T018286] ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ СПОСОБСТВУЮТ

- А) большей устойчивости организма к стрессам
- Б) перестройке жирового обмена в сторону увеличения содержания в организме жировой ткани
- В) уменьшению потребности в пище
- Г) снижению приспособительных и компенсаторных реакций

1346. [T018287] ДОКОРМ ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ДАЕТСЯ

- А) только до кормления грудью
- Б) независимо от кормления грудью
- В) только после кормления грудью
- Г) вместо кормления грудью

1347. [T018288] ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

- А) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах
- Б) развитии молочных желез
- В) задержке в организме жидкости
- Г) стимуляции роста матки

1348. [T018289] ДЕЙСТВИЕ ЭСТРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

- А) развитии молочных желез
- Б) развитии мускулатуры
- В) росте волос на лобке и в подмышечных впадинах
- Г) повышении уровня холестерина в крови

1349. [T018290] ДЕЙСТВИЕ АНДРОГЕНОВ НА ОРГАНИЗМ МУЖЧИНЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В

- А) формировании вторичных половых признаков
- Б) снижении порога болевой чувствительности
- В) увеличении грудных желез в периоде полового созревания
- Г) формировании вкусовых ощущений

1350. [T018291] НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

- А) применение ингаляторов с бронхолитиками
- Б) создание вынужденного положения в постели
- В) проведение щелочно-масляных ингаляций
- Г) применение горчичных обертываний

1351. [T018292] К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ОТНОСИТСЯ

- А) запах мочевины изо рта

Б) запоры

В) румянец на щеках

Г) запах ацетона изо рта

1352. [T018293] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТСЯ

А) головная боль, головокружение, пелена перед глазами

Б) кровохарканье, сердцебиение, одышка

В) изжога, рвота, шум в ушах

Г) отрыжка, слабость, метеоризм

1353. [T018294] ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРАКТИКУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

А) эналаприлата

Б) анальгина

В) глюкозы

Г) дигоксина

1354. [T018295] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

А) снижение артериального давления, частый нитевидный пульс, резкая слабость

Б) приступ удушья, сердцебиение, слабость

В) головокружение, тахикардия, головная боль

Г) лихорадка, слабость, боль в грудной клетке

1355. [T018296] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ НУЖНО

А) уложить с приподнятым ножным концом

Б) ввести внутривенно эуфиллин

В) дать нитроглицерин под язык

Г) уложить с приподнятым головным концом

1356. [T018297] ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА НЕОБХОДИМО

А) ввести дицинон, аминокaproновую кислоту

Б) дать пузырь со льдом

В) ввести спазмолитики

Г) оказать помощь при рвоте

1357. [T018298] РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТУ ПОКАЗАНА

А) при внезапно резвившихся терминальных состояниях

Б) в каждом случае смерти пациента

В) только при внезапной смерти молодых пациентов и детей

Г) только при внезапной смерти у пожилых больных

1358. [T018299] ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) сужение зрачков

Б) пульсация на сонной артерии во время массажа сердца

В) движение грудной клетки во время ИВЛ

Г) расширение зрачков

1359. [T018300] ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С

А) прекращения воздействия электрического тока

Б) непрямого массажа сердца

В) искусственной вентиляции легких

Г) прекардиального удара

1360. [T018301] НА ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАКЛАДЫВАЕТСЯ

А) сухая стерильная повязка

Б) повязка с фурациллином

В) повязка с синтомициновой эмульсией

Г) повязка с раствором бикарбоната натрия

1361. [T018302] ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ

А) кратковременной потери сознания

Б) отсутствия реакций на внешние раздражители

В) длительной потери сознания

Г) снижения рефлексов

1362. [T018303] ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ ПАЦИЕНТА В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ НА

А) боку

Б) спине с опущенным головным концом

В) спине с опущенным ножным концом

Г) животе

1363. [Т018304] ПАЦИЕНТЫ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ НАЛИЧИИ У НИХ ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ НА

А) спине на шите

Б) боку на обычных носилках

В) животе на обычных носилках

Г) боку на шите

1364. [Т018305] ШОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) острая сердечно-сосудистая недостаточность

Б) острая сердечная недостаточность

В) острое повышение тонуса периферических сосудов

Г) острая недостаточность по малому кругу кровообращения

1365. [Т018306] ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ПРОИЗОШЕЛ ВЫБРОС ЯДОВИТОГО ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЕГО ИСПАРЕНИЕ В АТМОСФЕРУ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) очагом химического заражения

Б) зоной химического заражения

В) территорией биологического заражения

Г) точкой радиационного заражения

1366. [Т018307] ПРИ ПЕРЕЛОМЕ РЕБЕР ОПТИМАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ

А) сидя

Б) лежа на здоровом боку

В) лежа на больном боку

Г) лежа на спине

1367. [Т018308] ПАЦИЕНТ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ

А) во всех случаях при тяжелой форме

Б) в удовлетворительном состоянии

В) для периодического наблюдения

Г) для промывания желудка

1368. [Т018309] ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВЫВИХАХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ

А) иммобилизацию, обезболивание, госпитализацию

Б) вправление вывиха

В) госпитализацию в травмпункт

Г) обезболивание и госпитализацию

1369. [Т018310] ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) сдавление внутренних органов при землетрясениях и других повреждающих факторах

Б) небольшие ожоги

В) хронический гломерулонефрит

Г) хронический цистит

1370. [Т018311] ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМ

А) нитроглицерин под язык

Б) димедрол подкожно

В) астмопент ингаляционно

Г) лидокаин внутривенно

1371. [Т018312] ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ОПИАТОВ В КАЧЕСТВЕ АНТАГОНИСТА ПРИМЕНЯЮТ

А) налоксон

Б) кордиамин

В) мексидол

Г) гидрокортизон

1372. [Т018313] РЕАНИМАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОКАЗАНА ПРИ

А) внезапном наступлении клинической смерти

Б) остановке сердца в течение одного часа

В) обмороке

Г) биологической смерти

1373. [Т018314] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО

- А) напоить сладким чаем
- Б) ввести дибазол
- В) ввести инсулин
- Г) напоить отваром шиповника

1374. [Т018315] К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- А) чувство голода, потливость
- Б) боли в области сердца, одышка
- В) одышка, сухой кашель
- Г) отеки, головная боль

1375. [Т018316] ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) пузырем со льдом на живот
- Б) внутримышечным введением викасола
- В) внутривенным введением хлористого кальция
- Г) введением анальгетиков

1376. [Т018317] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- А) сидя, с упором на руки
- Б) горизонтальное с приподнятыми ногами
- В) горизонтальное
- Г) лежа на боку

1377. [Т018318] ЭКСПИРАТОРНАЯ ОДЫШКА, ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СУХИЕ, СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- А) приступа бронхиальной астмы
- Б) сердечной астмы
- В) тромбоэмболии легочной артерии
- Г) пневмоторакса

1378. [Т018319] К ОСНОВНОМУ СИМПТОМУ СТЕНОКАРДИИ ОТНОСИТСЯ

- А) сжимающая, давящая боль
- Б) слабость
- В) одышка
- Г) тошнота

1379. [Т018320] ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- А) инфаркте миокарда
- Б) ревмокардите
- В) остеохондрозе
- Г) стенокардии

1380. [Т018321] ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЖИМАЮЩЕЙ ЗАГРУДИННОЙ БОЛИ НЕОБХОДИМО

- А) дать нитроглицерин под язык
- Б) ввести морфина гидрохлорид
- В) ввести анальгин в/м
- Г) дать димедрол внутрь

1381. [Т018322] ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАБЛЮДАЕТСЯ

- А) загрудинная боль, не купирующаяся нитроглицерином
- Б) загрудинная боль, купирующаяся нитроглицерином
- В) колющая боль в области сердца
- Г) ноющая боль в области сердца

1382. [Т018323] КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) резкое снижение артериального давления, частый нитевидный пульс
- Б) резкое повышение артериального давления, напряженный пульс
- В) лихорадка, рвота
- Г) приступ удушья, ортопноэ

1383. [Т018324] ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО

- А) вызвать врача
- Б) обеспечить больному полный покой
- В) поставить банки, горчичники

- Г) провести оксигенотерапию
1384. [T018325] ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
- А) сидя с упором на руки
- Б) с приподнятым ножным концом
- В) на боку
- Г) горизонтальное
1385. [T018326] ПРИ УХОДЕ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕОБХОДИМО
- А) чаще поить пациента
- Б) вводить препараты крови внутривенно
- В) вводить жаропонижающие препараты
- Г) вводить антибиотики
1386. [T018327] К РАЗВИТИЮ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИВОДИТ
- А) спазм гладкой мускулатуры бронхов, отек слизистой оболочки бронхов и скопление вязкой мокроты
- Б) повышение давления в малом круге кровообращения
- В) отек гортани
- Г) воспаление плевральных листков
1387. [T018328] К ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ
- А) кардиогенный шок
- Б) одышка
- В) артрит
- Г) повышение артериального давления
1388. [T018329] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ БОЛЬНОЙ ПРИНИМАЕТ ДЛЯ
- А) облегчения самочувствия
- Б) проведения диагностических мероприятий
- В) физиологического сна
- Г) проведения гигиенических мероприятий
1389. [T018330] ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
- А) защитить пациента от психофизических страданий и болей
- Б) оградить пациента от родственников
- В) ускорить процесс умирания
- Г) оградить пациента от проблем
1390. [T018331] ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ
- А) проблема борьбы с болью
- Б) нарушение сна
- В) невозможность трудиться
- Г) недостаточность общения
1391. [T018332] ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
- А) не допускается ни при каких обстоятельствах
- Б) допускается по решению суда
- В) допускается в интересах реципиента
- Г) допускается по решению врачебной комиссии
1392. [T018333] В ОТНОШЕНИИ ИЗЪЯТИЯ ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ ТРУПА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ МОДЕЛЬ
- А) презумпции согласия
- Б) презумпции несогласия
- В) презумпции отказа
- Г) комбинированная
1393. [T018334] ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- А) запрещена под угрозой уголовного наказания
- Б) разрешена без ограничений
- В) разрешена в исключительных случаях
- Г) разрешена по решению суда

1394. [T018335] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) евгеника
- Б) геномика
- В) молекулярная биотехнология
- Г) геномная медицина

1395. [T018336] ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ

- А) по решению суда
- Б) по решению лечащего врача
- В) по решению законного представителя
- Г) по желанию пациента

1396. [T018337] К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

- А) липопротеидов низкой плотности
- Б) липопротеидов высокой плотности
- В) креатинина
- Г) билирубина

1397. [T018338] ТЕРРЕНКУРОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) лечение дозированным восхождением
- Б) ходьба по трафарету
- В) ходьба перед зеркалом
- Г) прогулки по ровной местности

1398. [T018339] ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТОМ ВОПРОСЫ СЛЕДУЕТ ЗАДАВАТЬ

- А) тактично, давая пациенту время на ответы
- Б) быстро, чтобы за короткое время принять как можно больше пациентов
- В) строго по протоколу
- Г) настойчиво и резко

1399. [T018340] В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ОГРАНИЧИВАЮТ

- А) поваренную соль
- Б) сахар
- В) специи
- Г) растительные жиры

1400. [T018341] АЛАЯ КРОВЬ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ

- А) артериальном
- Б) паренхиматозном
- В) капиллярном
- Г) венозном

1401. [T018342] ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ СИМПТОМ

- А) появления трупных пятен
- Б) прекращения дыхания
- В) снижения температуры кожи ниже 20°C
- Г) прекращения сердечной деятельности

1402. [T018343] НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) биологическая смерть
- Б) клиническая смерть
- В) агония
- Г) преагония

1403. [T018344] ПРОЦЕСС ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) консультированием
- Б) психологическим тренингом
- В) индивидуальной беседой
- Г) реабилитацией

1404. [T018345] В ПРОЦЕССЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТОМ С ОТЕКАМИ ОПРЕДЕЛЯЮ

- А) суточный водный баланс

- Б) температуру тела
 - В) частоту дыхательных движений
 - Г) артериальное давление
1405. [Т018346] ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕН
- А) крестец
 - Б) висок
 - В) грудная клетка
 - Г) предплечье
1406. [Т018347] ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ МОЧЕВОГО КАТЕТЕРА В МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ НЕОБХОДИМО
- А) подмыть пациента
 - Б) измерить температуру тела
 - В) измерить артериальное давление
 - Г) обработать кожу промежности йодопираном
1407. [Т018348] ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НОВООБРАЗОВАНИЕ НАЧИНАЮТ С
- А) маммографии
 - Б) флюорографии
 - В) самообследования
 - Г) пункционной биопсии
1408. [Т018349] К ВИДАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ
- А) консультативная помощь
 - Б) диспансеризация
 - В) скорая помощь
 - Г) радикальная операция
1409. [Т018350] ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО
- А) напоить сладким чаем
 - Б) ввести дибазол
 - В) ввести инсулин
 - Г) напоить отваром шиповника
1410. [Т018351] ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ
- А) непосредственно на рабочем месте до начала исполнения работником своей трудовой деятельности
 - Б) после прохождения работником испытательного срока
 - В) по окончании первого трудового дня
 - Г) по распоряжению руководителя медицинской организации
1411. [Т018352] ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОБУЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ
- А) не реже одного раза в полгода
 - Б) не реже одного раза в год
 - В) не реже одного раза в два года
 - Г) ежемесячно
1412. [Т018353] ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ИЛИ СТАНДАРТОВ, ПРАВИЛ, ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ
- А) внеплановый
 - Б) первичный
 - В) повторный
 - Г) вводный
1413. [Т018354] ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВНЕДРЕНИИ НОВЫХ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ
- А) внеплановый
 - Б) первичный
 - В) повторный
 - Г) вводный
1414. [Т018355] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРОВОДИТСЯ ИНСТРУКТАЖ

- А) внеплановый
- Б) первичный
- В) повторный
- Г) вводный

1415. [Т018356] В ОЧАГЕ КОРИ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- А) проветривание и влажную уборку помещения
- Б) дезинфекцию игрушек
- В) замачивание посуды в дезинфицирующем растворе
- Г) бактериологическое обследование контактных

1416. [Т018357] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ У ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО

- А) сохранить врачебную тайну
- Б) предупредить всех людей, имевших с ним контакт
- В) назначить принудительное лечение
- Г) сообщить в правоохранительные органы

1417. [Т018358] МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ

- А) доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей
- Б) все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность
- В) весь медицинский персонал
- Г) лица любой профессии перед трудоустройством

1418. [Т018359] В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ДОНОРА, ЕСЛИ ДОНОР

- А) умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
- Б) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
- В) гражданин иностранного государства
- Г) психически неполноценный человек

1419. [Т018360] ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ИЛИ ТРУПА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни
- Б) по решению главного врача
- В) по решению лечащего врача
- Г) по желанию пациента

1420. [Т018361] НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИОМЕХАНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- А) остеохондрозу
- Б) сколиозу
- В) лордозу
- Г) кифозу

1421. [Т018362] ПРАВИЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА ТЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОЗВОЛЯЕТ

- А) предотвращать у себя травмы позвоночника
- Б) удерживать равновесие
- В) предупреждать пролежни у пациента
- Г) исключать дискомфорт

1422. [Т018363] ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ

- А) убрать подушку и одеяло
- Б) слегка наклониться назад
- В) наклониться вперед
- Г) слегка присесть

1423. [Т018364] ДЛЯ СМЕНЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПРОДОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПАЦИЕНТУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ НА СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

- А) на боку
- Б) «Симса»
- В) на спине
- Г) на животе

1424. [Т018365] ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТА ПОЛОЖЕНИЕ СПИНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ДОЛЖНО БЫТЬ

- А) прямым
- Б) с наклоном вперед

В) с наклоном влево

Г) с наклоном вправо

1425. [T018366] ПОДСЧЕТ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ ЛУЧШЕ ПРОВОДИТЬ

А) на лучевой артерии

Б) на аорте

В) на тыльной артерии стопы

Г) на височной артерии

1426. [T018367] В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПУЛЬС СОСТАВЛЯЕТ _____ УДАРОВ В МИНУТУ

А) 60 – 80

Б) 85 – 90

В) 55 – 60

Г) 100 – 120

1427. [T018368] УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА БОЛЕЕ 85 – 90 УДАРОВ В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ

А) тахикардией

Б) брадикардией

В) гипертонией

Г) асистолией

1428. [T018369] АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца и зависит от сложной нервно-гуморальной регуляции, величины и скорости сердечного выброса, частоты и ритма сердечных сокращений и сосудистого тонуса

Б) давление, которое образуется в артериальной системе организма при сокращениях сердца

В) величина и скорость сердечного выброса

Г) частота и ритм сердечных сокращений

1429. [T018370] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

А) разницу между систолическим и диастолическим давлением

Б) сумму систолического и диастолического давления

В) частоту сердечных сокращений

Г) давление, возникающее в артериях в момент максимального подъема пульсовой волны после систолы желудочков

1430. [T018371] ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ РТ.

СТ.

А) 30 – 50

Б) 10 – 20

В) 60 – 70

Г) 20 – 40

1431. [T018372] СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ 140/ 90 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

А) артериальной гипертензией

Б) артериальной гипотензией

В) пульсовым давлением

Г) систолическим давлением

1432. [T018373] АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ 90/60 ММ РТ. СТ. НАЗЫВАЕТСЯ

А) артериальной гипотензией или гипотонией

Б) пульсовым давлением

В) артериальной гипертензией или гипертонией

Г) систолическим давлением

1433. [T018374] ЧАСТОТОЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ (ЧДД) НАЗЫВАЕТСЯ

А) количество циклов вдох-выдох за 1 минуту

Б) чередование вдоха и выдоха

В) количество выдохов за 1 минуту

Г) количество вдохов за 1 минуту

1434. [T018375] У ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НОРМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ПОКОЕ СОСТАВЛЯЕТ _____ В МИНУТУ

А) 16 – 20

Б) 12 – 16

В) 40 – 45

Г) 30 – 35

1435. [T018376] КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ МЕНЬШЕ 16 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ
А) брадипноэ
Б) тахипноэ
В) ортопноэ
Г) апноэ
1436. [T018377] КОЛИЧЕСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ БОЛЬШЕ 20 В МИНУТУ НАЗЫВАЕТСЯ
А) тахипноэ
Б) ортопноэ
В) брадипноэ
Г) апноэ
1437. [T018378] ОДЫШКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) расстройство ритма и глубины дыхания
Б) расстройство глубины дыхания
В) расстройство ритма дыхания
Г) количество вдохов в 1 минуту
1438. [T018379] ИНСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) дыхание с затрудненным вдохом
Б) дыхание с затрудненным выдохом
В) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
Г) удушье
1439. [T018380] ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ
А) дыхание с затрудненным выдохом
Б) дыхание с затрудненным вдохом
В) дыхание с затрудненным вдохом и выдохом
Г) приступ удушья
1440. [T018381] СУТОЧНЫМ ДИУРЕЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ
А) общее количество мочи, выделенной пациентом в течение суток
Б) процесс образования и выделения мочи
В) общее количество введенной в организм жидкости за сутки
Г) соотношение между количеством введенной в организм жидкости и количеством выделенной жидкости из организма в течение суток
1441. [T018382] СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ
А) от 800 мл до 2000 мл
Б) от 200 мл до 500 мл
В) от 500 мл до 800мл
Г) от 2000 мл до 3000мл
1442. [T018383] ЗАВИСИМЫЙ ТИП СЕСТРИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
А) инъекции антибиотиков
Б) проведение утренних гигиенических процедур
В) профилактика пролежней
Г) рекомендации по рациональному питанию
1443. [T018384] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОВОДИТ
А) обучение пациента элементам самоухода
Б) инъекции анальгетиков
В) предоперационная подготовка пациента
Г) инъекции антибиотиков
1444. [T018385] К ОБЪЕКТИВНЫМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ
А) измерение давления
Б) выявление проблем пациента
В) представление пациента о своем здоровье
Г) беседа с родственниками
1445. [T018386] ОСНОВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) экспираторная одышка
Б) одышка смешанного характера
В) инспираторная одышка
Г) кашель с выделением пенистой мокроты
1446. [T018387] ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГНОЙНОЙ МОКРОТЫ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) индивидуальной плевательницей
 - Б) сухой банкой
 - В) стерильной банкой
 - Г) стерильной пробиркой
1447. [Т018388] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСХОДОМ РЕВМАТИЧЕСКОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) порок сердца
 - Б) атеросклероз
 - В) пиелонефрит
 - Г) выздоровление
1448. [Т018389] СИНЮШНЫМ ОКРАШИВАНИЕМ ГУБ И КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) цианоз
 - Б) иктеричность
 - В) акроцианоз
 - Г) гиперемия
1449. [Т018390] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИДАЕТСЯ ПАЦИЕНТУ ДЛЯ
- А) облегчения отхождения мокроты
 - Б) расширения бронхов
 - В) уменьшения одышки
 - Г) снижения лихорадки
1450. [Т018391] С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО
- А) избегать психоэмоциональных перегрузок
 - Б) санировать очаги хронической инфекции
 - В) избегать переохлаждений
 - Г) увеличить физическую нагрузку
1451. [Т018392] ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) давящая боль за грудиной
 - Б) слабость
 - В) одышка
 - Г) сердцебиение
1452. [Т018393] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ
- А) атеросклероз коронарных артерий
 - Б) порок сердца
 - В) ревматический эндокардит
 - Г) вирусный миокардит
1453. [Т018394] ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) бета-гемолитический стрептококк группы А
 - Б) золотистый стафилококк
 - В) вирус краснухи
 - Г) риккетсия
1454. [Т018395] К РАЗВИТИЮ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ
- А) очаг хронической инфекции
 - Б) нерациональное питание
 - В) гиподинамия
 - Г) стресс
1455. [Т018396] ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) острая ревматическая лихорадка
 - Б) гипертоническая болезнь
 - В) инфаркт миокарда
 - Г) стенокардия
1456. [Т018397] К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ НИТРОГЛИЦЕРИНА ОТНОСИТСЯ
- А) головная боль
 - Б) асцит
 - В) лихорадка
 - Г) отеки
1457. [Т018398] ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК
- А) нитраты, бета - адреноблокаторы, антагонисты кальция
 - Б) анальгетики, наркотики, нейролептики
 - В) гипотензивные, диуретики, спазмолитики
 - Г) ганглиоблокаторы, диуретики, ингибиторы АПФ

1458. [T018399] ПРИ НАЛИЧИИ ОТЕКОВ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОРЕКОМЕНДУЕТ ПАЦИЕНТУ

- А) ограничить прием жидкости и соли
- Б) ограничить прием белков и жиров
- В) увеличить прием жидкости и соли
- Г) увеличить прием белков и жиров

1459. [T018400] ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) безопасность пациента
- Б) рациональное питание пациента
- В) сохранение социальных контактов
- Г) проведение мероприятий личной гигиены

1460. [T018401] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОПУЩЕНИЯ И ВЫПАДЕНИЯ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИНАМ РЕКОМЕНДУЮТ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ

- А) чрезмерных физических нагрузок, подъема тяжестей
- Б) занятий физкультурой
- В) беременности
- Г) приема мясной пищи

1461. [T018402] САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕН

- А) снижением чувствительности тканей к инсулину
- Б) бактериальной инфекцией
- В) психоэмоциональными перегрузками
- Г) абсолютным дефицитом инсулина

1462. [T018403] ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- А) принимаются последовательно
- Б) назначаются в увеличенной дозе
- В) назначаются в уменьшенной дозе
- Г) принимаются сразу все

1463. [T018404] К РАННИМ ПСИХИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСИТСЯ

- А) снижение памяти на текущие события
- Б) утрата критики к собственному состоянию
- В) снижение круга интересов
- Г) раздражительность

1464. [T018405] СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ

- А) Апгар
- Б) Петрусса
- В) Баллард
- Г) Цельсия

1465. [T018406] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ИМЕЕТ ПРАВО ПРИМЕНИТЬ НИТРОГЛИЦЕРИН ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

- А) 100/60 мм рт.ст.
- Б) 90/70 мм рт.ст.
- В) 80/60 мм рт.ст.
- Г) 70/50 мм рт.ст.

1466. [T018407] ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ МЕТОД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ИЗМЕРИТЬ

- А) пиковую скорость выдоха
- Б) жизненную емкость легких
- В) содержание кислорода в выдыхаемом воздухе
- Г) объем форсированного выдоха за 1 секунду

1467. [T018408] ДЛЯ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ НР (HELICOBACTER PYLORI) ПАЦИЕНТУ НАЗНАЧАЮТ

- А) омепрозол, ранитидин
- Б) платифиллин, атропин
- В) но-шпу (дротаверин), папаверин
- Г) тетрациклин, амоксициллин

1468. [T018409] РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СКРЫТЫХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) увеличение массы тела и снижение суточного диуреза

- Б) пастозность
- В) гидроторакс
- Г) асцит

1469. [T018410] ПРИ ЗАПИСИ ЭКГ НА ЛЕВУЮ РУКУ НАКЛАДЫВАЮТ ЭЛЕКТРОД, ИМЕЮЩИЙ ЦВЕТ

- А) желтый
- Б) черный
- В) красный
- Г) зеленый

1470. [T018411] ПРОФИЛАКТИКА КАНДИДОЗА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ИГКС) НУЖНО

- А) использовать небулайзер
- Б) прополоскать рот раствором фурацилина
- В) использовать пикфлоуметр
- Г) использовать малые дозы ИГКС

1471. [T018412] ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

- А) гематурия, протеинурия, цилиндрурия
- Б) гематурия, глюкозурия, цилиндрурия
- В) лейкоцитурия, протеинурия, цилиндрурия
- Г) лейкоцитурия, протеинурия, бактериурия

1472. [T018413] К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТНОСИТСЯ

- А) бета-гемолитический стрептококк группы А
- Б) кандидозная инфекция
- В) кишечная палочка
- Г) микобактерии

1473. [T018414] ПРИ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ПОЧЕЧНЫЕ

- А) клубочки
- Б) лоханки
- В) канальцы
- Г) чашечки

1474. [T018415] ОТЕКИ ПОЧЕЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- А) утром на лице
- Б) утром на ногах
- В) днем на руках
- Г) вечером на лице

1475. [T018416] ЕСЛИ СУТОЧНЫЙ ДИУРЕЗ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ СОСТАВИЛ 400 МЛ, ТО ЭТО

- А) олигурия
- Б) анурия
- В) полиурия
- Г) протеинурия

1476. [T018417] АНУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) отсутствие мочи
- Б) много мочи
- В) нормальное количество мочи
- Г) преобладание ночного диуреза над дневным

1477. [T018418] АНАЛИЗ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА

- А) лейкоцитов, эритроцитов
- Б) белка, глюкозы
- В) солей, билирубина
- Г) ацетона, глюкозы

1478. [T018419] В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) гемодиализ
- Б) диетотерапия
- В) физиотерапия
- Г) витаминотерапия

1479. [T018420] ДЛЯ СБОРА АНАЛИЗА МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГОТОВИТ ПАЦИЕНТУ

- А) 8 сухих банок
- Б) 1 сухую банку
- В) 1 сухую пробирку
- Г) 2 стерильных банки

1480. [T018421] ПРИ АНАЛИЗЕ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- А) количество, относительная плотность мочи
- Б) ацетон, сахар
- В) билирубин, белок
- Г) лейкоциты, эритроциты

1481. [T018422] ПРЕВЫШЕНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАД ДНЕВНЫМ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

- А) никтурия
- Б) анурия
- В) олигурия
- Г) полиурия

1482. [T018423] ПОЧЕЧНУЮ КОЛИКУ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

- А) тряская езда
- Б) нерегулярное питание
- В) сладкая пища
- Г) гиподинамия

1483. [T018424] К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ОТНОСИТСЯ

- А) экскреторная урография
- Б) ирригоскопия
- В) томография
- Г) хромоцистоскопия

1484. [T018425] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА НАБЛЮДАЮТСЯ

- А) тошнота, рвота
- Б) тахикардия, экзофтальм
- В) снижение температуры и артериального давления
- Г) желтуха, «сосудистые звездочки»

1485. [T018426] КОЛЕБАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ 1009-1011 В ПРОБЕ ЗИМНИЦКОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- А) гипоизостенурии
- Б) анурии
- В) полиурии
- Г) протеинурии

1486. [T018427] К АЗОТИСТЫМ ШЛАКАМ, ОБРАЗУЮЩИМСЯ В КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ

- А) креатинин, мочевины
- Б) альбумины, глобулины
- В) билирубин, холестерин
- Г) глюкоза, липопротеиды

1487. [T018428] ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ

- А) белки
- Б) витамины
- В) жиры
- Г) углеводы

1488. [T018429] ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СИЛЬНОЙ НЕСТЕРПИМОЙ БОЛЬЮ, ПРИМЕНЯЕТСЯ

- А) морфин
- Б) героин
- В) панангин
- Г) парацетамол

1489. [T018430] КОМПЛЕКСОМ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ И ОБЛЕГЧЕНИЕ ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) паллиативной помощью
Б) симптоматическим лечением
В) наружной лучевой терапией
Г) реабилитационной помощью
1490. [Т018431] К ВНЕШНЕМУ ПРИЗНАКУ ОЩУЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОМ БОЛИ ОТНОСИТСЯ
А) напряженный лоб с появлением на нем глубоких морщин
Б) заторможенность
В) прекращение приема пищи
Г) отказ от общения
1491. [Т018432] ЭТИЧЕСКИМ ДОЛГОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБЛАСТИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) удовлетворение его психических, социальных и духовных потребностей
Б) обязательное выполнение всех пожеланий родных и близких больного
В) облегчение страданий родственников
Г) выполнение любых пожеланий пациента
1492. [Т018433] В ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) медицинский аспект
Б) духовный аспект
В) социальный аспект
Г) реабилитационный аспект
1493. [Т018434] ИЗМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ УМИРАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫ ОДНИМ ИЗ ПРОИСХОДЯЩИХ НЕОБРАТИМЫХ ПРОЦЕССОВ
А) метаболических
Б) неврологических
В) психологических
Г) физических
1494. [Т018435] КАКАЯ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ СИТУАЦИЙ, БОЛЕЕ ВСЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО У РЕБЕНКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ БОЛИ
А) ребенок спит
Б) у ребенка нормальное артериальное давление
В) у ребенка нормальная частота дыхания
Г) ребенок говорит, что у него ничего не болит
1495. [Т018436] КРИТЕРИЕМ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) очевидность того факта, что последующие попытки лечения нецелесообразны
Б) ожидаемая продолжительность жизни не более года
В) ожидаемая продолжительность жизни не более 3-6 месяцев
Г) ожидаемый эффект от применения новейших способов лечения
1496. [Т018437] НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОДЫШКЕ ЯВЛЯЕТСЯ
А) применение направленной вентиляции
Б) оптимизация физической активности и расхода энергии
В) коррекция водного режима
Г) иммобилизация пациента
1497. [Т018438] К ИНВАЗИВНЫМ МАНИПУЛЯЦИЯМ ОТНОСИТСЯ
А) промывание желудка
Б) постановка горчичников
В) смена постельного и нательного белья
Г) гигиеническая обработка кожных покровов
1498. [Т018439] ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ
А) метастазах в кости
Б) метастазах в мозг
В) раке желудка
Г) лимфогранулематозе
1499. [Т018440] НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕИЗЛЕЧИМОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЧИТАЕТСЯ
А) тревога и депрессия
Б) эмоциональный ступор

- В) нарушение психики
Г) нарушение личности
1500. [Т018441] ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ
- А) специальной шкалы
Б) опроса пациента
В) визуального наблюдения
Г) пальпации и перкуссии
1501. [Т018442] ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ИСПОЛЬЗУЮТ
- А) извещение о пациенте с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного новообразования
Б) талон на прием к врачу
В) статистический талон
Г) амбулаторную карту
1502. [Т018443] К ПРИЗНАКАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ОТНОСИТСЯ
- А) негативное самовосприятие в профессиональной деятельности
Б) преувеличение собственной значимости
В) развитие гипертонической болезни
Г) эмоциональное равновесие
1503. [Т018444] ОБЕЗБОЛИВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ
- А) с повышением дозы
Б) по требованию
В) без учета индивидуальности
Г) с понижением дозы
1504. [Т018445] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ
- А) при каждом контакте
Б) строго каждый час
В) в начале и в конце смены
Г) в день выписки пациента
1505. [Т018446] СИНОНИМОМ СЛОВА «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ» ЯВЛЯЕТСЯ...
- А) неизлечимый пациент
Б) страдающий пациент
В) умирающий пациент
Г) онкологический пациент
1506. [Т018447] ЕСЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И БЕСПОКОЙНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА СОПРОВОЖДАЮТСЯ СТОНАМИ И ГРИМАСАМИ, ТО ЭТО ИСТОЛКОВЫВАЮТ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
- А) физической боли
Б) постепенного угасания сознания
В) душевной боли
Г) признаков депрессии
1507. [Т018448] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ СТАДИЯМИ ЭВОЛЮЦИИ СОЗНАНИЯ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ
- А) отрицание, гнев, депрессия, смирение
Б) смирение, тревога, гнев, отрицание
В) гнев, смирение, тревога
Г) тревога, смирение, гнев, отрицание
1508. [Т018449] НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМ НОВООБРАЗОВАНИЕМ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ РАК
- А) молочной железы
Б) тела матки
В) шейки матки
Г) прямой кишки
1509. [Т018450] ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) страх диагноза
Б) отсутствие аппетита

- В) похудание
Г) боль в животе
1510. [T018451] ПРОЯВЛЕНИЯМИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
А) нарушение равновесия, походки
Б) неразборчивость речи
В) ухудшение восприятия звуков
Г) нарушение зрения
1511. [T018452] ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
А) смена положения тела
Б) правильное питание
В) неподвижность пациента
Г) питьевой режим
1512. [T018453] ОБРАЗОВАНИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ СПОСОБСТВУЕТ
А) сдавление тканей при длительном лежачем положении пациента
Б) сдавление тканей гипсовой повязкой
В) активное положение пациента в постели
Г) пассивное положение пациента в постели
1513. [T018454] ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ДЕПРЕССИВНОМ СОСТОЯНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
А) психотерапевтической беседе
Б) гиперопеке
В) изоляции
Г) беседе о данном заболевании, его осложнениях
1514. [T018455] К СЕСТРИНСКОМУ УХОДУ ОНОСИТСЯ
А) кормление пациента
Б) запись ЭКГ
В) проведение в/м инъекции
Г) постановка капельницы
1515. [T018456] К ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ОТНОСИТСЯ
А) проведение в/м, в/в, п/к инъекций
Б) подготовка пациента к исследованию
В) проведение мероприятий по личной гигиене тяжелобольных
Г) кормление пациента
1516. [T018457] К ЯТРОГЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
А) обусловленные неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
Б) обусловленные вредными факторами производства
В) с неблагоприятным прогнозом
Г) наследственного генеза
1517. [T018458] НИКТУРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) преобладание ночного диуреза над дневным
Б) болезненное мочеиспускание
В) увеличение суточного количества мочи до более 2000 мл
Г) уменьшение суточного количества мочи до менее 500 мл
1518. [T018459] ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РЕКОМЕНДУЮТ
А) ограничение приема жидкости
Б) длительное применение гепарина
В) уменьшение содержания белков в пищевом рационе
Г) увеличение содержания жиров в пищевом рационе
1519. [T018460] ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ПРОВОЦИРУЕТ
А) прием жирной пищи
Б) избыток фруктов
В) переохлаждение
Г) стресс
1520. [T018461] САМЫМ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) желудочное кровотечение
Б) кахексия
В) обезвоживание
Г) кишечная непроходимость

1521. [T018462] ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ ИЗ РАЦИОНА ИСКЛЮЧАЮТ

- А) жирную, жареную пищу
- Б) молочные продукты
- В) кашу
- Г) отварные овощи

1522. [T018463] ПРИ СБОРЕ МОКРОТЫ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ

- А) стерильной банкой
- Б) стерильной пробиркой
- В) сухой банкой
- Г) сухой пробиркой

1523. [T018464] ДРЕНАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА СПОСОБСТВУЕТ

- А) отхождению мокроты
- Б) снижению лихорадки
- В) уменьшению одышки
- Г) расширению бронхов

1524. [T018465] ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- А) диуретики
- Б) антибиотики
- В) муколитики
- Г) цитостатики

1525. [T018466] ОТЕКИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, АСЦИТ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

- А) недостаточности кровообращения
- Б) инфаркта миокарда
- В) гипертонической болезни
- Г) стенокардии

1526. [T018467] К ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ПРИЕМЕ ПРЕДНИЗОЛОНА ОТНОСЯТСЯ

- А) повышение артериального давления, гипергликемия, ожирение
- Б) одышка, легочное кровотечение
- В) головная боль, снижение артериального давления
- Г) лихорадка, нарушение слуха

1527. [T018468] БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИ ИЗ НОСА ПРОВОДЯТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- А) дифтерии
- Б) краснухи
- В) кори
- Г) ветряной оспы

1528. [T018469] ДИЕТА ПАЦИЕНТА ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) исключение экстрактивных, острых и пряных блюд
- Б) ограничение соли и жидкости
- В) ограничение углеводной пищи и обильное питье
- Г) исключение кисломолочных продуктов, гипохлоридное питание

1529. [T018470] ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ ПО НЕЧИПОРЕНКО СОБИРАЕТСЯ МОЧА

- А) из средней порции одного мочеиспускания в количестве 10-20 мл
- Б) первого мочеиспускания после ночи
- В) в течение 3 часов
- Г) за 24 часа

1530. [T018471] НА ВОПРОС ПАЦИЕНТА С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ: «ПОЧЕМУ ИНЪЕКЦИИ ИНСУЛИНА ПРИДЕТСЯ ПОЛУЧАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ?» – ЛУЧШИМ ОТВЕТОМ БУДЕТ ВАРИАНТ

- А) «В Вашем организме не хватает своего инсулина для усвоения сахара, постоянные инъекции инсулина помогут справиться с этой проблемой»
- Б) «Не беспокойтесь, так надо»
- В) «Я не знаю»
- Г) «Обратитесь с этим вопросом к доктору»

1531. [T018472] ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сонливость

- Б) раздражительность
В) бессонница
Г) чувство жара
1532. [Т018473] К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОТНОСЯТСЯ
А) жажда, кожный зуд
Б) отеки, боли в пояснице
В) снижение памяти, запоры
Г) сухой кашель, одышка
1533. [Т018474] ОПТИМАЛЬНЫМ ВИДОМ ДОКОРМА ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ
А) адаптированные молочные смеси
Б) кисломолочные смеси
В) соки
Г) каши
1534. [Т018475] МОРАЛЬ – ЭТО
А) отношения и нравы людей, классифицированные культурой по критерию «добро-зло»
Б) совокупность научных фактов
В) философское учение
Г) строгое соблюдение законов и Конституции
1535. [Т018476] ДОЛГ - ЭТО
А) требование совести
Б) приказ руководителя
В) обоюдная выгода
Г) требования близких людей
1536. [Т018477] ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ДЕОНТОЛОГИЯ»
А) совокупность профессиональных правил поведения
Б) завоевание социального доверия личности
В) обязательства перед преподавателями, коллегами, учениками
Г) исполнение законодательства
1537. [Т018478] СПОСОБНОСТЬ К СОПЕРЕЖИВАНИЮ И СОЧУВСТВИЮ ДРУГИМ
А) эмпатия
Б) симпатия
В) альтруизм
Г) аффилиация
1538. [Т018479] ПРАВОНАРУШЕНИЕМ СЧИТАЕТСЯ
А) виновное противоправное общественно-опасное деяние
Б) активное поведение субъектов правоотношения
В) бездействие, совершенное недееспособным лицом
Г) деяние невменяемого лица, причиняющего вред интересам государства, общества и граждан
1539. [Т018480] ЭЛЕМЕНТАМИ СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
А) субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона
Б) мотив, стороны, обстоятельства
В) вина, факты, вред, лица
Г) основание, право, обязанность, следствие, умысел
1540. [Т018481] МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ
А) юридической ответственности
Б) моральной ответственности
В) религиозной ответственности
Г) этических правил
1541. [Т018482] ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ
А) обсуждать поставленный диагноз, план лечения, говорить о заболеваниях соседей по палате
Б) быть приветливой
В) быть вежливой
Г) разъяснять в доступной форме значение, смысл и необходимость обследований
1542. [Т018483] В ОТНОШЕНИЯХ «МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» НЕДОПУСТИМЫ
А) грубость и неуважительное отношение
Б) вежливость и уважительное отношение
В) внимательность и отзывчивость
Г) тактичность и корректность

1543. [T018484] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) сохранять
- Б) разглашать
- В) передавать
- Г) делить

1544. [T018485] ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОТНОШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ К МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ ДОЛЖНО БЫТЬ

- А) терпимым
- Б) агрессивным
- В) негативным
- Г) нетерпимым

1545. [T018486] В ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ ПРОЯВЛЯТЬ

- А) эмпатию
- Б) равнодушие
- В) растерянность
- Г) агрессивность

1546. [T018487] В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ, РУКОВОДСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ СЛЕДУЕТ

- А) соблюдать субординацию
- Б) держать дистанцию
- В) демонстрировать свое превосходство
- Г) идти на конфронтацию

1547. [T018488] УВАЖЕНИЕ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА СО СТОРОНЫ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПРЕДПОЛАГАЕТ

- А) сохранение тайны о состоянии его здоровья
- Б) отказ от выяснения его семейного статуса
- В) соблюдение его избирательного права
- Г) передачу сведений о характере заболевания пациента его работодателям

1548. [T018489] ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ ПРОЯВЛЕНИЯ

- А) милосердия и социальной справедливости
- Б) привилегии для определенных слоев общества
- В) экономической заинтересованности в профессионалах
- Г) рыночно ориентированного разделения труда

1549. [T018490] ВМЕШАТЕЛЬСТВО В СФЕРУ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ОСНОВАНИИ

- А) свободного, осознанного и информированного согласия пациента
- Б) медицинских показаний
- В) требования родственников
- Г) извлечения финансовой выгоды

1550. [T018491] СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) в письменной форме
- Б) в форме гражданско-правового договора
- В) в нотариальной форме
- Г) только в присутствии адвоката

1551. [T018492] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО Ф3 РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ

- А) соблюдение прав и обеспечение государственных гарантий
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

1552. [T018493] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО Ф3 РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСИТСЯ

- А) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

1553. [T018494] К ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТНОСИТСЯ

- А) соблюдение врачебной тайны
- Б) медицинское страхование граждан
- В) государственное управление здравоохранением
- Г) муниципальное управление здравоохранением

1554. [T018495] ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

- А) наличием необходимого количества медицинских работников
- Б) функционированием частной системы здравоохранения
- В) государственным управлением здравоохранением
- Г) муниципальным управлением здравоохранением

1555. [T018496] КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- А) возможностью выбора медицинской организации
- Б) функционированием частной системы здравоохранения
- В) государственным управлением здравоохранением
- Г) муниципальным управлением здравоохранением

1556. [T018497] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- А) независимо от срока беременности
- Б) на сроке до 6 недель
- В) на сроке до 12 недель
- Г) до 22 недель

1557. [T018498] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ ПРОВОДИТСЯ

- А) до 22 недель
- Б) на сроке до 6 недель
- В) на сроке до 12 недель
- Г) независимо от срока беременности

1558. [T018499] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТАТЬЕ 123 УК РФ «НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АБОРТА» НАСТУПАЕТ ЗА

- А) производство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля
- Б) производство аборта без согласия женщины
- В) нарушение лицом, имеющим высшее медицинское образование соответствующего профиля, требований нормативных правовых актов при производстве аборта
- Г) производство аборта при отсутствии медицинских или социальных показаний для искусственного прерывания беременности

1559. [T018500] ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ОТЦОМ РЕБЕНКА ЗАПИСЫВАЕТСЯ

- А) муж женщины
- Б) донор
- В) донор или муж женщины
- Г) никто не записывается

1560. [T018501] СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА, ОТВЕЧАЮЩАЯ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

- А) наличие собственного здорового ребенка, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет
- Б) наличие не менее двух собственных детей, отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст до 40 лет
- В) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 20 – 35 лет
- Г) отсутствие отклонений в состоянии здоровья, возраст 18-45 лет

1561. [T018502] ЖЕНЩИНА, СОСТОЯЩАЯ В БРАКЕ, МОЖЕТ СТАТЬ СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ ПРИ УСЛОВИИ

- А) письменного согласия супруга
- Б) устного согласия супруга
- В) оформления развода
- Г) материальной выгоды

1562. [T018503] ЭВТАНАЗИЯ - ЭТО

- А) искусственное прекращение жизни по желанию пациента
- Б) отказ от лечения
- В) естественная смерть
- Г) самоубийство

1563. [T018504] ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ

- А) защитить пациента от психофизических страданий и болей
- Б) оградить пациента от родственников
- В) ускорить процесс умирания
- Г) оградить пациента от проблем

1564. [T018505] ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ УМИРАЮЩЕГО ПАЦИЕНТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- А) проблема борьбы с болью
- Б) нарушение сна
- В) невозможность трудиться
- Г) недостаточность общения

1565. [T018506] ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

- А) не допускается ни при каких обстоятельствах
- Б) допускается по решению суда
- В) допускается в интересах реципиента
- Г) допускается по решению врачебной комиссии

1566. [T018507] В ОТНОШЕНИИ ИЗЪЯТИЯ ДОНОРСКОГО МАТЕРИАЛА ОТ ТРУПА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЕТ МОДЕЛЬ

- А) презумпции согласия
- Б) презумпции несогласия
- В) презумпции отказа
- Г) комбинированная

1567. [T018508] ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- А) запрещена под угрозой уголовного наказания
- Б) разрешена без ограничений
- В) разрешена в исключительных случаях
- Г) разрешена по решению суда

1568. [T018509] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НОСИТ НАЗВАНИЕ

- А) евгеника
- Б) геномика
- В) молекулярная биотехнология
- Г) геномная медицина

1569. [T018510] ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ДОПУСКАЕТСЯ

- А) по решению суда
- Б) по решению лечащего врача
- В) по решению законного представителя
- Г) по желанию пациента

1570. [T018511] РАННЕМУ АКТИВНОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ СПОСОБСТВУЕТ

- А) массовое флюорографическое обследование
- Б) рентгеноскопия легких
- В) массовый осмотр населения
- Г) компьютерная томография органов грудной клетки

1571. [T018512] ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПАЦИЕНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ

- А) здоровое население; средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи; первичные трудовые коллективы
- Б) территория по месту жительства
- В) пациент и его окружение; первичные трудовые коллективы
- Г) средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и

реабилитационной помощи

1572. [T018513] К ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТНОСИТСЯ

- А) профилактическая
- Б) правовая
- В) социальная
- Г) психологическая

1573. [T018514] НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОБЩЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) общение с использованием мимики и жестов
- Б) словесное общение
- В) серия событий, включающих передачу информации от отправителя к получателю
- Г) общение между двумя или более людьми

1574. [T018515] К ВЕРБАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ ОТНОСИТСЯ

- А) речевое, словесное
- Б) жестами, мимикой
- В) письмами
- Г) рисунками

1575. [T018516] ВЕРБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- А) речи
- Б) позы
- В) взгляда
- Г) жестов

1576. [T018517] ДОГОВОР О МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ И ПРЕДМЕТОВ УХОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) со старшей медицинской сестрой
- Б) с заведующим отделением
- В) со старшей медицинской сестрой, с заведующим отделением
- Г) с главной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой

1577. [T018518] ПОВЕДЕНИЕМ, ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ПРАВОВЫХ ИЛИ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) девиантное
- Б) опосредованное
- В) спроектированное
- Г) навязанное

1578. [T018519] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ НЕСЕТ

- А) дежурная смена и лица, работающие с данным оборудованием
- Б) старшая медицинская сестра и лица, работающие с данным оборудованием
- В) заведующий отделением, старшая медицинская сестра
- Г) заведующий отделением

1579. [T018520] ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

- А) в течение всей профессиональной жизни
- Б) при выявлении нарушений ею технологии
- В) по мере необходимости, определяемой руководством
- Г) по потребности, ею определяемой

1580. [T018521] ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ МОЖНО

- А) если они утверждены руководством медицинской организации
- Б) при ознакомлении с ними
- В) по распоряжению старшей медицинской сестры
- Г) если уверены в их эффективности

1581. [T018522] СПОСОБНОСТЬ ИНДИВИДА СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) дееспособностью
- Б) гражданством
- В) ответственностью
- Г) самоуважением

1582. [T018523] ЧЕЛОВЕК ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

- А) решением суда
- Б) любым государственным органом

В) близкими родственниками

Г) общественным мнением

1583. [T018524] РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ ЛИЦ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ТЕЧЕНИЕ

А) одного месяца

Б) двух месяцев

В) полугодя

Г) первого года работы

1584. [T018525] ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ У

А) у работника

Б) у инженера по технике безопасности

В) у старшей медицинской сестры

Г) у заведующего отделением

1585. [T018526] ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

А) сидя с упором на руки

Б) ортопноэ

В) лежа с приподнятыми ногами

Г) лежа с приподнятым головным концом

1586. [T018527] К СУБЪЕКТИВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ОТНОСИТСЯ

А) наличие жалоб

Б) положение в пространстве

В) исследование пульса

Г) определение сознания

1587. [T018528] ПРИ КОРМЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ЧЕРЕЗ ЗОНД ПИЩУ ПОДОГРЕВАЮТ ДО (___ 0С)

А) 38 – 40

Б) 15 – 20

В) 25 – 30

Г) 45 – 50

1588. [T018529] ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТРОМ ЛЕКАРСТВЕННОМ ОТРАВЛЕНИИ ТАБЛЕТКАМИ

А) промывание желудка, прием адсорбента, очистительная клизма

Б) прием адсорбента, промывание желудка, очистительная клизма

В) очистительная клизма, прием адсорбента, промывание желудка

Г) промывание желудка, очистительная клизма, прием адсорбента

1589. [T018530] ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ВВОДЯТСЯ

А) внутривенно

Б) внутримышечно

В) внутримышечно и подкожно

Г) ректально

1590. [T018531] МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ, ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА КЛАССЫ ОПАСНОСТИ В КОЛИЧЕСТВЕ

А) 5

Б) 3

В) 4

Г) 6

1591. [T018532] ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

А) А

Б) Б

В) В

Г) Г

1592. [T018533] ЖИВЫЕ ВАКЦИНЫ, НЕПРИГОДНЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

А) Б

Б) А

В) В

Г) Г

1593. [Т018534] ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ А) Б

Б) А

В) В

Г) Г

1594. [Т018535] ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ (ОРГАНЫ, ТКАНИ) ОТНОСЯТ К КЛАССУ

А) Б

Б) А

В) В

Г) Г

1595. [Т018536] ОТХОДЫ ЛАБОРАТОРИЙ, РАБОТАЮЩИХ С МИКРООРГАНИЗМАМИ 1 - 2 ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

А) В

Б) А

В) Б

Г) Г

1596. [Т018537] ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТНОСЯТ К КЛАССУ

А) Г

Б) А

В) Б

Г) В

1597. [Т018538] РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ ОТНОСЯТ К КЛАССУ

А) Г

Б) А

В) Б

Г) В

1598. [Т018539] К ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТ

А) пищевые отходы неинфекционных отделений

Б) пищевые отходы инфекционных отделений

В) органические операционные отходы

Г) патологоанатомические отходы

1599. [Т018540] К ОТХОДАМ КЛАССА Б ОТНОСЯТ

А) пищевые отходы инфекционных отделений

Б) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

В) дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию

Г) пищевые отходы неинфекционных отделений

1600. [Т018541] К ОТХОДАМ КЛАССА В ОТНОСЯТ

А) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

Б) пищевые отходы инфекционных отделений

В) пищевые отходы неинфекционных отделений

Г) органические операционные отходы

1601. [Т018542] К ОТХОДАМ КЛАССА Г ОТНОСЯТ

А) лекарственные средства, не подлежащие использованию

Б) материалы, контактирующие с больными инфекционными болезнями

В) органические операционные отходы

Г) пищевые отходы инфекционных отделений

1602. [Т018543] К ОТХОДАМ КЛАССА Д ОТНОСЯТ

А) все отходы, содержащие радиоактивные компоненты

Б) ртутьсодержащие приборы

В) люминесцентные лампы

Г) строительный мусор

1603. [Т018544] ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б ИМЕЮТ ЦВЕТ

А) желтый

Б) черный

В) красный

Г) белый

1604. [T018545] ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ И ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА В ИМЕЮТ ЦВЕТ

- А) красный
- Б) желтый
- В) черный
- Г) белый

1605. [T018546] ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- А) одноразовых пакетов
- Б) хозяйственных сумок
- В) картонных коробок
- Г) бумажных мешков

1606. [T018547] ТАРА, КОТОРАЯ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б

- А) одноразовые пакеты
- Б) твердая картонная тара
- В) мягкая полимерная тара
- Г) бумажные мешки

1607. [T018548] ТАРА, В КОТОРУЮ СОБИРАЕТСЯ ОСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ (ИГЛЫ, ПЕРЬЯ)

- А) в одноразовую твердую упаковку с плотно прилегающей крышкой
- Б) в многоразовую емкость с плотно прилегающей крышкой
- В) в одноразовый пакет желтого цвета
- Г) в картонную коробку желтого цвета

1608. [T018549] ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА Б В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПАКЕТА НА

- А) 3/4
- Б) 1/2
- В) 1/3
- Г) 2/3

1609. [T018550] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬНИЧНОГО МУСОРОПРОВОДА ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- А) не допустимо
- Б) допустимо
- В) допустимо при условии ежедневной дезинфекции
- Г) допустимо по разрешению Управления Роспотребнадзора

1610. [T018551] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, РТУТЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ СОБИРАЮТСЯ В

- А) маркированные емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного)
- Б) многоразовые емкости черного цвета
- В) одноразовую твердую упаковку белого цвета
- Г) твердую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного)

1611. [T018552] УТИЛИЗАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НАЗЫВАЮТ

- А) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки
- Б) захоронение в местах, установленных действующим законодательством
- В) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования
- Г) обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных свойств отходов

1612. [T018553] РОТАЦИЕЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ НАЗЫВАЮТ

- А) замена дезинфицирующего средства на препарат другой группы
- Б) смена дезинфицирующего средства в пределах группы
- В) переход от химической дезинфекции к аппаратным методам обеззараживания
- Г) одновременное использование дезинфицирующих средств нескольких групп

1613. [T018554] ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ПОДВЕРГАЕТСЯ РИСКУ

- А) инфекционного заражения
- Б) получения физической травмы
- В) радиационного поражения
- Г) токсического поражения

1614. [T018555] ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) обработка отходов с применением технологий, ведущих к утрате всех опасных

свойств

Б) захоронение в местах, установленных действующим законодательством
В) использование отходов в качестве вторичных ресурсов после соответствующей переработки

Г) изменение внешнего вида отходов, исключающее возможность их повторного использования

1615. [Т018556] ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ

А) 72 часов

Б) 12 часов

В) 24 часов

Г) 48 часов

1616. [Т018557] ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ СОБИРАЮТСЯ В

А) одноразовую твердую упаковку

Б) многоразовые емкости

В) одноразовые пакеты

Г) многоразовую твердую упаковку

1617. [Т018558] ОРГАНИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (ОРГАНЫ, ТКАНИ) МОГУТ ВЫВОЗИТЬСЯ

А) без предварительного обеззараживания

Б) после обеззараживания химическим методом

В) после обеззараживания аппаратным методом

Г) после обеззараживания любым методом в медицинской организации

1618. [Т018559] ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ К МЕСТАМ ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В

А) герметизированном виде

Б) открытой емкости

В) закрытой емкости

Г) любой емкости

1619. [Т018560] ИНДИКАТОРЫ ЭКСПРЕСС – КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАКЛАДЫВАТЬ В

А) рабочий раствор до начала использования

Б) концентрат дезинфицирующего средства

В) рабочий раствор в процессе использования

Г) рабочий раствор по окончании использования

1620. [Т018561] ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗОПАСНОГО СБОРА НЕ БОЛЕЕ ____ КГ. ОТХОДОВ

А) 10

Б) 5

В) 15

Г) 20

1621. [Т018562] СМЕШЕНИЕ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

А) недопустимо

Б) допустимо

В) зависит от класса отходов

Г) допустимо при дефиците одноразовых пакетов

1622. [Т018563] К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

А) старше 18 лет

Б) старше 16 лет

В) старше 20 лет

Г) независимо от возраста, прошедшие предварительный инструктаж

1623. [Т018564] ПЕРСОНАЛ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б И В

А) не допускается

Б) допускается во всех случаях

В) допускается при наличии медицинского отвода к вакцинации

Г) допускается при наличии противопоказаний к вакцинации

1624. [T018565] ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОХОДЯТ

- А) при приеме на работу и затем ежегодно
- Б) при приеме на работу и затем один раз в два года
- В) при приеме на работу
- Г) по собственному желанию

1625. [T018566] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ

- А) 24 часов
- Б) 12 часов
- В) 36 часов
- Г) 48 часов

1626. [T018567] КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ КЛАССА А ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

- А) неделю
- Б) смену
- В) сутки
- Г) месяц

1627. [T018568] В СЛУЧАЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ ТРАВМЫ, ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ В ПЛАНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМО

- А) составить акт о несчастном случае на производстве установленной формы
- Б) составить протокол о несчастном случае на производстве произвольной формы
- В) обратиться к врачу
- Г) обратиться в Управление Роспотребнадзора

1628. [T018569] ЖИДКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА Б (РВОТНЫЕ МАССЫ, МОЧА, ФЕКАЛИИ) БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

- А) допускается сливать без предварительного обеззараживания в систему централизованной канализации
- Б) допускается сливать в систему централизованной канализации только после обеззараживания химическим методом
- В) допускается сливать в систему централизованной канализации только после обеззараживания физическим методом
- Г) не допускается сливать в систему централизованной канализации ни при каких условиях

1629. [T018570] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССОВ Б И В ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

- А) месяц
- Б) неделю
- В) полгода
- Г) год

1630. [T018571] ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) соблюдение медицинским персоналом санитарно-гигиенических норм и правил
- Б) использование дезинфицирующих средств
- В) сокращение числа инвазивных процедур
- Г) использование технологий уничтожения возбудителей

1631. [T018572] К ИСКУССТВЕННОМУ ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

- А) артифициальный
- Б) воздушно-капельный
- В) контактно-бытовой
- Г) воздушно-пылевой

1632. [T018573] САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) руки
- Б) мочевыводящие пути
- В) кишечник
- Г) кровь

1633. [T018574] СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ
- А) ежедневно
 - Б) 1 раз в 2 дня
 - В) 1 раз в 3 дня
 - Г) 1 раз в 7 дней
1634. [T018575] ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ
- А) открытого, закрытого, комбинированного типов
 - Б) только закрытого типа
 - В) только открытого типа
 - Г) щелевидного типа
1635. [T018576] ПРОВЕТРИВАНИЕ В ПАЛАТАХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ (В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА) В СУТКИ НЕ МЕНЕЕ
- А) 3-4 раз
 - Б) 1 раза
 - В) 2 раз
 - Г) 5 раз
1636. [T018577] МОЮЩИЙ РАСТВОР ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ
- А) при изменении его окраски
 - Б) каждые три часа
 - В) при снижении температуры раствора ниже 50 0С
 - Г) через сутки
1637. [T018578] МОЧЕПРИЕМНЫЕ СОСУДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
- А) бесцветными, прозрачными
 - Б) темного цвета, непрозрачными
 - В) темного цвета, прозрачными
 - Г) не имеет значения
1638. [T018579] ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА УНИЧТОЖЕНИЕ
- А) микроорганизмов
 - Б) грызунов
 - В) насекомых
 - Г) членистоногих
1639. [T018580] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) дератизация
 - Б) дезинфекция
 - В) дезинсекция
 - Г) стерилизация
1640. [T018581] КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УНИЧТОЖЕНИЕ НАСЕКОМЫХ НАЗЫВАЕТСЯ
- А) дезинсекция
 - Б) дезинфекция
 - В) дератизация
 - Г) стерилизация
1641. [T018582] МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) проветривание
 - Б) ультрафиолетовое излучение
 - В) обжигание
 - Г) кипячение
1642. [T018583] ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ
- А) дезинфекции
 - Б) стерилизации
 - В) дезинсекции
 - Г) дератизации
1643. [T018584] ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ
- А) растворов химических средств

Б) водяного насыщенного пара

В) сухого горячего воздуха

Г) дистиллированной воды

1644. [Т018585] УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ И УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

А) дезинфекции

Б) дезинсекции

В) дератизации

Г) стерилизации

1645. [Т018586] СВОЙСТВОМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ УНИЧТОЖЕНИЕ ГРИБОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

А) фунгицидное

Б) бактерицидное

В) вирулицидное

Г) бактериостатическое

1646. [Т018587] К СВОЙСТВУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ ОТНОСИТСЯ

А) вирулицидное

Б) бактерицидное

В) фунгицидное

Г) бактериостатическое

1647. [Т018588] К СВОЙСТВУ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ УНИЧТОЖЕНИЕ БАКТЕРИЙ ОТНОСИТСЯ

А) бактерицидное

Б) вирулицидное

В) фунгицидное

Г) бактериостатическое

1648. [Т018589] К СВОЙСТВУ ПРЕПАРАТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ СПОСОБНОСТЬЮ ЗАДЕРЖИВАТЬ РОСТ МИКРООРГАНИЗМОВ ОТНОСИТСЯ

А) микробостатическое

Б) бактерицидное

В) вирулицидное

Г) спороцидное

1649. [Т018590] ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ МОЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ И НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ, ЧАЩЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ _____ ПРЕПАРАТОВ

А) ЧАС

Б) альдегидсодержащих

В) кислородсодержащих

Г) хлорсодержащих

1650. [Т018591] ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬЮ ФИКСИРОВАТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ЧАЩЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ _____ ПРЕПАРАТОВ

А) альдегидсодержащих

Б) кислородсодержащих

В) ЧАС

Г) фенолсодержащих

1651. [Т018592] МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, НО СОДЕРЖАЩИЕ СПОРЫ, СЧИТАЮТСЯ

А) продезинфицированными

Б) чистыми

В) стерильными

Г) одноразовыми

1652. [Т018593] УНИЧТОЖЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

А) стерилизации

Б) дезинфекции

В) дезинсекции

Г) дератизации

1653. [Т018594] К МЕХАНИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

А) протираание

- Б) кипячение
В) обжигание
Г) пастеризация
1654. [Т018595] К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ
А) кипячение
Б) протирание
В) проветривание
Г) вытряхивание
1655. [Т018596] ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЛИ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
А) заключительную
Б) текущую
В) профилактическую
Г) предварительную
1656. [Т018597] НАИБОЛЬШЕЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ ОБЛАДАЮТ
А) споры
Б) вирусы
В) грибы
Г) бактерии
1657. [Т018598] ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ
А) профилактическую
Б) очаговую
В) текущую
Г) заключительную
1658. [Т018599] ТЕКУЩУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДЯТ РАСТВОРОМ
А) аламинола
Б) перекиси водорода
В) фурацилина
Г) хлоргексидина биглюконата
1659. [Т018600] В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ
А) 1 раз в неделю
Б) ежедневно
В) 2 раза в неделю
Г) 1 раз в месяц
1660. [Т018601] В ПЕРЕВЯЗОЧНОМ КАБИНЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ
А) 1 раз в неделю
Б) ежедневно
В) 2 раза в неделю
Г) 1 раз в месяц
1661. [Т018602] В ПРИВИВОЧНОМ КАБИНЕТЕ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ
А) 1 раз в неделю
Б) 1 раз в месяц
В) 2 раза в неделю
Г) ежедневно
1662. [Т018603] В ПАЛАТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ
А) 1 раз в месяц
Б) 1 раз в неделю
В) 2 раза в неделю
Г) ежедневно
1663. [Т018604] В ПРОЦЕДУРНОМ КАБИНЕТЕ ТЕКУЩУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ
А) ежедневно
Б) 2 раза в неделю
В) через день
Г) еженедельно

1664. [T018605] В ПОМЕЩЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ

- А) 2 раз в сутки
- Б) 1 раза в сутки
- В) 3 раз в сутки
- Г) 4 раз в сутки

1665. [T018606] В КАБИНЕТАХ ФИЗИОТЕРАПИИ ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПРОВОДЯТ С ЧАСТОТОЙ

- А) 1 раз в месяц
- Б) 1 раз в три дня
- В) 1 раз в 7 дней
- Г) 1 раз в 10 дней

1666. [T018607] ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕ ГРАФИКА ПРОВОДЯТ

- А) при получении неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды
- Б) по желанию старшей медицинской сестры
- В) перед административным обходом главной медицинской сестрой
- Г) перед проведением контрольно-надзорных мероприятий

1667. [T018608] ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР НАНОСЯТ НА СТЕНЫ НА ВЫСОТУ НЕ МЕНЕЕ

- А) 2 метров
- Б) 1 метра
- В) 1,5 метров
- Г) 2,5 метров

1668. [T018609] ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ СВОЙСТВАМИ

- А) дезинфицирующими и моющими
- Б) только дезинфицирующими
- В) только моющими
- Г) моющими и дезодорирующими

1669. [T018610] К МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (ХОЗЯИНА ИНФЕКЦИИ), ОТНОСИТСЯ

- А) иммунизация
- Б) использование антибактериальных препаратов
- В) дезинфекционные мероприятия
- Г) дезинсекционные мероприятия

1670. [T018611] К ОСНОВНОМУ РЕЗЕРВУАРУ И ФАКТОРУ ПЕРЕДАЧИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО СТАФИЛОКОККА ОТНОСЯТСЯ

- А) руки
- Б) кровь и лимфа
- В) кишечник и почки
- Г) дыхательные пути

1671. [T018612] РЕЗИСТЕНТНЫЕ ФОРМЫ МИКРООРГАНИЗМОВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

- А) антибиотиков, антисептиков и дезинфектантов
- Б) только антибиотиков
- В) антибиотиков и антисептиков
- Г) дезинфектантов и антисептиков

1672. [T018613] АСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- Б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране
- В) уничтожение болезнетворных микробов
- Г) уничтожение всего живого

1673. [T018614] АНТИСЕПТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме
- Б) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
- В) уничтожение болезнетворных микробов
- Г) мероприятия по обеззараживанию помещений

1674. [T018615] ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «В» ПЕРЕДАЕТСЯ ПУТЕМ

- А) парентеральным
 - Б) воздушно-капельным
 - В) контактно-бытовым
 - Г) воздушно-пылевым
1675. [Т018616] ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ПРИ КОНТАКТЕ С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ПАЦИЕНТОМ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ
- А) уколе иглой
 - Б) попадании биологических жидкостей на кожные покровы
 - В) попадании биологических жидкостей на одежду
 - Г) общении с пациентом
1676. [Т018617] ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ
- А) каждые 2 часа
 - Б) 1 раз в смену
 - В) каждые 6 часов
 - Г) после каждой манипуляции
1677. [Т018618] «ЗОЛОТЫМ» СТАНДАРТОМ КОЖНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ
- А) спиртовые
 - Б) водные
 - В) гелеобразные
 - Г) анионные
1678. [Т018619] ЦЕЛЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ РУК МЕДПЕРСОНАЛА ПЕРЕД ОСМОТРОМ ПАЦИЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ
- А) удаление бытового загрязнения
 - Б) обеспечение кратковременной стерильности
 - В) создание кратковременной стерильности
 - Г) профилактика профессионального заражения
1679. [Т018620] СОЦИАЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ РУК ПРОВОДЯТ
- А) перед сменой постельного белья
 - Б) перед обработкой раны
 - В) после снятия стерильных перчаток
 - Г) после инвазивной процедуры
1680. [Т018621] ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ РУК ПРОВОДЯТ
- А) перед проведением инъекций
 - Б) перед и после приема пищи
 - В) при бытовом загрязнении рук
 - Г) перед сменой постельного белья
1681. [Т018622] ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- А) антисептиков (жидкого мыла)
 - Б) туалетного мыла
 - В) мыла, с повышенным содержанием глицерина
 - Г) специальных косметических средств
1682. [Т018623] УРОВНИ МЫТЬЯ РУК ЗАВИСЯТ ОТ
- А) характера манипуляции
 - Б) степени загрязнения
 - В) вида используемых антисептиков (дезинфектантов)
 - Г) наличия перчаток
1683. [Т018624] ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
- А) жидкое мыло в дозаторе (диспенсере)
 - Б) индивидуальное мыло
 - В) мыльницу с решеткой
 - Г) губки с моющим раствором
1684. [Т018625] К ФАКТОРАМ ИСКУССТВЕННОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ОТНОСЯТ
- А) медицинские инструменты и оборудование
 - Б) продукты питания
 - В) вода
 - Г) насекомые
1685. [Т018626] УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ АКЦЕНТИРУЮТ ВНИМАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА

- А) средства индивидуальной защиты
Б) медикаментах и медицинском оборудовании
В) пациентах
Г) средствах дезинфекции и стерилизации
1686. [Т018627] МНОГОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ИНВАЗИВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ
- А) дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации
Б) только предстерилизационной очистке
В) только дезинфекции
Г) только стерилизации
1687. [Т018628] ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БЕЛЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ СТЕРИЛИЗАТОР
- А) паровой
Б) воздушный
В) плазменный
Г) газовый
1688. [Т018629] ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ В ОДИН ЭТАП ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ
- А) дезинфицирующим и моющим действием
Б) только дезинфицирующим действием
В) дезинфицирующим и стерилизующим действием
Г) дезинфицирующим и дезодорирующим действием
1689. [Т018630] КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ЛЕЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ
- А) 1 раз в неделю
Б) ежедневно
В) 1 раз в месяц
Г) 1 раз в квартал
1690. [Т018631] ФЕНОЛФТАЛЕИНОВАЯ ПРОБА СТАВИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ
- А) моющего средства
Б) крови
В) жировых загрязнений
Г) лекарственных веществ
1691. [Т018632] РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА ПРИГОДЕН В ТЕЧЕНИЕ
- А) 1–2 часов
Б) 1 суток
В) 30 минут
Г) 12 часов
1692. [Т018633] ПРИГОДНОСТЬ РАБОЧЕГО РАСТВОРА АЗОПИРАМА ПРОВЕРЯЮТ НАНЕСЕНИЕМ 2 – 3 КАПЕЛЬ РАСТВОРА НА
- А) кровавое пятно
Б) стерильный ватный шарик
В) стерильный тампон
Г) стерильную салфетку
1693. [Т018634] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОКРАШИВАНИЕ РАСТВОРА
- А) фиолетовое, переходящее в розово – сиреневое
Б) зел.ное, переходящее в фиолетовое
В) фиолетовое, переходящее в зел.ное
Г) синее, переходящее в фиолетовое
1694. [Т018635] ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- А) ставят азопирамовую пробу
Б) используют термовременные индикаторы
В) используют биотесты
Г) делают смывы с различных поверхностей
1695. [Т018636] КОЛИЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ
- А) 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех

единиц

Б) 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену

В) 3 инструмента каждого наименования

Г) 5% от одновременно обработанной партии

1696. [Т018637] ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СУШКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПЕРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ СОСТАВЛЯЕТ

А) 80 – 85 0С

Б) 60 – 65 0С

В) 70 – 75 0С

Г) 90 – 95 0С

1697. [Т018638] ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ СПОР ПРОИСХОДИТ ПРИ

А) стерилизации

Б) дезинфекции

В) дезинсекции

Г) дератизации

1698. [Т018639] ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

А) контроль работы приборов стерилизатора

Б) использование индикаторов

В) использование биотестов

Г) контроль влажности обработанных изделий

1699. [Т018640] ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ В СУХОЖАРОВОМ ШКАФУ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 180 0С, СОСТАВЛЯЕТ ___ МИНУТ

А) 60

Б) 20

В) 30

Г) 40

1700. [Т018641] ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

А) химических

Б) механических

В) биологических

Г) физических

1701. [Т018642] САМЫМ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) биологический

Б) химический

В) физический

Г) механический

1702. [Т018643] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ СОСТАВЛЯЕТ

А) 180 0С – 60 минут

Б) 1,1 атм. – 120 0С – 45 минут

В) 2 атм. – 132 0С – 20 минут

Г) 160 0С – 120 минут

1703. [Т018644] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 2 атм. – 132 0С – 20 минут

Б) 1,1 атм. – 120 0С – 45 минут

В) 160 0С – 120 минут

Г) 180 0С – 60 минут

1704. [Т018645] РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ АВТОКЛАВИРОВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

А) 2 атм. – 132 0С – 20 минут

Б) 1,1 атм. – 120 0С – 45 минут

В) 160 0С – 120 минут

Г) 180 0С – 60 минут

1705. [Т018646] СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСИТ ОТ

А) упаковки

Б) метода стерилизации

- В) вида изделия медицинского назначения
Г) характера манипуляции
1706. [T018647] ВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ
- А) 12 часов
Б) 1 недели
В) 3 суток
Г) 24 часов
1707. [T018648] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПАРЫ ПЕРЧАТОК ДЛЯ УХОДА ЗА ДВУМЯ И БОЛЕЕ ПАЦИЕНТАМИ
- А) не допускается
Б) допускается во всех случаях
В) допускается по решению главной медицинской сестры
Г) отдается на усмотрение персонала
1708. [T018649] ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА (ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ) ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
- А) не реже 1 раза в 7 дней
Б) не чаще 1 раза в 2 дня
В) не реже 1 раза в 3 дня
Г) ежедневно
1709. [T018650] СМЕНА БЕЛЬЯ ПАЦИЕНТАМ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ
- А) не реже 1 раза в 7 дней
Б) не реже 1 раза в 2 дня
В) не реже 1 раза в 3 дня
Г) ежедневно
1710. [T018651] ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОДЛЕЖИТ
- А) дезинфекции
Б) стерилизации
В) проветриванию
Г) промыванию
1711. [T018652] ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
- А) в специально выделенном помещении или шкафу
Б) в помещениях рабочих кабинетов
В) на батареях
Г) в в.драх
1712. [T018653] ПРИ РАБОТЕ С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ НЕОБХОДИМО
- А) применять средства индивидуальной защиты
Б) соблюдать личную гигиену
В) делать 15 минутные перерывы
Г) выходить на свежий воздух
1713. [T018654] КУШЕТКУ, КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОСМОТРА ПАЦИЕНТА, НЕОБХОДИМО ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ
- А) двукратным протиранием с интервалом 15 минут после каждого пациента
Б) протиранием после каждого пациента с интервалом 5 минут после каждого пациента
В) в конце смены
Г) протиранием после каждого пациента
1714. [T018655] ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (МАТРАСЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА) ПОДВЕРГАЮТ
- А) камерной дезинфекции
Б) стерилизации
В) профилактической дезинфекции
Г) очаговой дезинфекции
1715. [T018656] ЧЕХЛЫ МАТРАСОВ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ И КЛЕЕНКИ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) ПАЦИЕНТА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ
- А) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
Б) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
В) двукратного протирания с интервалом 15 минут

- Г) камерной дезинфекции
1716. [Т018657] МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ
А) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
Б) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
В) двукратного протирания с интервалом 15 минут
Г) камерной дезинфекции
1717. [Т018658] НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КЛИЗМ ДЕЗИНФИЦИРУЮТ СПОСОБОМ
А) погружения в раствор дезинфицирующего средства с последующим промыванием водой
Б) протирания тканевой салфеткой, смоченной раствором дезинфицирующего средства
В) двукратного протирания с интервалом 15 минут
Г) камерной дезинфекции
1718. [Т018659] РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
А) концентрацией дезинфицирующего средства и временем экспозиции
Б) временем экспозиции в дезинфицирующем средстве
В) временем экспозиции и температурой дезинфицирующего средства
Г) видом изделия медицинского назначения
1719. [Т018660] ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ
А) металлические инструменты
Б) эндоскопы
В) перевязочный материал
Г) текстиль
1720. [Т018661] ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «В» ЯВЛЯЮТСЯ
А) препараты крови
Б) руки
В) пылевые частицы
Г) предметы обихода
1721. [Т018662] К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
А) половой
Б) алиментарный
В) воздушно-капельный
Г) трансмиссивный
1722. [Т018663] МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ В ГЛАЗА НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА
А) проточной водой
Б) 0,05% раствором калия перманганата
В) 0,02% раствором риванола
Г) 2% раствором соды
1723. [Т018664] К ГИГИЕНИЧЕСКОМУ УРОВЕНЮ МЫТЬЯ РУК ОТНОСИТСЯ
А) мытье рук под проточной водой с мылом с последующим нанесением антисептика
Б) мытье рук до достижения стерильности кистей рук на определенное время
В) мытье рук под проточной водой с мылом с последующим надеванием перчаток
Г) нанесение антисептика на руки без предварительного мытья рук
1724. [Т018665] УНИЧТОЖЕНИЕ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) дезинфекцией
Б) дезинсекцией
В) дератизацией
Г) стерилизацией
1725. [Т018666] ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОТНОСИТСЯ К _____ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ
А) физическому
Б) механическому
В) химическому
Г) комбинированному
1726. [Т018667] ПУЗЫРЬ ДЛЯ ЛЬДА, ГРЕЛКА ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ МЕТОДОМ
А) двукратного протирания
Б) полного погружения

В) однократного протирания

Г) орошения

1727. [T018668] ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

А) удаления с использованных инструментов белковых, жировых и иных загрязнений, остатков лекарственных препаратов

Б) дезинфекции использованных инструментов

В) удаления белковых загрязнений с инструментов

Г) нейтрализации лекарственных средств

1728. [T018669] КОНТРОЛЬНОЙ ПРОБОЙ НА НАЛИЧИЕ КРОВИ НА ИНСТРУМЕНТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

А) азопирамовая

Б) амидопириновая

В) с суданом-3

Г) с суданом-4

1729. [T018670] ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ

А) розово-фиолетовое окрашивание

Б) сине-зеленое окрашивание

В) желто-оранжевое окрашивание

Г) черное окрашивание

1730. [T018671] КЛИЗМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ

А) дезинфекции

Б) протиранию салфеткой

В) обработке спиртом

Г) мытью под проточной водой

1731. [T018672] ОБРАБОТКА КОЖИ ПРИ ПОПАДАНИИ НА НЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПРОВОДИТСЯ

А) 70о спиртом

Б) 3% раствором перекиси водорода

В) 6% раствором перекиси водорода

Г) 96о спиртом

1732. [T018673] НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) биологический

Б) механический

В) химический

Г) физический

1733. [T018674] К СУБЪЕКТИВНОМУ МЕТОДУ СЕСТРИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

А) расспрос пациента

Б) измерение артериального давления

В) определение скрытых отеков

Г) знакомство с данными медицинской карты стационарного больного

1734. [T018675] ПОЯВЛЕНИЕ У ЛИХОРАДЯЩЕГО ПАЦИЕНТА РЕЗКОЙ СЛАБОСТИ, ОБИЛЬНОГО ХОЛОДНОГО ПОТА, БЛЕДНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, НИТЕВИДНОГО ПУЛЬСА И СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ПРИ

А) критическом снижении температуры

Б) быстром и значительном повышении температуры

В) литическом снижении высокой температуры

Г) субфебрилитете

1735. [T018676] ПРИВЛЕКАЯ ПАЦИЕНТА И ЕГО СЕМЬЮ К ОБУЧЕНИЮ ПРИЕМАМ УХОДА, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА

А) определить, что пациент и его семья должны знать и уметь

Б) получить разрешение у врача

В) предупредить старшую медицинскую сестру

Г) получить разрешение у старшей медсестры

1736. [T018677] К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

А) бронхография, томография, флюорография

Б) холецистография, ирригоскопия, гастроскопия

В) спирография, пневмотахометрия, пикфлоуметрия

Г) УЗИ, бронхоскопия

1737. [T018678] ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПЕДИКУЛЁЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- А) лосьон «Ниттифор»
- Б) раствор глюкозы
- В) порошок гидрокарбоната натрия
- Г) раствор фурацилина

1738. [T018679] К ЧАСТИЧНОЙ САНОБРАБОТКЕ ОТНОСИТСЯ

- А) мытье головы
- Б) гигиенический душ
- В) гигиеническая ванна
- Г) обтирание

1739. [T018680] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТА ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 1 раз в день
- В) 2 раза в месяц
- Г) 1 раз в месяц

1740. [T018681] ЦЕЛЮ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК ПЕРСОНАЛА ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТАКТА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) профилактика профессионального заражения
- Б) обеспечение кратковременной стерильности
- В) создание продолжительной стерильности
- Г) удаление бытового загрязнения

1741. [T018682] К МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ ОТНОСИТСЯ

- А) химический
- Б) физический
- В) паровой
- Г) воздушный

1742. [T018683] ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПО ОСТУ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) сухой жар
- Б) текучий пар
- В) пар под давлением
- Г) гипербария

1743. [T018684] СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- А) ежедневно и при загрязнении
- Б) 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- В) 1 раз в неделю и при загрязнении
- Г) 2 раза в неделю и при загрязнении

1744. [T018685] СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В АКУШЕРСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- А) ежедневно и при загрязнении
- Б) 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- В) 1 раз в неделю и при загрязнении
- Г) 2 раза в неделю и при загрязнении

1745. [T018686] СПЕЦОДЕЖДУ МЕДПЕРСОНАЛА В РЕАНИМАЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ

- А) ежедневно и при загрязнении
- Б) 1 раз в 2 дня и при загрязнении
- В) 1 раз в неделю и при загрязнении
- Г) 2 раза в неделю и при загрязнении

1746. [T018687] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в неделю
- Б) 2 раза в месяц
- В) 2 раза в неделю
- Г) 1 раз в месяц

1747. [T018688] ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПАЛАТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОВОДИТСЯ

- А) 1 раз в месяц

- Б) 1 раз в день
- В) 1 раз в неделю
- Г) 2 раза в месяц

1748. [Т018689] ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО РЕЖИМА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) СанПиН 2.1.3 2630-2010
- Б) Трудовой Кодекс РФ
- В) Конституция РФ
- Г) Этический Кодекс медицинской сестры России

1749. [Т018690] К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ

- А) специально обученный, имеющий удостоверение о прохождении специализации, знающий устройство и назначение медицинской аппаратуры, после вводного инструктажа по эксплуатации медицинского оборудования на рабочем месте
- Б) после самостоятельного изучения инструкции по эксплуатации медицинского оборудования с разрешения старшей медицинской сестры
- В) самостоятельно изучивший инструкции по эксплуатации
- Г) только имеющий специальное техническое образование

1750. [Т018691] НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- А) обязательно
- Б) не обязательно
- В) желательно
- Г) возможно

1751. [Т018692] ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДИТСЯ

- А) по его местонахождению в присутствии материально-ответственного лица
- Б) по его местонахождению, допускается без присутствия материально-ответственного лица
- В) по документации, представленной материально-ответственным лицом
- Г) по документации в присутствии руководителя медицинской организации

1752. [Т018693] ДО НАЧАЛА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ

- А) наличие описей, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации
- Б) стоимость аппаратуры
- В) стоимость аппаратуры, наличие и состояние технических паспортов и другой технической документации
- Г) наличие описей и стоимость аппаратуры

1753. [Т018694] ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОЦЕСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- А) норм права
- Б) норм морали
- В) религиозных норм
- Г) социальных норм

1754. [Т018695] НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВЗЫСКАНИЕМ

- А) предупреждение
- Б) замечание
- В) выговор
- Г) увольнение

1755. [Т018696] ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕСЕТ

- А) медицинская организация
- Б) лечащий врач
- В) заведующий отделением
- Г) министерство здравоохранения субъекта РФ

1756. [Т018697] ВНЕСЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБРАЗУЕТ

- А) служебный подлог

Б) халатность

В) превышение должностных полномочий

Г) соучастие

1757. [T018698] ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

А) оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению

Б) оказание доврачебной помощи без специальной подготовки

В) неоказание помощи находившимся вблизи медицинскими работниками в условиях, исключающих возможность обращения в медицинскую организацию

Г) неоказание медицинской помощи лицом, обязанным ее оказывать

1758. [T018699] ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А) осознанный выбор моральных принципов и правил поведения

Б) право на отклоняющееся поведение

В) уголовная ответственность за несоблюдение профессиональных этических норм

Г) безусловная необходимость подчинять личные интересы корпоративным

1759. [T018700] МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ И МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИНЦИП

А) взаимоуважения

Б) высокомерия

В) грубости

Г) снисхождения

1760. [T018701] МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

А) тактично

Б) безразлично

В) унизительно

Г) высокомерно

1761. [T018702] В ОТНОШЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ И МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА НЕДОПУСТИМА

А) фамильярность

Б) уважение

В) спокойствие

Г) тактичность

1762. [T018703] МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ НЕДОПУСТИМО ДЕЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЕ МЛАДШЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ В ПРИСУТСТВИИ

А) третьих лиц

Б) старшей медицинской сестры

В) пациентов и посетителей

Г) сестры-хозяйки

1763. [T018704] ТЕРМИН «ДЕЛОВАЯ СУБОРДИНАЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ

А) распоряжения старшего по должности являются обязательными для подчиненных

Б) демократизм в отношении коллег

В) подчинение коллегам

Г) неподчинение старшему по должности

1764. [T018705] ЭТИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

А) гуманность и милосердие

Б) всесторонний уход за пациентом

В) восстановление здоровья пациента

Г) предупреждение заболеваний

1765. [T018706] ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ СЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

А) профессиональная компетентность

Б) гуманное отношение к пациенту

В) уважение человеческого достоинства

Г) восстановление здоровья пациента

1766. [T018707] ТРЕБОВАНИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ

А) всех медицинских сестер

Б) врачей и медицинских сестер

- В) всех медицинских работников
Г) студентов медицинских колледжей и вузов
1767. [Т018708] РАЗГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ВОЗМОЖНО В СЛУЧАЕ
А) опасности распространения некоторых инфекционных заболеваний
Б) некоторых генетических дефектов у одного из супругов
В) по просьбе руководителя
Г) по просьбе близких родственников
1768. [Т018709] В ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ВХОДИТ
А) уважение прав пациента
Б) здоровая окружающая среда
В) милосердие и терпение
Г) независимость и достоинство
1769. [Т018710] ПОД НЕРАЗГЛАШЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПАЦИЕНТЕ ПОНИМАЮТ
А) врачебную тайну
Б) эмпатию
В) соррогению
Г) эргогению
1770. [Т018711] ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ СОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЯ
А) вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина
Б) о диагнозе и лечении
В) об обращении и заболевании
Г) о прогнозе и исходе болезни
1771. [Т018712] К ЯТРОГЕННЫМ ОТНОСЯТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
А) неосторожными действиями или высказываниями медицинских работников
Б) вредными факторами производства
В) вредными факторами внешней среды
Г) наследственными факторами
1772. [Т018713] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ
А) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
Б) медицинское страхование граждан
В) государственное управление здравоохранением
Г) муниципальное управление здравоохранением
1773. [Т018714] ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ
А) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья
Б) медицинское страхование граждан
В) государственное управление здравоохранением
Г) муниципальное управление здравоохранением
1774. [Т018715] СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ
А) доступность и качество медицинской помощи
Б) медицинское страхование граждан
В) государственное управление здравоохранением
Г) муниципальное управление здравоохранением
1775. [Т018716] К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, СОГЛАСНО ФЗ РФ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ОТНОСИТСЯ
А) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи
Б) медицинское страхование граждан
В) государственное управление здравоохранением
Г) муниципальное управление здравоохранением
1776. [Т018717] ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
А) возможность выбора врача
Б) функционирование частной системы здравоохранения
В) государственное управление здравоохранением

- Г) возможность выбора медицинской сестры
1777. [Т018718] МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ДОЛЖНА ОКАЗЫВАТЬСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
- А) безотлагательно и бесплатно
Б) только при наличии медицинского полиса
В) по решению главного врача
Г) по решению дежурного врача
1778. [Т018719] ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
- А) по запросу работодателя пациента
Б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний
В) при угрозе распространения массовых отравлений
Г) по запросу органов дознания и следствия
1779. [Т018720] ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ
- А) на сроке до 12 недель
Б) на сроке до 6 недель
В) до 22 недель
Г) независимо от срока беременности
1780. [Т018721] В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИМЕНЕНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА
- А) разрешено при соблюдении определенных условий
Б) разрешено без ограничений
В) запрещено
Г) разрешено только при диагностике бесплодия
1781. [Т018722] В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭВТАНАЗИЯ
- А) запрещена во всех медицинских организациях
Б) разрешена в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
В) разрешена в медицинских организациях частной системы здравоохранения
Г) разрешена только при наличии специальной лицензии
1782. [Т018723] В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ДОНОРА, ЕСЛИ ДОНОР
- А) умерший человек, причем ни он, ни его родственники не протестовали против использования его органов
Б) особо опасный преступник, осужденный на пожизненное заключение
В) гражданин иностранного государства
Г) психически неполноценный человек
1783. [Т018724] ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИВОГО ДОНОРА ИЛИ ТРУПА ПРИМЕНЯЕТСЯ
- А) в случае, если другие методы лечения не могут обеспечить сохранение жизни
Б) по решению главного врача
В) по решению лечащего врача
Г) по желанию пациента
1784. [Т018725] ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВИЧ У ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО
- А) сохранить врачебную тайну
Б) предупредить всех людей, имевших с ним контакт
В) назначить принудительное лечение
Г) сообщить в правоохранительные органы
1785. [Т018726] МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ
- А) доноры крови, биологических жидкостей, органов и тканей
Б) все сотрудники организаций, осуществляющих образовательную деятельность
В) весь медицинский персонал
Г) лица любой профессии перед трудоустройством
1786. [Т018727] ОСНОВОПОЛОЖНИЦЕЙ СИСТЕМЫ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) Флоренс Найтингейл
Б) Доротея Орем
В) Екатерина Бакунина

- Г) Дарья Севастопольская
1787. [T018728] ИЕРАРХИЯ ОСНОВНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРЕДЛОЖЕНА АМЕРИКАНСКИМ ПСИХОЛОГОМ
А) А. Маслоу
Б) Д. Орэм
В) К. Рой
Г) В. Хендерсен
1788. [T018729] ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТА В КРЕСЛЕ-КАТАЛКЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РУК
А) за пределами подлокотников
Б) на животе
В) в скрещенном состоянии на груди
Г) на подлокотниках
1789. [T018730] НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ГЕПАРИН ВВОДЯТ В ПОДКОЖНУЮ КЛЕТЧАТКУ
А) живота
Б) плеча
В) предплечья
Г) ягодицы
1790. [T018731] ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ СЛЕДУЕТ СЛЕДИТЬ ЗА
А) частотой пульса
Б) температурой тела
В) цветом мочи
Г) качеством сна
1791. [T018732] ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТА КАЖДЫЕ (В ЧАСАХ)
А) 2
Б) 6
В) 12
Г) 24
1792. [T018733] ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ I ПЕРИОДА ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) озноб
Б) жажда
В) чувство жара
Г) рвота
1793. [T018734] ВИД ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТА ОПРЕДЕЛЯЕТ
А) врач в соответствии с состоянием пациента
Б) медицинская сестра в соответствии с состоянием пациента
В) медицинская сестра в соответствии с самочувствием пациента
Г) врач с учетом мнения пациента
1794. [T018735] ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА
А) срочно вызвать дежурного врача
Б) транспортировать пациента в реанимационное отделение
В) оформить необходимую медицинскую документацию
Г) начать оказание медицинской помощи
1795. [T018736] САНПРОПУСКНИК СЛУЖИТ ДЛЯ
А) санитарной обработки пациента
Б) оказания экстренной помощи
В) регистрации пациентов
Г) приготовления дезинфицирующих растворов
1796. [T018737] С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ КОРОЧЕК ИЗ НОСОВЫХ ХОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
А) вазелиновое масло
Б) 3% раствор перекиси водорода
В) 10% раствор камфорного спирта
Г) 70о этиловый спирт
1797. [T018738] СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных микроорганизмов на изделиях медицинского назначения
Б) система мероприятий, направленных на уничтожение патогенной микрофлоры в окружающей среде

- В) свод мероприятий, направленный на удаление белковых загрязнений
Г) блок мероприятий, направленный на удаление всех лекарственных загрязнений
1798. [T018739] СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОКЛАВОВ ОТНОСИТСЯ К ___ МЕТОДУ
А) паровому
Б) воздушному
В) химическому
Г) газовому
1799. [T018740] ПОЛОЖЕНИЕМ «СИМСА» НАЗЫВАЕТСЯ
А) промежуточное положение между «л.жа на спине» и «л.жа на боку»
Б) положение «л.жа на спине»
В) положение «л.жа на боку»
Г) положение полусидя
1800. [T018741] ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПОСТЕЛИ ПАЦИЕНТ ПРИНИМАЕТ С ЦЕЛЮ
А) облегчения своего состояния
Б) облегчения медперсоналу выполнения функций по уходу
В) более удобного при.ма пищи
Г) уменьшения опасности возникновения пролежней
1801. [T018742] В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА МОЖЕТ БЫТЬ
А) полной или частичной
Б) только полной
В) только частичной
Г) местной и общей
1802. [T018743] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) кишечное кровотечение
Б) метеоризм
В) подготовка к родам
Г) отсутствие стула более двух суток (запор)
1803. [T018744] КРОВЬ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ БЕРЕТСЯ
А) утром натощак
Б) после завтрака
В) в любое время суток
Г) перед обедом
1804. [T018745] ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ЗОНД
А) толстый
Б) тонкий
В) дуоденальный
Г) эндоскопический
1805. [T018746] НА ГИГИЕНИЧЕСКОМ УРОВНЕ ОБРАБОТКУ РУК ПРОВОДЯТ
А) перед проведением инъекций
Б) перед и после приема пищи
В) при бытовом загрязнении рук
Г) после посещения туалета
1806. [T018747] К ПРАВИЛАМ ХРАНЕНИЯ ТЕРМОМЕТРОВ ОТНОСИТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ
А) после дезинфекции в сухом виде
Б) в 3% растворе перекиси водорода
В) в 0,5% растворе Сайдекса
Г) в дистиллированной воде
1807. [T018748] АНТИБИОТИКИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВВОДЯТСЯ
А) внутримышечно
Б) подкожно
В) внутривенно
Г) внутрикочно
1808. [T018749] ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ПАЦИЕНТА НА ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ
А) анафилактический шок

- Б) повышение температуры тела
В) крапивница
Г) покраснение
1809. [T018750] ПРИ ПОСТАНОВКЕ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НАКОНЕЧНИК ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ ____ СМ
А) 10-12
Б) 2-4
В) 20
Г) 40
1810. [T018751] СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫПИТОЙ И ВЫДЕЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ
А) водный баланс
Б) суточный диурез
В) анурез
Г) дневной диурез
1811. [T018752] ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ (В Л)
А) 10
Б) 0,5
В) 1
Г) 3
1812. [T018753] ШПРИЦ ЖАНЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ
А) промывания полостей
Б) подкожных инъекций
В) внутримышечных инъекций
Г) внутривенных инъекций
1813. [T018754] К ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ
А) смена положения тела каждые два часа
Б) умывание
В) лечебная физкультура
Г) смена положения тела 3 раза в день
1814. [T018755] К ТЕРМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ
А) кипячение
Б) ультрафиолетовое облучение
В) двукратное протирание дезинфицирующим раствором
Г) погружение в моющий раствор
1815. [T018756] УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ В КОНЦЕ РАБОЧЕГО ДНЯ НАЗЫВАЕТСЯ
А) заключительная
Б) текущая
В) генеральная
Г) предварительная
1816. [T018757] В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ЛИХОРАДКИ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ
А) грелки
Б) влажного обертывания
В) холодного компресса
Г) пузыря со льдом
1817. [T018758] ВНУТРИМЫШЕЧНЫЕ ИНЪЕКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ В
А) верхненаружный квадрант ягодицы
Б) верхневнутренний квадрант ягодицы
В) нижненаружный квадрант ягодицы
Г) нижневнутренний квадрант ягодицы
1818. [T018759] УГОЛ НАКЛОНА ИГЛЫ ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ (В ГРАДУСАХ)
А) 5
Б) 45
В) 90
Г) не имеет значения
1819. [T018760] ПРИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА ВВОДИТСЯ НА ГЛУБИНУ
А) среза иглы
Б) двух третей иглы

- В) в зависимости от расположения сосуда
Г) всей длины иглы
1820. [T018761] МЕСТОМ ВВЕДЕНИЯ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) внутренняя поверхность предплечья
Б) бедро
В) передняя брюшная стенка
Г) наружная поверхность плеча
1821. [T018762] ВНУТРИКОЖНО ВВОДИТСЯ
А) туберкулин
Б) клофеллин
В) ампициллин
Г) кордиамин
1822. [T018763] ОБЪЕМ РАСТВОРА, ОДНОМОМЕНТНО ВВОДИМОГО ПОДКОЖНО, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ
А) 2 мл
Б) 1 мл
В) 3 мл
Г) 5 мл
1823. [T018764] К ОСЛОЖНЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ АСЕПТИКИ И АНТИСЕПТИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЪЕКЦИЙ ОТНОСЯТСЯ
А) постинъекционные инфильтраты и абсцессы
Б) воздушные эмболии
В) аллергические реакции
Г) жировые эмболии
1824. [T018765] О ЗАДЕРЖКЕ СТУЛА МОЖНО ГОВОРИТЬ, ЕСЛИ ОН ОТСУТСТВУЕТ В ТЕЧЕНИЕ
А) 24 часов
Б) 36 часов
В) 48 часов
Г) 72 часов
1825. [T018766] ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ТУРГОР КОЖИ ОПРЕДЕЛЯЮТ
А) собрав кожу в складку
Б) прикоснувшись к коже пациента тыльной поверхностью пальцев
В) слегка надавив на кожу
Г) по специальным лабораторным показателям
1826. [T018767] ГИПЕРЕМИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ
А) покраснение
Б) желтушность
В) синюшность
Г) бледность
1827. [T018768] ЦИАНОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ
А) синюшность
Б) желтушность
В) покраснение
Г) бледность
1828. [T018769] ИКТЕРИЧНОСТЬЮ НАЗЫВАЕТСЯ
А) желтушность
Б) покраснение
В) синюшность
Г) бледность
1829. [T018770] СИСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ
А) артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца
Б) давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца
В) разница между систолическим и диастолическим давлением
Г) сумма систолического и диастолического давления
1830. [T018771] ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ
А) давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца

Б) артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

В) разница между систолическим и диастолическим давлением

Г) сумма систолического и диастолического давления

1831. [Т018772] ПУЛЬСОВЫМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) разница между систолическим и диастолическим давлением

Б) артериальное давление, возникающее в момент максимального подъема пульсовой волны после сокращения желудочков сердца

В) давление, поддерживаемое в артериях благодаря их тону во время расслабления желудочков сердца

Г) сумма систолического и диастолического давления

1832. [Т018773] СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ РТ. СТ.

А) 100 – 120

Б) 60 – 80

В) 100 – 120

Г) 20 – 40

1833. [Т018774] ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ РТ. СТ.

А) 60 – 80

Б) 20 – 40

В) 100 – 120

Г) 140 – 160

1834. [Т018775] ДИАСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)

Б) показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)

В) вычисляется как сумма пульсового и систолического давления

Г) вычисляется как разница систолического и пульсового давления

1835. [Т018776] СИСТОЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

А) показатель шкалы манометра при появлении первых звуков (тонов Короткова)

Б) величина, соответствующая полному исчезновению звуков (тонов Короткова)

В) рассчитывается как сумма пульсового и систолического давления

Г) рассчитывается как разница систолического и пульсового давления

1836. [Т018777] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ АТОНИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В °С)

А) 15-20

Б) 5-10

В) 25-30

Г) 38-42

1837. [Т018778] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ПРИ СПАСТИЧЕСКОМ ЗАПОРЕ СОСТАВЛЯЕТ (В °С)

А) 38-42

Б) 5-10

В) 15-20

Г) 25-30

1838. [Т018779] КРУЖКУ ЭСМАРХА ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ

А) очистительной клизмы

Б) сифонной клизмы

В) лекарственной клизмы

Г) масляной клизмы

1839. [Т018780] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТА УКЛАДЫВАЮТ НА

А) левый бок

Б) правый бок

В) спину

Г) живот

1840. [Т018781] ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ

А) 1-1,5 л воды комнатной температуры

Б) 100 мл 10% раствора хлорида натрия

В) 10-12 л воды комнатной температуры

Г) 100-200 мл масляного раствора

1841. [T018782] ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ВКЛЮЧАЕТ
- А) кружка Эсмарха, вазелин, судно, вода 1-1,5 л
 - Б) кружка Эсмарха, вазелин, судно, вода 5-6 л
 - В) 2 толстых зонда, воронка, вазелин, вода 10-15 л
 - Г) газоотводная трубка, грушевидный баллон с наконечником, вода 500 мл
1842. [T018783] ПРИ ПОСТАНОВКЕ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ЗОНД ВВОДЯТ В КИШЕЧНИК НА ГЛУБИНУ ___ СМ
- А) 30-40
 - Б) 5-10
 - В) 10-15
 - Г) 40-60
1843. [T018784] ПОСЛЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ОПОРОЖНЕНИЕ КИШЕЧНИКА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ
- А) 10-12 часов
 - Б) 10-15 минут
 - В) 1 час
 - Г) 6 часов
1844. [T018785] ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ 50-100 МЛ РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ
- А) 10%
 - Б) 0,9%
 - В) 2%
 - Г) 20%
1845. [T018786] ЗА 20-30 МИНУТ ДО ПОСТАНОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КЛИЗМЫ ПАЦИЕНТУ СТАВИТСЯ
- А) очистительная клизма
 - Б) газоотводная трубка
 - В) сифонная клизма
 - Г) гипертоническая клизма
1846. [T018787] ДЛЯ ПОСТАНОВКИ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
- А) система из 2-х желудочных толстых зондов
 - Б) шприц Жане
 - В) грушевидный баллон с наконечником
 - Г) кружка Эсмарха
1847. [T018788] ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ КЛИЗМЫ ПРИМЕНЯЮТ 10% РАСТВОР ХЛОРИДА НАТРИЯ В ОБЪЕМЕ
- А) 100-200 мл
 - Б) 10-50 мл
 - В) 200-400 мл
 - Г) 800-1000 мл
1848. [T018789] К ПОСЛАБЛЯЮЩИМ КЛИЗМАМ ОТНОСЯТСЯ
- А) масляная
 - Б) сифонная
 - В) очистительная
 - Г) лекарственная
1849. [T018790] ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
- А) выведение из кишечника токсических веществ
 - Б) появление отеков
 - В) подготовка к родам
 - Г) проведение рентгенологического исследования брюшной полости
1850. [T018791] ОБЪЕМ ВОДЫ ДЛЯ СИФОННОЙ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ
- А) 10-12 л
 - Б) 1-1,5 л
 - В) 5-6 л
 - Г) 18-20 л
1851. [T018792] КРАТНОСТЬ ПРОМЫВАНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ СИФОННОЙ КЛИЗМЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
- А) до чистых промывных вод
 - Б) 1 раз
 - В) 3 раза

- Г) 5 раз
1852. [T018793] ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ОЧИСТИТЕЛЬНОЙ КЛИЗМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) кишечное кровотечение
Б) атонические запоры
В) спастические запоры
Г) подготовка к операции
1853. [T018794] ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ КЛИЗМА
А) вызывает трансудацию жидкости
Б) усиливает желудочную секрецию
В) обволакивает и размягчает каловые массы
Г) расслабляет кишечную мускулатуру
1854. [T018795] ДЛЯ СНЯТИЯ МАССИВНЫХ ОТЕКОВ ПРИМЕНЯЮТ
А) гипертоническую клизму
Б) микроклизму
В) масляную клизму
Г) очистительную клизму
1855. [T018796] ПРИ ПОСТАНОВКЕ МАСЛЯНОЙ КЛИЗМЫ ГАЗООТВОДНУЮ ТРУБКУ ВВОДЯТ НА
А) 15-20 см
Б) 5-10 см
В) 20-30 см
Г) 30-40 см
1856. [T018797] СУБФЕБРИЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ (В ° С)
А) 37,1-38
Б) 39-39,5
В) 38-38,5
Г) 38,1-38,2
1857. [T018798] ДЛЯ ЛИХОРАДКИ ВТОРОГО ПЕРИОДА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ
А) чувства жара
Б) слабости
В) обильного потоотделения
Г) сонливости
1858. [T018799] ПРОБОЙ ЗИМНИЦКОГО, В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
А) плотность и диурез
Б) количество сахара, ацетона
В) количество форменных элементов, бактерий
Г) наличие уробилина, желчных пигментов
1859. [T018800] В ПОДГОТОВКУ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ВХОДИТ
А) очистительная клизма утром и вечером
Б) премедикация
В) измерение температуры в прямой кишке
Г) введение контрастного вещества
1860. [T018801] ЗА ТРИ ДНЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЗ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ
А) молоко, овощи, фрукты, черный хлеб
Б) гречневую кашу, помидоры, гранаты
В) яйца, белый хлеб, сладости
Г) мясо, рыбу, консервы
1861. [T018802] ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ЖЕЛУДКА ВЗРОСЛОМУ СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ В КОЛИЧЕСТВЕ (В ЛИТРАХ)
А) 10
Б) 3
В) 1
Г) 0,5
1862. [T018803] ЭЛЕМЕНТОМ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ПРИ РВОТЕ ЯВЛЯЕТСЯ
А) обработка полости рта
Б) промывание желудка
В) обильное щелочное питье

- Г) применение пузыря со льдом на эпигастральную область
1863. [T018804] ГАСТРОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ
А) желудка
Б) кишечника
В) трахеи
Г) мочевого пузыря
1864. [T018805] ИЛЕОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ
А) тонкого кишечника
Б) толстого кишечника
В) желудка
Г) почки
1865. [T018806] КОЛОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ
А) толстого кишечника
Б) тонкого кишечника
В) желудка
Г) мочевого пузыря
1866. [T018807] ЦИСТОСТОМОЙ НАЗЫВАЕТСЯ ИСКУССТВЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ СВИЩ
А) мочевого пузыря
Б) толстого кишечника
В) тонкого кишечника
Г) желудка
1867. [T018808] КАЛОПРИЕМНИК СЛЕДУЕТ ОПОРОЖНЯТЬ
А) по заполнении каловыми массами и газами на . или 1/3 объема
Б) по заполнении каловыми массами и газами на . объема
В) 1 раз в сутки
Г) на ночь, перед сном
1868. [T018809] ЗАЩИТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОЖИ ВОКРУГ СТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ
А) паста Лассара
Б) линимент Вишневского
В) мазь Флеминга
Г) мазь Левомеколь
1869. [T018810] ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЧАТКИ
А) стерильные
Б) нестерильные
В) нестерильные, обработанные спиртом
Г) кольчужные
1870. [T018811] УРЕТРАЛЬНЫЙ КАТЕТЕР ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ОБРАБАТЫВАЮТ
А) стерильным глицерином
Б) антисептическим раствором
В) 3% раствором перекиси водорода
Г) 700 этиловым спиртом
1871. [T018812] НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ
А) повреждение слизистой оболочки мочеиспускательного канала
Б) недержание мочи
В) инфицирование мочевыводящих путей
Г) задержка мочи
1872. [T018813] ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ПАЦИЕНТ ЗАНИМАЕТ
А) лежа на спине с приподнятым изголовьем кровати под углом 45-60°
Б) промежуточное между положением лежа на животе и на боку
В) лежа горизонтально на спине, без подушки, с приподнятыми ногами
Г) лежа на боку с приведенными к груди ногами
1873. [T018814] ПАЦИЕНТУ ПРИ СТРОГОМ ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
А) только поворачиваться в постели
Б) сидеть на кровати, свесив ноги
В) ходить в столовую
Г) свободно ходить по коридору, посещать туалет
1874. [T018815] ПОДПИСЫВАТЬ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ИМЕЮТ ПРАВО
А) один из родителей ребенка

- Б) любой близкий родственник
В) только мама ребенка
Г) любое лицо, на основании нотариальной доверенности
1875. [Т018816] ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ
А) перед медицинским вмешательством
Б) после первичного осмотра врачом
В) после медицинского вмешательства
Г) перед постановкой диагноза
1876. [Т018817] ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ В ОЧАГЕ В ПРИСУТСТВИИ ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ
А) текущей
Б) заключительной
В) физической
Г) профилактической
1877. [Т018818] К ИНФЕКЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ
А) любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает пациента в результате его поступления в больницу или медработников, вследствие их работы в медицинских учреждениях
Б) любое инфекционное заболевание
В) любое клинически распознаваемое заболевание, с которым пациент поступил в стационар
Г) инфекции, передающиеся половым путем
1878. [Т018819] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ
А) каждые 2 часа
Б) после каждой манипуляции
В) раз в 6 часов
Г) 1 раз в смену
1879. [Т018820] МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ МЕНЯЕТ ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЧАТКИ
А) после каждой манипуляции
Б) при нарушении их целостности
В) не меняются, двукратно протираются спиртом
Г) не меняются, однократно протираются спиртом
1880. [Т018821] К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ОТНОСИТСЯ
А) появление трупных пятен
Б) отсутствие сознания
В) отсутствие дыхания
Г) отсутствие сердцебиения
1881. [Т018822] К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ НЕ ОТНОСИТСЯ
А) расширение зрачков и утрата их реакции на свет
Б) появление трупных пятен
В) появление трупного окоченения
Г) симптом «кошачьего глаза»
1882. [Т018823] САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ПАЦИЕНТА, ПОСТУПАЮЩЕГО В СТАЦИОНАР ПРОВОДИТСЯ
А) после врачебного осмотра
Б) до врачебного осмотра
В) до регистрации пациента
Г) после регистрации пациента
1883. [Т018824] ПРЕПАРАТ «МЕДИФОКС» ПРИМЕНЯЮТ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
А) педикулеза
Б) чесотки
В) аллергии на йод
Г) наружного кровотечения
1884. [Т018825] ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ПРИ ПРИНЯТИИ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ (0С)
А) 25
Б) 20

В) 30

Г) 35

1885. [T018826] ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ВАННЫ СОСТАВЛЯЕТ (0С)

А) 36 – 37

Б) 23 – 25

В) 34 – 36

Г) 39 – 41

1886. [T018827] ВСЕ ПАЦИЕНТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕЧЕНИИ, ОСМАТРИВАЮТСЯ НА ПЕДИКУЛЕЗ КАЖДЫЕ _____ ДНЕЙ

А) 7

Б) 10

В) 14

Г) 3

1887. [T018828] В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕДИКУЛЕЗА ОТМЕТКА «Р» СТАВИТСЯ

А) на титульном листе медицинской карты стационарного больного

Б) в температурном листе

В) на экстренном извещении

Г) в листе назначения

1888. [T018829] ОДНОРАЗОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ

А) дезинфекции

Б) ополаскиванию проточной водой

В) предстерилизационной очистке

Г) стерилизации

1889. [T018830] НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ИМЕЕТ

А) адекватное питание

Б) нормализация массы тела

В) устранение гиподинамии

Г) закаливание

1890. [T018831] НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

А) угнетение дыхания

Б) судороги конечностей

В) эндогенная депрессия

Г) понижение температуры

1891. [T018832] КРИТИЧЕСКОЕ СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

А) коллапса

Б) кишечной непроходимости

В) острого коронарного синдрома

Г) острой дыхательной недостаточности

1892. [T018833] БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ВИЧ В НАИБОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

А) кровь

Б) спинномозговая жидкость

В) слюна

Г) слезная жидкость

1893. [T018834] ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К АНАЛИЗУ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ НЕОБХОДИМО

А) исключить из пищи железосодержащие продукты, не чистить зубы при кровоточивости десен в течение 3-х дней до исследования

Б) исключить специальную подготовку

В) накануне исследования съесть легкий ужин

Г) накануне исследования съесть легкий ужин, утром сделать очистительную клизму

1894. [T018835] К ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ МЕТОДУ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕМУ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫЕ ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЕ ВЕНЫ, ОТНОСИТСЯ

А) ректороманоскопия

Б) фиброгастродуоденоскопия

В) ирригоскопия

Г) ангиография

1895. [Т018836] ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ В ОТДЕЛЕНИИ – ЭТО ЗАДАЧА

А) постовой медсестры

Б) главной медсестры

В) диетсестры

Г) главного врача

1896. [Т018837] ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СТАЦИОНАРА ОБЯЗАТЕЛЬНО

А) в период эпидемиологического неблагополучия

Б) на усмотрение администрации

В) на усмотрение эпидемиолога

Г) постоянно

1897. [Т018838] ПРИ ОБРАБОТКЕ ГЛАЗ, РЕСНИЦЫ И ВЕКИ ПРОТИРАЮТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

А) от наружного края к внутреннему

Б) круговыми движениями

В) произвольно

Г) от внутреннего угла к наружному

1898. [Т1] В НОРМЕ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ АПГАР ДОНОШЕННОГО ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ

А) 8-10 баллов

Б) 4-6 баллов

В) 6-7 баллов

Г) 10-12 баллов