

Генерализованная ЛАП (впервые выявленная, вне зависимости от наличия лихорадки, фарингита, др общих симптомов)

- Серология на вирусы: ЭБВ, ЦМВ, ВИЧ, токсоплазмоз, герпес (HHV-6), гепатит В
- Развернутый анализ крови
- Рентгенография грудной клетки
- Реакция Манту

При выявлении цитопении или гиперлейкоцитоза необъяснимой этиологии:

- Исследование костного мозга

При выявлении медиастинальной ЛАП рассмотреть возможность:

- Туберкулеза
- Саркоидоза
- Лимфогранулематоза

Если диагноз не установлен:

- Маркеры аутоиммунных заболеваний (антинуклеарные АТ и др.)
- Дополнительные исследования на наличие инфекций согласно анамнезу и клиническому статусу (бруцеллез, сифилис, болезнь Лайма, иерсиниоз и др.)
- УЗИ, КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства
- ЛДГ, трансаминазы, хорионический гонадотропин, а-фетопротеин
- Если нет диагноза, повторить серологию на вирусы через 2-4 недели

Если в течение 4 недель диагноз не установлен либо нет ответа на терапию и есть ЛУ > 2см: биопсия ЛУ. Показания к более ранней биопсии: увеличение нижешейных и надключичных ЛУ, медиастинальная ЛАП, ЛУ > 3 см.